

** 2014年2月改訂(第9版)
* 2009年8月改訂

| |
|------------|
| 日本標準商品分類番号 |
| 872239 |

気道潤滑去痰剤

** アンブロキソール塩酸塩錠15mg「TCK」

《アンブロキソール塩酸塩錠》

AMBROXOL HYDROCHLORIDE

| | |
|---------|------------------|
| ** 承認番号 | 22500AMX01847000 |
| ** 薬価収載 | 2014年6月 |
| 販売開始 | 1992年7月 |
| 効能追加 | 1996年5月 |

貯法：遮光・気密容器保存
使用期限：外装に表示

【 禁忌 】(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

2. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

3. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]
- (2) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。[動物実験(ラット)で母乳中へ移行することが報告されている。]


4. 適用上の注意

薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)

**【 組成・性状 】

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「TCK」は1錠中にアンブロキソール塩酸塩を15mg含有する。

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、セルロース、ポビドン、二酸化ケイ素、ステアリン酸Mgを含有する。

| 外形 | | | 色調 剤形 | 識別コード |
|--|--|--|---------------------|----------|
| 直径(mm) | 厚さ(mm) | 重量(mg) | | |
|  6.1 |  2.6 |  100 | 白色～微黄白色 素錠(割線入り) | TU FZ |

【 効能又は効果 】

- 下記疾患の去痰
急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核、塵肺症、手術後の喀痰咯出困難
- 慢性副鼻腔炎の排膿

【 用法及び用量 】

通常、成人には1回1錠(アンブロキソール塩酸塩として15.0mg)を1日3回経口投与する。

なお、年齢・症状により適宜増減する。

【 使用上の注意 】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用(頻度不明)

- 1) ショック、アナフィラキシー様症状：ショック、アナフィラキシー様症状(発疹、顔面浮腫、呼吸困難、血圧低下等)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)：皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

| | 頻度不明 |
|-------------------|--|
| 消化器 | 胃不快感、胃痛、腹部膨満感、腹痛、下痢、嘔気、嘔吐、便秘、食思不振、消化不良(胃部膨満感、胸やけ等) |
| 過敏症 ^{注)} | 発疹、蕁麻疹、蕁麻疹様紅斑、痒疹、血管浮腫(顔面浮腫、眼瞼浮腫、口唇浮腫等) |
| 肝臓 | 肝機能障害[AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇等] |
| その他 | 口内しびれ感、上肢のしびれ感、めまい |

注) このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。


**【 薬物動態 】

生物学的同等性試験

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「TCK」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(アンブロキソール塩酸塩15mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血清中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について95%信頼区間法にて統計解析を行った結果、±20%の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。¹⁾

| | 判定パラメータ | | 参考パラメータ | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| | AUC _{0-24hr} (ng・hr/mL) | Cmax (ng/mL) | Tmax (hr) | T _{1/2} (hr) |
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「TCK」 | 208.47±59.47 | 25.58±6.68 | 1.96±0.63 | 6.69±1.71 |
| 標準製剤(錠剤、15mg) | 212.35±61.10 | 25.67±7.46 | 2.07±0.55 | 7.05±2.01 |

(Mean±S.D.,n=14)



血清中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

溶出挙動

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「TCK」は、日本薬局方外医薬品規格第3部に定められた溶出規格に適合していることが確認されている。²⁾

【 有効成分に関する理化学的知見 】

一般名：アンブロキシソール塩酸塩 (Ambroxol Hydrochloride)


化学名：*trans*-4- [(2-Amino-3,5-dibromobenzyl) amino] cyclohexanol hydrochloride

分子式： $C_{13}H_{18}Br_2N_2O \cdot HCl$

分子量：414.56

融点：約 235°C (分解)

構造式：



性状：白色の結晶性の粉末で、においはなく、わずかに特異な味がある。

メタノールにやや溶けやすく、水又はエタノール (99.5) にやや溶けにくく、酢酸 (100) に溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

**【 取扱い上の注意 】

安定性試験

加速試験 (40°C、相対湿度 75%、6 ヶ月) の結果、アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg「TCK」は通常の市場流通下において 3 年間安定であることが推測された。³⁾

【 包装 】

100 錠 (PTP) 1,200 錠 (PTP・バラ)

【 主要文献 】

- 1) 辰巳化学株式会社：生物学的同等性試験
- 2) 辰巳化学株式会社：溶出試験
- 3) 辰巳化学株式会社：安定性試験

【 文献請求先 】

主要文献に記載の社内資料につきましては下記にご請求下さい。

辰巳化学株式会社 薬事・学術課

〒 921-8164 金沢市久安 3 丁目 406 番地

TEL 076-247-2132

FAX 076-247-5740



製造販売元
辰巳化学株式会社
金沢市久安 3 丁目 406 番地