

貯法

- 気密容器
- 火気を避けて保存



(HD6) A

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】
損傷皮膚及び粘膜 [刺激作用を有する]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本剤を含浸させた消毒綿は、気密容器に入れて保存すること。
[アルコールが蒸発して殺菌力が減退する]
- 2) 眼に入らないよう注意すること。入った場合には直ちに水でよく洗い流すこと。
- 3) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
[イソプロパノール蒸気に大量又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある]

2. 副作用(本剤は、副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない)

種類\頻度	頻度不明
過敏症 注)	発疹 等
皮膚 注)	刺激症状

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

4. 適用上の注意

- 1) 投与経路 外用にのみ使用すること。
- 2) 使用時
 - (1) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
 - (2) 本剤は血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
 - (3) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具等には変質するものがあるのでこのような器具は長時間浸漬しないこと。
 - (4) 本剤は引火性・爆発性があるため、火気(電気メス使用時も含む)には十分注意すること。

外用殺菌消毒剤

50%イソプロ消アル「ヤマゼン」
50% Isopropyl Alcohol "Yamazén"



製造販売元

山善製薬株式会社

大阪府中央区道修町2丁目2番4号



2008年4月改訂

承認番号 15900AMZ00042

販売開始 1984年1月

日本標準商品分類番号 872615

薬価収載 1984年1月

再評価結果 1983年4月

外用殺菌消毒剤

【組成・性状】

- 日局 イソプロパノール 50vol%含有
- 本品は無色澄明の液で、特異なおいがある。
比重 d₂₀:約0.925

【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	用法・用量
<ul style="list-style-type: none"> ● 手指・皮膚の消毒 ● 医療機器の消毒 	本品をそのまま、消毒部位に塗布する。

【薬効薬理】

本剤は使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌など)及び一部のウイルスには殺菌効果は期待できない。

製造番号

使用期限