

** 2018年10月改訂 (第3版)
* 2009年6月改訂

日本標準商品分類番号
872183

貯法：気密容器で室温保存
使用期限：外箱等に表示の使用期限内に使用すること
* 規制区分：処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

承認番号	22000AMX01746000
薬価収載	2008年11月
販売開始	2008年11月

高脂血症治療剤

日本薬局方 ベザフィブラート徐放錠
ベザフィブラートSR錠100mg 「日医工」
Bezafibrate

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

1. 人工透析患者（腹膜透析を含む）〔横紋筋融解症があらわれやすい。〕
2. 腎不全などの重篤な腎疾患のある患者〔横紋筋融解症があらわれやすい。〕
3. 血清クレアチニン値が2.0mg/dL以上の患者〔横紋筋融解症があらわれやすい。〕
4. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
5. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「妊婦，産婦，授乳婦等への投与」の項参照）

血清クレアチニン値	クレアチニンクリアランス	投与量
Scr ≤ 1.5mg/dL	60mL/分 ≤ Ccr	400mg/日 (200mg × 2)
1.5mg/dL < Scr < 2.0mg/dL	50mL/分 < Ccr < 60mL/分	200mg/日 (200mg × 1)

Scr：血清クレアチニン値
Ccr：クレアチニンクリアランス

【組成・性状】

1. 組成

ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」は日本薬局方ベザフィブラート徐放錠で、1錠中ベザフィブラート100mgを含有する。
添加物としてセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタン、カルナウバロウを含有する。

2. 製剤の性状

本品は白色～帯黄白色の徐放性フィルムコーティング錠である。

販売名	形状 質量(mg) 直径(mm) 厚さ(mm)	本体コード	包装コード
ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」	128.8 7.1 3.8	n 564	n 564

【効能・効果】

高脂血症（家族性を含む）

【用法・用量】

通常、成人にはベザフィブラートとして1日400mgを2回に分けて朝夕食後に経口投与する。
なお、腎機能障害を有する患者及び高齢者に対しては適宜減量すること。

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞

本剤は主として腎臓を経て尿中に排泄されるので、腎機能障害のある患者への投与には十分注意する必要がある。投与にあたっては、下表の血清クレアチニン値に応じて減量すること。
また、高齢者では、加齢により腎機能の低下を認める一方で、筋肉量の低下から血清クレアチニン値の上昇が軽微であるため、下表のクレアチニンクリアランスに応じた投与量の調節を行うこと。

なお、投与量はクレアチニンクリアランスの実測値より設定することが望ましいが、患者の身体状況等を勘案し、実測することが困難である場合には、例えばクレアチニンクリアランスと高い相関性が得られる下記の安田の推定式を用いる等により用量の設定を行うこと。

男性：(176－年齢)×体重/(100×血清クレアチニン値)
女性：(158－年齢)×体重/(100×血清クレアチニン値)

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 腎疾患のある患者〔症状の増悪及び横紋筋融解症があらわれることがある。（「用法・用量に関連する使用上の注意」の項参照）〕
- ** (2) HMG-CoA還元酵素阻害薬（プラバスタチンナトリウム，シンバスタチン，フルバスタチンナトリウム等）を投与中の患者（「相互作用」の項参照）
- (3) 血清クレアチニン値が1.5mg/dLを超える患者〔横紋筋融解症があらわれることがある。（「用法・用量に関連する使用上の注意」の項参照）〕
- (4) 肝障害又はその既往歴のある患者〔血中濃度が上昇するおそれがある。〕
- (5) 胆石又はその既往歴のある患者〔胆石の形成がみられることがある。〕
- (6) 抗凝血薬を投与中の患者（「相互作用」の項参照）
- (7) スルホニル尿素系血糖降下薬（グリベンクラミド，グリクラジド，グリメピリド等），ナテグリニド及びインスリンを投与中の患者（「相互作用」の項参照）
- (8) 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）

2. 重要な基本的注意

本剤の適用にあたっては、次の点に十分留意すること。

- (1) 本剤投与中、**急激な腎機能の悪化を伴う横紋筋融解症**（副作用（1）重大な副作用）の項参照）があらわれることがある。この症状は透析患者，腎不全などの**重篤な腎機能障害を有する患者であらわれやすい**ため、これらの患者には投与しないこと。
- ** (2) 腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とHMG-CoA還元酵素阻害薬を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にのみ併用すること。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。やむを得ず併用する場合には、本剤を少量から投与開始するとともに、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状（筋肉痛，脱力感）の発現，CK（CPK）上昇，血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。
- (3) 適用の前に十分な検査を実施し、高脂血症であることを確認した上で本剤の適用を考慮すること。
- (4) あらかじめ高脂血症の基本である食事療法を行い、更に運動療法や、高血圧・喫煙等の虚血性心疾患のリスクファクターの軽減等も十分に考慮すること。
- (5) 投与中は血中脂質値を定期的に検査し、治療に対する反応が認められない場合には投与を中止すること。

3. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
** HMG-CoA還元酵素阻害薬 プラバスタチンナトリウム、シンバスタチン、フルバスタチンナトリウム等	急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。自覚症状（筋肉痛、脱力感）の発現、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。	危険因子：腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者
抗凝血薬 ワルファリン カリウム	プロトンポンプ阻害薬を測定して抗凝血薬の量を調節すること。出血又はその傾向が認められた場合には、抗凝血薬あるいは全ての該当薬剤を減量又は中止すること。	本剤による抗凝血薬の作用部位の親和性の増加による抗凝血薬の作用増強が考えられる。
フルバスタチンナトリウム	フルバスタチンナトリウムの血中濃度が上昇することがある。	フルバスタチンナトリウムの肝代謝が阻害され、初回通過効果が低下したものと考えられる。
スルホニル尿素系血糖降下薬 グリベンクラミド、グリクラジド、グリメビリド等	冷汗、強い空腹感、動悸等の低血糖症状の発現が報告されているので、このような症状があらわれた場合には血糖降下薬の量を調節すること。	本剤とこれらの薬剤との血清アルブミン結合部位における競合により、これらの薬剤の血中遊離型濃度が上昇し血糖降下作用が増強されると考えられる。 <危険因子> 高齢者
ナテグリニド		
インスリン	低血糖症状があらわれることがある。併用する場合には血糖値その他患者の状態を十分観察しながら投与すること。	インスリン感受性増強等の作用により、血糖降下作用を増強すると考えられる。
シクロスポリン	腎障害が報告されているので、腎機能検査値（クレアチニン、BUN等）の変動に十分注意すること。	腎障害の副作用が相互に増強されると考えられる。
陰イオン交換樹脂剤 コレスチラミン	本剤の吸収が遅延又は減少する可能性があるため、併用する場合には、少なくとも2時間以上の間隔をあけて投与すること。	陰イオン交換樹脂剤の吸着作用によると考えられる。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用（頻度不明）

1) 横紋筋融解症

筋肉痛、脱力感、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれ、これに伴って急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。（「重要な基本的注意(1)」の項参照）

2) アナフィラキシー

ショック、アナフィラキシー（顔面浮腫、口唇の腫脹等）があらわれることがあるので観察を十分に行い、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

3) 肝機能障害、黄疸

AST（GOT）、ALT（GPT）、 γ -GTPの上昇等を伴う肝

機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

4) 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑

皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

	頻度不明
精神神経系	傾眠、不眠、しびれ感、頭痛、めまい
筋肉 ^{注1)}	筋痙攣、CK（CPK）上昇、筋肉痛
消化器	胃潰瘍、胸やけ、口渴、腹痛、嘔気、食欲不振、嘔吐、腹部膨満感、下痢、口内炎、便秘
皮膚	光線過敏症、発疹、掻痒、蕁麻疹
肝臓	AST（GOT）上昇、ALT（GPT）上昇、LDH上昇
腎臓 ^{注2)}	BUN上昇、クレアチニン上昇
血液	血小板減少、貧血、白血球減少、血小板増加
その他	胆石、勃起不全、味覚異常、発熱、浮腫、頻尿、尿酸の上昇、低血糖、全身倦怠感、脱毛

注1：このような場合には減量又は休薬すること。

注2：既に腎機能障害のある患者においては症状が増悪することがあるので、このような場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

5. 高齢者への投与

- 高齢者では、患者の合併症、既往歴、自・他覚症状などに留意し、少量から開始するなど投与量に十分注意すること。[肝・腎機能が低下していることが多く、また、体重が少ない傾向があるなど、副作用が発現しやすい。]
- 腎機能については投与中も定期的に臨床検査等を行い、常に機能低下がないかどうかを確認し、異常が認められた場合には直ちに投与を中止して、さらに腎機能悪化が進行しないよう適切な処置を行うこと。（「用法・用量に関連する使用上の注意」の項参照）
- 高齢者においてスルホニル尿素系血糖降下薬（グリベンクラミド）との併用により、冷汗、強い空腹感、動悸等の低血糖症状の発現が報告されているので注意すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]
- 本剤投与中は授乳を避けさせること。[動物実験（ラット）で乳汁中への移行が報告されている。]

7. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。

8. 適用上の注意

- 服用時**
本剤は徐放錠であるので、割ったり、砕いたりしないでそのまま服用させること。
- 薬剤交付時**
PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。）

9. その他の注意

- 外国では普通錠の1日600mg（分3）投与において、消化器症状等の副作用の発現頻度が比較的高いことが報告されている。
- ラットの24ヵ月間投与試験で、雄の高投与量群（123及び256mg/kg、臨床用量の20～40倍）において、精巢の間質細胞腫が認められた。ラットの雌及びマウスでは発癌性は認められていない。


【薬物動態】

1. 生物学的同等性試験

ベザフィブラート100mg「日医工」及び標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（ベザフィブラートとして100mg）健康成人男子に絶食時及び食後単回経口投与して血漿中ベザフィブラート濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。¹⁾

		判定パラメータ		参考パラメータ	
		AUC ₀₋₂₄ ($\mu\text{g}\cdot\text{hr}/\text{mL}$)	C _{max} ($\mu\text{g}/\text{mL}$)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
絶食時投与	ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」	9.58±2.42	2.42±0.56	4.1±0.7	1.6±0.5
	標準製剤(錠剤, 100mg)	9.44±1.60	2.34±0.57	3.8±0.8	1.6±0.6
食後投与	ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」	9.42±1.22	2.24±0.47	4.5±0.7	1.7±0.6
	標準製剤(錠剤, 100mg)	9.19±2.11	2.30±0.35	4.3±0.9	1.6±0.4

(1錠投与, Mean±S.D., n=16)



血漿中濃度並びにAUC, C_{max}等のパラメータは, 被験者の選択, 体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

2. 溶出挙動

ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」は, 日本薬局方医薬品各条に定められたベザフィブラート徐放錠(100mg錠)の溶出規格に適合していることが確認されている。²⁾

【薬効薬理】


ベザフィブラートは高脂血症患者の血清総コレステロール及び血清トリグリセリドを有意に低下させると共に, HDL-コレステロールを有意に上昇させる。前者の作用はアセチルCoAからメバロン酸に至るコレステロール生合成過程の抑制, アセチルCoAカルボキシラーゼ活性及びトリグリセリド生合成の抑制によると考えられる。また後者の作用はリポたん白リパーゼ活性や肝性トリグリセリドリパーゼ活性の亢進によるリポたん白代謝の促進, 及びLDLレセプター活性の亢進によるLDL代謝の促進によると考えられる。³⁾

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名: ベザフィブラート (Bezafibrate)

化学名: 2-(4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy)-2-methylpropanoic acid

構造式:



分子式: C₁₉H₂₀ClNO₄

分子量: 361.82

性状: 白色の結晶性の粉末である。

N,N-ジメチルホルムアミドに溶けやすく, メタノールにやや溶けやすく, エタノール(99.5)にやや溶けにくく, 水にほとんど溶けない。

融点: 181~186℃

【取扱い上の注意】

安定性試験

本品につき加速試験(40℃, 相対湿度75%, 6ヵ月)を行った結果, ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。⁴⁾

【包装】

ベザフィブラートSR錠100mg「日医工」
100錠(10錠×10; PTP)

【主要文献】

- 1) 日医工株式会社 社内資料: 生物学的同等性試験
- 2) 日医工株式会社 社内資料: 溶出試験
- 3) 第十五改正日本薬局方解説書 C-3903, 廣川書店, 東京(2006)
- 4) 日医工株式会社 社内資料: 安定性試験

【文献請求先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21

☎ (0120)517-215

Fax (076)442-8948