

## 医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2013に準拠して作成

持続性選択H<sub>1</sub>受容体拮抗剤  
日本薬局方 **エバスチン錠**  
**エバスチン錠 5mg「CH」**  
**エバスチン錠 10mg「CH」**

剤形	フィルムコーティング錠
製剤の規制区分	該当しない
規格・含量	錠 5mg：1錠中 日局 エバスチン 5mg を含有 錠 10mg：1錠中 日局 エバスチン 10mg を含有
一般名	和名：エバスチン 洋名：Ebastine
製造販売承認年月日 薬価基準収載・発売年月日	製造販売承認年月日：2008年3月14日 薬価基準収載年月日：2008年7月4日 発売年月日：2008年7月4日
開発・製造販売（輸入）・ 提携・販売会社名	販売元：日本ジェネリック株式会社 製造販売元：長生堂製薬株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	日本ジェネリック株式会社 お客様相談室 受付時間：9時～18時（土、日、祝日を除く） TEL 0120-893-170 FAX 0120-893-172 医療関係者向けホームページ： <a href="http://www.nihon-generic.co.jp/medical/index.html">http://www.nihon-generic.co.jp/medical/index.html</a>

本IFは2016年4月改訂の添付文書の記載に基づき改訂した。

最新の添付文書情報は、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」

<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>にてご確認ください。

# IF 利用の手引きの概要 —日本病院薬剤師会—

## 1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書(以下、添付文書と略す)がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和 63 年に日本病院薬剤師会(以下、日病薬と略す)学術第 2 小委員会が「医薬品インタビューフォーム」(以下、IF と略す)の位置付け並びに IF 記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10 年 9 月に日病薬学術第 3 小委員会において IF 記載要領の改訂が行われた。

更に 10 年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成 20 年 9 月に日病薬医薬情報委員会において IF 記載要領 2008 が策定された。

IF 記載要領 2008 では、IF を紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF 等の電磁的データとして提供すること(e-IF)が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版の e-IF が提供されることとなった。

最新版の e-IF は、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」(<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-IF を掲載する PMDA ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせて e-IF の情報を検討する組織を設置して、個々の IF が添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008 年より年 4 回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、IF 記載要領の一部改訂を行い IF 記載要領 2013 として公表する運びとなった。

## 2. IF とは

IF は「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等は IF の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された IF は、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

### [IF の様式]

- ①規格は A4 版、横書きとし、原則として 9 ポイント以上の字体(図表は除く)で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ②IF 記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF 利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2 頁にまとめる。

#### [IF の作成]

- ①IF は原則として製剤の投与経路別(内用剤, 注射剤, 外用剤)に作成される。
- ②IF に記載する項目及び配列は日病薬が策定した IF 記載要領に準拠する。
- ③添付文書の内容を補完するとの IF の主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④製薬企業の機密等に関するもの, 製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」(以下, 「IF 記載要領 2013」と略す)により作成された IF は, 電子媒体での提供を基本とし, 必要に応じて薬剤師が電子媒体(PDF)から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

#### [IF の発行]

- ①「IF 記載要領 2013」は, 平成 25 年 10 月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ②上記以外の医薬品については, 「IF 記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③使用上の注意の改訂, 再審査結果又は再評価結果(臨床再評価)が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ, 記載すべき内容が大きく変わった場合には IF が改訂される。

### 3. IF の利用にあたって

「IF 記載要領 2013」においては, PDF ファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は, 電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体の IF については, PMDA ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが, IF の原点を踏まえ, 医療現場に不足している情報や IF 作成時に記載し難い情報等については製薬企業の MR 等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ, IF の利用性を高める必要がある。また, 随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては, IF が改訂されるまでの間は, 当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等, あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに, IF の使用にあたっては, 最新の添付文書を PMDA ホームページで確認する。

なお, 適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることがあり, その取扱いには十分留意すべきである。

### 4. 利用に際しての留意点

IF を薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし, 薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により, 製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。IF は日病薬の記載要領を受けて, 当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから, 記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は, IF があくまでも添付文書を補完する情報資材であり, インターネットでの公開等も踏まえ, 薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013 年 4 月改訂)

# 目次

## I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯…………… 6
2. 製品の治療学的・製剤学的特性…………… 6

## II. 名称に関する項目

1. 販売名…………… 7
2. 一般名…………… 7
3. 構造式又は示性式…………… 7
4. 分子式及び分子量…………… 7
5. 化学名(命名法) …… 8
6. 慣用名, 別名, 略号, 記号番号…………… 8
7. CAS 登録番号…………… 8

## III. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質…………… 9
2. 有効成分の各種条件下における安定性…………… 9
3. 有効成分の確認試験法…………… 9
4. 有効成分の定量法…………… 10

## IV. 製剤に関する項目

1. 剤形…………… 11
2. 製剤の組成…………… 11
3. 懸濁剤, 乳剤の分散性に対する注意…………… 12
4. 製剤の各種条件下における安定性…………… 12
5. 調製法及び溶解後の安定性…………… 14
6. 他剤との配合変化(物理化学的変化) …… 14
7. 溶出性…………… 15
8. 生物学的試験法…………… 20
9. 製剤中の有効成分の確認試験法…………… 20
10. 製剤中の有効成分の定量法…………… 20
11. 力価…………… 20
12. 混入する可能性のある夾雑物…………… 20
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報…………… 20
14. その他…………… 20

## V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果…………… 21
2. 用法及び用量…………… 21
3. 臨床成績…………… 21

## VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群…………… 23
2. 薬理作用…………… 23

## VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法…………… 24
2. 薬物速度論的パラメータ…………… 25
3. 吸収…………… 26
4. 分布…………… 26
5. 代謝…………… 26
6. 排泄…………… 27
7. トランスポーターに関する情報…………… 27
8. 透析等による除去率…………… 27

## VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

1. 警告内容とその理由…………… 28
2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)…………… 28
3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由…………… 28
4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由…………… 28
5. 慎重投与内容とその理由…………… 28
6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法…………… 28
7. 相互作用…………… 28
8. 副作用…………… 29
9. 高齢者への投与…………… 30
10. 妊婦, 産婦, 授乳婦等への投与…………… 30
11. 小児等への投与…………… 31
12. 臨床検査結果に及ぼす影響…………… 31
13. 過量投与…………… 31
14. 適用上の注意…………… 31

15. その他の注意	31
16. その他	31

#### IX. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験	32
2. 毒性試験	32

#### X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分	33
2. 有効期間又は使用期限	33
3. 貯法・保存条件	33
4. 薬剤取扱い上の注意点	33
5. 承認条件等	33
6. 包装	33
7. 容器の材質	34
8. 同一成分・同効薬	34
9. 国際誕生年月日	34
10. 製造販売承認年月日及び承認番号	34
11. 薬価基準収載年月日	34
12. 効能又は効果追加, 用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容	34
13. 再審査結果, 再評価結果公表年月日及びその内容	34
14. 再審査期間	35
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	35
16. 各種コード	35
17. 保険給付上の注意	35

#### XI. 文献

1. 引用文献	36
2. その他の参考文献	36

#### XII. 参考資料

1. 主な外国での発売状況	37
2. 海外における臨床支援情報	37

#### XIII. 備考

その他の関連資料	38
----------	----

---

## I. 概要に関する項目

---

### 1. 開発の経緯

本剤は、エバスチンを有効成分とする持続性選択 H<sub>1</sub> 受容体拮抗剤である。  
長生堂製薬株式会社が後発医薬品として開発を企画し、薬食発第 0331015 号  
(平成 17 年 3 月 31 日)に基づき規格及び試験方法を設定、加速試験、生物学的同  
等性試験を実施し、2008 年 3 月に承認を得て、2008 年 7 月発売に至った。

### 2. 製品の治療学的・製剤学的特性

- (1) 本剤は、持続性選択 H<sub>1</sub> 受容体拮抗剤であり、1 日 1 回投与で効果が得られる。
- (2) 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。なお、重大な副作用として、ショック、アナフィラキシー、肝機能障害、黄疸があらわれることがある。また、類薬(テルフェナジン等)で、QT 延長、心室性不整脈(Torsades de pointes を含む)があらわれるとの報告がある。  
(〔VIII.8. (2) 重大な副作用と初期症状〕の項参照)

---

## Ⅱ. 名称に関する項目

---

### 1. 販売名

(1) 和名：

エバスタチン錠 5mg 「CH」

エバスタチン錠 10mg 「CH」

(2) 洋名：

EBASTINE Tablets 5mg “CH”

EBASTINE Tablets 10mg “CH”

(3) 名称の由来：

一般名＋剤形＋含量＋「CH」

### 2. 一般名

(1) 和名(命名法)：

エバスタチン(JAN)


(2) 洋名(命名法)：

Ebastine (JAN, INN)

(3) ステム：

抗ヒスタミン薬：-astine

### 3. 構造式又は示性式



### 4. 分子式及び分子量

分子式：C<sub>32</sub>H<sub>39</sub>NO<sub>2</sub>

分子量：469.66

5. 化学名(命名法)

1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)piperidin-1-yl]butan-1-one (IUPAC)

6. 慣用名, 別名, 略号, 記号番号

なし

7. CAS 登録番号

90729-43-4



---

### Ⅲ. 有効成分に関する項目

---

#### 1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状：

白色の結晶又は結晶性の粉末である。  
光によって徐々に帯黄白色となる。

(2) 溶解性：

酢酸(100)に溶けやすく、メタノールにやや溶けやすく、エタノール(95)にやや溶けにくく、水にほとんど溶けない。

(3) 吸湿性：

該当資料なし

(4) 融点(分解点), 沸点, 凝固点：

融点：84～87℃

(5) 酸塩基解離定数：

該当資料なし

(6) 分配係数：

該当資料なし

(7) その他の主な示性値：

該当資料なし

#### 2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

#### 3. 有効成分の確認試験法

日局「エバスチン」の確認試験による。

(1) 1,3-ジニトロベンゼン試液及び水酸化ナトリウム試液による呈色反応  
放置するとき、液は紫色～赤紫色を呈し、徐々に褐色に変わる。

(2) 紫外可視吸光度測定法

本品のスペクトルと本品の参照スペクトルを比較するとき、両者のスペクトルは同一波長のところに同様の強度の吸収を認める。

(3) 赤外吸収スペクトル測定法(臭化カリウム錠剤法)

本品のスペクトルと本品の参照スペクトルを比較するとき、両者のスペクトルは同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。

#### 4. 有効成分の定量法

日局「エバスチン」の定量法による。

0.1mol/L 過塩素酸による滴定(電位差滴定法)

## IV. 製剤に関する項目




### 1. 剤形

#### (1) 剤形の区別, 外観及び性状 :

錠 5mg

剤形・性状 : 白色のフィルムコーティング錠




外形 :

表	裏	側面	直径	6.1 mm
			厚さ	3.1 mm
			重量	90 mg

錠 10mg

剤形・性状 : 片面割線入りのキャブレット型の白色のフィルムコーティング錠

外形 :

表	裏	側面	長径	10.2 mm
			短径	5.1 mm
			厚さ	3.7 mm
			重量	180 mg

#### (2) 製剤の物性 :

該当資料なし

#### (3) 識別コード :

錠 5mg : CH183

錠 10mg : CH184

#### (4) pH, 浸透圧比, 粘度, 比重, 無菌の旨及び安定な pH 域等 :

該当しない

### 2. 製剤の組成

#### (1) 有効成分(活性成分)の含量 :

錠 5mg : 1 錠中 日局 エバスチン 5mg 含有

錠 10mg : 1 錠中 日局 エバスチン 10mg 含有

(2) 添加物 :

錠 5mg	錠 10mg
部分アルファー化デンプン, 結晶セルロース, ヒドロキシプロピルセルロース, クロスポビドン, ステアリン酸マグネシウム, ヒプロメロース, タルク, 酸化チタン, マクロゴール 6000, カルナウバロウ	

(3) その他 :

該当しない

3. 懸濁剤, 乳剤の分散性に対する注意

該当しない

4. 製剤の各種条件下における安定性

(1) 加速試験

錠 5mg<sup>1)</sup>

加速試験(40°C, 相対湿度 75%, 6 ヶ月)の結果, 通常の市場流通下において 3 年間安定であることが推測された。

保存形態	試験項目	開始時	1 ヶ月	3 ヶ月	6 ヶ月
PTP 包装 + アルミピロー	性状	適合	適合	適合	適合
	確認試験※1	適合	—	—	適合
	確認試験※2	適合	適合	適合	適合
	溶出試験	87.6%	—	—	86.0%
	含量 均一性試験	適合	—	—	適合
	定量試験	99.6%	100.0%	100.4%	100.1%
	水分試験	適合	適合	適合	適合
	純度試験	適合	—	—	適合

※1 (1) 1, 3-ジニトロベンゼン試液及び薄めた水酸化ナトリウム溶液による確認

※2 (2) 吸収スペクトルによる確認

(3) 薄層クロマトグラフィーによる確認

錠 10mg <sup>2)</sup>

加速試験(40℃, 相対湿度 75%, 6 ヶ月)の結果, 通常の市場流通下において 3 年間安定であることが推測された。

保存形態	試験項目	開始時	1 ヶ月	3 ヶ月	6 ヶ月
PTP 包装 + アルミピロー	性状	適合	適合	適合	適合
	確認試験※1	適合	—	—	適合
	確認試験※2	適合	適合	適合	適合
	含量 均一性試験	適合	—	—	適合
	溶出試験	88.4%	—	—	87.5%
	定量試験	100.2%	100.1%	101.2%	101.2%
	水分試験	適合	適合	適合	適合
	純度試験	適合	—	—	適合

※1 (1) 1, 3-ジニトロベンゼン試液及び薄めた水酸化ナトリウム溶液による確認

※2 (2) 吸収スペクトルによる確認

(3) 薄層クロマトグラフィーによる確認

(2) 無包装状態での安定性試験

錠 5mg

保存条件	保存期間	結果
25℃, 60%RH, 遮光・開放	3 ヶ月	変化あり※1 (規格外) (△)
40℃, 75%RH, 遮光・開放	3 ヶ月	変化あり※1 (規格外) (△)
25℃, 60%RH, 120 万 lux・hr, 開放	30 日	変化あり※2 (規格外) (△)

※1 純度試験

※2 規格外：純度試験(但し、硬度は規格内)

錠 10mg

保存条件	保存期間	結果
25℃, 60%RH, 遮光・開放	3 ヶ月	変化あり※1 (規格外) (△)
40℃, 75%RH, 遮光・開放	3 ヶ月	変化あり※1 (規格外) (△)
25℃, 60%RH, 120 万 lux・hr, 開放	30 日	変化あり※1 (規格外) (△)

※1 規格外：純度試験(但し、硬度は規格内)

試験項目：外観, 含量, 硬度, 溶出性, 純度試験

「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)」(平成 11 年 8 月 20 日(社)日本病院薬剤師会学術第 5 小委員会)の評価分類基準(下記)に準じる(純度試験の項目については、社内的に判定を追加)。

◎：すべての測定項目において変化を認めなかった。

(外観：変化をほとんど認めない。含量：3%未満の低下。硬度：30%未満の変化。溶出性：規格値内。純度試験：規格値内。)

○：いずれかの測定項目で「規格内」の変化を認めた。

(外観：わずかな色調変化(退色等)等を認めるが、品質上、問題とならない程度の変化であり、規格を満たしている。含量：3%以上の低下で、規格値内。硬度：30%以上の変化で、硬度が 2.0kgf 以上。)

△：いずれかの測定項目で「規格外」の変化を認めた。

(外観：形状変化や著しい色調変化等を認め、規格を逸脱している。含量：規格値外。硬度：30%以上の変化で、硬度が 2.0kgf 未満。溶出性：規格値外。純度試験：規格値外。)

5. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

6. 他剤との配合変化(物理化学的変化)

該当資料なし

## 7. 溶出性

### (1) 溶出規格

#### 錠 5mg

日本薬局方医薬品各条 エバスチン錠溶出規格に適合する。

試験法：日局溶出試験法(パドル法)

条件：回転数 50rpm

試験液 pH4.0 の薄めた McIlvaine の緩衝液

結果：30 分間 75%以上

#### 錠 10mg

日本薬局方医薬品各条 エバスチン錠溶出規格に適合する。

試験法：日局溶出試験法(パドル法)

条件：回転数 50rpm

試験液 pH4.0 の薄めた McIlvaine の緩衝液

結果：30 分間 75%以上

### (2) 生物学的同等性試験における溶出試験結果

#### 錠 5mg<sup>3)</sup>


「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン(平成 13 年 5 月 31 日 医薬審発第 786 号)」に従い、標準製剤との溶出挙動の同等性を判定した結果、両製剤の溶出挙動は同等であった。

試験法	パドル法
試験液/回転数	①pH1.2/50rpm ②pH4.0/50rpm ③pH6.8/50rpm ④水/50rpm ⑤pH4.0/100rpm


#### [判定基準]

- ①②⑤：試験製剤は 15 分以内に平均 85%以上溶出する。又は、15 分において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。
- ③④：標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±a%の範囲にある。a は、溶出率が 50%以上の場合には「15」、50%未満の場合には「8」とする。又は、f 2 関数の値は溶出率が 50%以上の場合には 50 以上、50%未満の場合には 55 以上である。


①pH1.2, 50rpm



②pH4.0, 50rpm




③pH6.8, 50rpm






④水, 50rpm



⑤pH4.0, 100rpm



錠 10mg<sup>4)</sup>


「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン(平成 13 年 5 月 31 日 医薬審発第 786 号)」に従い, 標準製剤との溶出挙動の同等性を判定した結果, 両製剤の溶出挙動は同等であった。

試験法	パドル法
試験液/回転数	①pH1.2/50rpm ②pH4.0/50rpm ③pH6.8/50rpm ④水/50rpm ⑤pH4.0/100rpm


[判定基準]

- ①：試験製剤は 15 分以内に平均 85%以上溶出する。又は, 15 分において, 試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率 $\pm 15\%$ の範囲にある。
- ②⑤：標準製剤の平均溶出率が 60%及び 85%付近の適当な 2 時点において, 試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率 $\pm 15\%$ の範囲にある。又は  $f_2$  関数の値は 45 以上である。
- ③④：標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点, 及び規定された試験時間において, 試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率 $\pm a\%$ の範囲にある。 $a$  は, 溶出率が 50%以上の場合には「15」, 50%未満の場合には「8」とする。又は,  $f_2$  関数の値は溶出率が 50%以上の場合には 50 以上, 50%未満の場合には 55 以上である。


①pH1.2, 50rpm




②pH4.0, 50rpm




③pH6.8, 50rpm



④水, 50rpm



⑤pH4.0, 100rpm



8. 生物学的試験法

該当しない

9. 製剤中の有効成分の確認試験法

日局「エバスチン錠」の確認試験による。  
紫外可視吸光度測定法  
極大吸収波長：251～255nm

10. 製剤中の有効成分の定量法

日局「エバスチン錠」の定量法による。  
液体クロマトグラフィー

11. 力価

該当しない

12. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報

該当しない

14. その他

該当しない

---

## V. 治療に関する項目

---

### 1. 効能又は効果

蕁麻疹  
湿疹・皮膚炎, 痒疹, 皮膚瘙癢症  
アレルギー性鼻炎

### 2. 用法及び用量

通常, 成人には, エバスチンとして1回5～10mgを1日1回経口投与する。  
なお, 年齢・症状により適宜増減する。

### 3. 臨床成績

(1) 臨床データパッケージ :

該当しない

(2) 臨床効果 :

該当資料なし

(3) 臨床薬理試験 :

該当資料なし

(4) 探索的試験 :

該当資料なし

(5) 検証的試験 :

1) 無作為化並行用量反応試験 :

該当資料なし

2) 比較試験 :

該当資料なし

3) 安全性試験 :

該当資料なし

4) 患者・病態別試験 :

該当資料なし

(6) 治療的使用 :

1) 使用成績調査・特定使用成績調査(特別調査)・製造販売後臨床試験

(市販後臨床試験) :

該当資料なし

2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要：  
該当しない

---

## VI. 薬効薬理に関する項目

---

### 1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群

エピナスチン塩酸塩, セチリジン塩酸塩, オキサトミド等

### 2. 薬理作用

#### (1) 作用部位・作用機序<sup>5)</sup> :

ヒスタミン H<sub>1</sub> 受容体遮断薬。H<sub>1</sub> 受容体を介するヒスタミンによるアレルギー性反応(毛細血管の拡張と透過性亢進, 気管支平滑筋の収縮, 知覚神経終末刺激による痒痒, など)を抑制する。これに加えて, ケミカルメディエーター遊離抑制作用を有する点が, 古典的抗ヒスタミン薬とは異なる。なお, 本薬の作用の大部分は活性代謝物のカレバスチンの作用である。

#### (2) 薬効を裏付ける試験成績 :

該当資料なし

#### (3) 作用発現時間・持続時間 :

該当資料なし

## VII. 薬物動態に関する項目

### 1. 血中濃度の推移・測定法

(1) 治療上有効な血中濃度：

該当資料なし

(2) 最高血中濃度到達時間：


〔(3)臨床試験で確認された血中濃度〕の項参照

(3) 臨床試験で確認された血中濃度：

生物学的同等性試験

錠 5mg<sup>6)</sup>

エバスチン錠 5mg 「CH」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ 2 錠(エバスチンとして 10mg)を健康成人男子に空腹時単回経口投与して血漿中活性代謝物(カレバスチン)濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC, Cmax)について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80)～log (1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。



	判定パラメータ		参考パラメータ
	AUC <sub>0-72</sub> (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)
エバスチン錠 5 mg 「CH」	2808.5±880.9	106.9±39.8	5.8±0.7
標準製剤 (錠剤、5 mg)	2983.7±977.7	122.3±53.6	5.8±0.7


(Mean±S.D., n=13)

血漿中濃度並びに AUC, Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。



錠 10mg<sup>7)</sup>

エバスチン錠 10mg 「CH」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠(エバスチンとして 10mg)を健康成人男子に空腹時単回経口投与して血漿中活性代謝物(カレバスチン)濃度を測定し,得られた薬物動態パラメータ(AUC, Cmax)について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果, log (0.80)~ log (1.25)の範囲内であり,両剤の生物学的同等性が確認された。



	判定パラメータ		参考パラメータ
	AUC <sub>0-72</sub> (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)
エバスチン錠 10mg 「CH」	2732.2±804.0	108.0±35.5	5.9±0.6
標準製剤 (錠剤、10mg)	2957.5±809.7	118.0±34.6	5.8±0.8

(Mean±S.D., n=16)

血漿中濃度並びに AUC, Cmax 等のパラメータは,被験者の選択,体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(4) 中毒域 :

該当資料なし

(5) 食事・併用薬の影響 :

[VIII.7.相互作用]の項参照

(6) 母集団(ポピュレーション)解析により判明した薬物体内動態変動要因 :

該当資料なし

2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法 :

該当資料なし

- (2) 吸収速度定数 :  
該当資料なし
- (3) バイオアベイラビリティ :  
該当資料なし
- (4) 消失速度定数 :  
該当資料なし
- (5) クリアランス :  
該当資料なし
- (6) 分布容積 :  
該当資料なし
- (7) 血漿蛋白結合率 :  
該当資料なし

### 3. 吸収

該当資料なし

### 4. 分布

- (1) 血液－脳関門通過性 :  
該当資料なし
- (2) 血液－胎盤関門通過性 :  
該当資料なし
- (3) 乳汁への移行性 :  
〔Ⅷ.10.妊婦,産婦,授乳婦等への投与〕の項参照
- (4) 髄液への移行性 :  
該当資料なし
- (5) その他の組織への移行性 :  
該当資料なし

### 5. 代謝

- (1) 代謝部位及び代謝経路 :  
該当資料なし

(2) 代謝に関与する酵素(CYP450 等)の分子種 :

[VIII.7.相互作用]の項参照

(3) 初回通過効果の有無及びその割合 :

該当資料なし

(4) 代謝物の活性の有無及び比率 :

該当資料なし

(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ :

該当資料なし

## 6. 排泄

(1) 排泄部位及び経路 :

該当資料なし

(2) 排泄率 :

該当資料なし

(3) 排泄速度 :

該当資料なし

## 7. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

## 8. 透析等による除去率

該当資料なし

## VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

### 1. 警告内容とその理由

該当しない(現段階では定められていない)

### 2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)

#### 【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

### 3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由

該当しない

### 4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由

該当しない

### 5. 慎重投与内容とその理由

肝障害またはその既往歴のある患者[肝機能異常があらわれるおそれがある。]

### 6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法

- (1) 眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には**自動車の運転など危険を伴う機械の操作に注意させること。**
- (2) 長期ステロイド療法を受けている患者で本剤投与によりステロイドの減量をはかる場合は、十分な管理下で徐々に行うこと。
- (3) 本剤を季節性の患者に投与する場合は、好発季節を考慮して、その直前から投与を開始し、好発季節終了時まで続けることが望ましい。

### 7. 相互作用

本剤は、主として代謝酵素 CYP2J2 及び CYP3A4 で代謝される。

#### (1) 併用禁忌とその理由：

該当しない(現段階では定められていない)

(2) 併用注意とその理由：

薬剤名	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
エリスロマイシン	本剤の代謝物カレバ スチンの血漿中濃度 が約 2 倍に上昇する ことが報告されてい る。	カレバスチンの代謝 が抑制されると考え られる。
イトラコナゾール	本剤の代謝物カレバ スチンの血漿中濃度 が上昇することが報 告されている。	
リファンピシン	本剤の代謝物カレバ スチンの血漿中濃度 が低下することが報 告されている。	カレバスチンの代謝 が促進されると考え られる。

## 8. 副作用

(1) 副作用の概要：

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(2) 重大な副作用と初期症状：

1) 重大な副作用(頻度不明)

① ショック, アナフィラキシー：ショック, アナフィラキシーがあらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 血圧低下, 呼吸困難, 喉頭浮腫等の症状が認められた場合には, 投与を中止し, 適切な処置を行うこと。

② 肝機能障害, 黄疸：AST (GOT), ALT (GPT), LDH,  $\gamma$ -GTP, ALP, ビリルビンの上昇等を伴う肝機能障害, 黄疸があらわれることがあるので, 観察を十分に行い, 異常が認められた場合には, 投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

2) 類薬による重大な副作用

類薬(テルフェナジン等)で, QT 延長, 心室性不整脈(Torsades de pointes を含む)があらわれるとの報告がある。

(3) その他の副作用：

	頻度不明
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹, 浮腫, 蕁麻疹
循環器	動悸, 血圧上昇
精神神経系	眠気, 倦怠感, 頭痛, めまい, しびれ感, 不眠
消化器	口渇, 胃部不快感, 嘔気・嘔吐, 腹痛, 鼻・口腔内乾燥, 下痢, 舌炎
肝臓	AST (GOT), ALT (GPT), LDH, $\gamma$ -GTP, ALP, ビリルビンの上昇
泌尿器	排尿障害, 頻尿
その他	好酸球増多, 胸部圧迫感, ほてり, 体重増加, 月経異常, 脱毛, 味覚異常, BUN の上昇, 尿糖

注) このような症状があらわれた場合には, 投与を中止すること。

(4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧：

該当資料なし

(5) 基礎疾患, 合併症, 重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度：

該当資料なし

(6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法：

[2.禁忌内容とその理由]

[8.副作用]の項参照

## 9. 高齢者への投与

1日1回5mgから投与するなど注意すること。[一般に高齢者では生理機能が低下している。]

## 10. 妊婦, 産婦, 授乳婦等への投与

- (1) 妊婦または妊娠している可能性のある婦人には, 治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]
- (2) 本剤投与中は授乳を避けさせること。[動物実験(ラット)で乳汁中への移行が報告されている。]

#### 11. 小児等への投与

低出生体重児, 新生児, 乳児または幼児に対する安全性は確立していない(使用経験が少ない)。

#### 12. 臨床検査結果に及ぼす影響

本剤はアレルギー皮内反応を抑制するため, アレルギー皮内反応検査を実施する前は, 本剤を投与しないこと。

#### 13. 過量投与

該当資料なし

#### 14. 適用上の注意

薬剤交付時 : PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。(PTP シートの誤飲により, 硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し, 更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)

#### 15. その他の注意

該当資料なし

#### 16. その他

該当しない

---

## Ⅸ. 非臨床試験に関する項目

---

### 1. 薬理試験

- (1) 薬効薬理試験([Ⅵ. 薬効薬理に関する項目]参照) :
- (2) 副次的薬理試験 :  
該当資料なし
- (3) 安全性薬理試験 :  
該当資料なし
- (4) その他の薬理試験 :  
該当資料なし

### 2. 毒性試験

- (1) 単回投与毒性試験 :  
該当資料なし
- (2) 反復投与毒性試験 :  
該当資料なし
- (3) 生殖発生毒性試験 :  
該当資料なし
- (4) その他の特殊毒性 :  
該当資料なし



---

## X. 管理的事項に関する項目

---

### 1. 規制区分

- (1) 製剤：該当しない
- (2) 有効成分：該当しない

### 2. 有効期間又は使用期限

使用期限：3年(安定性試験結果に基づく)

### 3. 貯法・保存条件

室温保存, 気密容器

### 4. 薬剤取扱い上の注意点

- (1) 薬局での取り扱い上の留意点について：

該当資料なし

- (2) 薬剤交付時の取り扱いについて(患者等に留意すべき必須事項等)：

[VIII.6.重要な基本的注意とその理由及び処置方法]

[VIII.14.適用上の注意]の項参照

くすりのしおり：有り

- (3) 調剤時の留意点について：

該当しない

### 5. 承認条件等

該当しない

### 6. 包装

錠 5mg

PTP：100錠(10錠×10)

錠 10mg

PTP：100錠(10錠×10), 500錠(10錠×50)

7. 容器の材質

錠 5mg

PTP : PTP (ポリ塩化ビニルフィルム, アルミニウム箔) + アルミピロー + 紙箱

錠 10mg

PTP : PTP (ポリ塩化ビニルフィルム, アルミニウム箔) + アルミピロー + 紙箱

8. 同一成分・同効薬

同一成分薬 : エバステル®錠 5mg, エバステル®錠 10mg, エバステル®OD 錠 5mg, エバステル®OD 錠 10mg

同効薬 : エピナスチン塩酸塩, セチリジン塩酸塩, オキサトミド等

9. 国際誕生年月日

不明

10. 製造販売承認年月日及び承認番号

販売名	承認年月日	承認番号
エバスチン錠 5mg 「CH」	2008年3月14日	22000AMX01146000
エバスチン錠 10mg 「CH」	2008年3月14日	22000AMX01145000

11. 薬価基準収載年月日

販売名	薬価基準収載年月日	薬価基準経過措置期限
エバスチン錠 5mg 「CH」	2008年7月4日	—
エバスチン錠 10mg 「CH」	2008年7月4日	—

12. 効能又は効果追加, 用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

該当しない

13. 再審査結果, 再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

#### 14.再審査期間

該当しない

#### 15.投薬期間制限医薬品に関する情報

本剤は,投薬期間に関する制限は定められていない。

#### 16.各種コード

販売名	HOT (9桁)番号	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	レセプト電算 コード
エバスチン錠 5mg 「CH」	118623903	4490019F1036	620007973
エバスチン錠 10mg 「CH」	118630703	4490019F2032	620007986

#### 17.保険給付上の注意

本剤は,診療報酬上の後発医薬品である。

---

## X I . 文献

---

### 1. 引用文献

- 1) 長生堂製薬株式会社 社内資料(安定性試験に関する資料)
- 2) 長生堂製薬株式会社 社内資料(安定性試験に関する資料)
- 3) 長生堂製薬株式会社 社内資料(溶出試験に関する資料)
- 4) 長生堂製薬株式会社 社内資料(溶出試験に関する資料)
- 5) 第十六改正日本薬局方解説書
- 6) 長生堂製薬株式会社 社内資料(生物学的同等性試験に関する資料)
- 7) 長生堂製薬株式会社 社内資料(生物学的同等性試験に関する資料)

### 2. その他の参考文献

該当資料なし

---

## X II. 参考資料

---

### 1. 主な外国での発売状況

該当資料なし

### 2. 海外における臨床支援情報

該当資料なし

---

### XⅢ. 備考

---

その他の関連資料

該当資料なし