

※※2019年5月改訂（第4版）

※ 2011年8月改訂

貯 法：直射日光をさけ、吸湿注意。

開封後は密閉保存。

使用期間：3年（使用期限は外箱・ラベルに表示）

日本標準商品分類番号	
875200	
承認番号	21900AMX00641000
薬価収載	2007.7
販売開始	2007.7
	*1987.12

\*旧販売名による

漢方製剤

## クラシエ 半夏厚朴湯 エキス錠

(ハン ゲ コウ ボク トウ)

**EKT-16**

### 〔組成・性状〕

#### 1. 組成

本薬 1 日量（12錠）中

日局ハンゲ ……………6.0g

日局ブクリョウ ……………5.0g

日局コウボク ……………3.0g

日局ソヨウ ……………2.0g

日局ショウキョウ ……………1.3g

上記の混合生薬より抽出した日局半夏厚朴湯エキス  
1,500mgを含有する。

添加物として日局ポビドン、日局合成ケイ酸アルミニウム、日局カルメロースカルシウム、日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロースを含有する。

#### 2. 製剤の性状

本薬は、特異なおいがあり、味はわずかに甘く苦い。

剤形 (色・形状)	外形	大きさ
淡かっ色 ～かっ色 素 錠	表 裏 側面 ○ ○ ⊖	直径 9mm 厚さ 5.0mm 重量 300mg

### 〔効能・効果〕

気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：

不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声

### 〔用法・用量〕

通常、成人 1 日12錠を 2～3 回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

### 〔使用上の注意〕

#### 1. 重要な基本的注意

(1)本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

(2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

#### 2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
※過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、発赤、痒痒等
※※肝臓	肝機能異常（AST、ALT等の上昇）

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

#### 3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

#### 4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

#### 5. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない〕

### 〔包装〕

クラシエ半夏厚朴湯エキス錠

168錠（4錠×3連包×14シート）

1,764錠（4錠×3連包×147シート）

### 〔文献請求先〕

クラシエ薬品株式会社 医薬学術部

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL 03(5446)3352 FAX 03(5446)3371

### 〔製品情報お問合せ先〕

クラシエ薬品株式会社 お客様相談センター

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL 03(5446)3334 FAX 03(5446)3374

〈受付時間〉10:00～17:00(土、日、祝日、弊社休業日を除く)

発 売 元 **クラシエ薬品株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(郵便番号 108-8080)

製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**

奈良県大和高田市根成柿574番地(郵便番号635-0051)