

漢方製剤
オースギ四苓湯細粒(調剤用)
し れい とう
(四 苓 湯)

承認番号	(54AM) 第1607号
薬価収載	1981年9月
販売開始	1981年9月

貯法：室温保存 「取扱い上の注意」 の項参照 使用期限：容器又は外箱に表示
--

【組成・性状】

(1)本剤は1日量3.0g中、下記の生薬末を含有する。

日局タクシャ末 0.75g	日局ソウジュツ末 0.75g
日局ブクリョウ末 0.75g	日局チョレイ末 0.75g

(2)本剤は暗褐色～灰褐色の細粒で、特異なにおいがあり、味はやや苦い。

識別コード：SG - 140

(2)高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているため減量するなど注意すること。

(3)妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

(4)小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

【効能又は効果】

のどが渇いて水を飲んでも尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：暑気あたり、急性胃腸炎、むくみ

【取扱い上の注意】

- ・直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、色や味等に多少の差異を生じることがありますが、効果に変わりありません。

【用法及び用量】

成人1回1.0g、15歳未満7歳以上1回成人の2/3量、7歳未満4歳以上1回成人の1/2量、4歳未満2歳以上1回成人の1/3量、2歳未満1回成人の1/4量、いずれも1日3回食前または食間に水または白湯にて経口投与する。

【包装】

500g
 294g (1.0g × 294包)
 84g (1.0g × 84包)

【使用上の注意】

(1)重要な基本的注意

- 1)本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

【文献請求先】(お問い合わせ先)

大杉製薬株式会社 医薬情報部
 〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6
 TEL 050-3776-0358