

日本標準商品分類番号	
875200	
承認番号	(61AM) 3845
薬価収載	2007.7
販売開始	2007.7 *1986.10

\*旧販売名による

## 漢方製剤

# クラシエ 安中散料 エキス細粒

アンチュウサンリョウ

KB-5 EK-5

## 〔組成・性状〕

### 1. 組成

本薬1日量（6.0g）中

日局ケイヒ …………… 4.0g

日局エンゴサク …………… 3.0g

日局ボレイ …………… 3.0g

日局ウイキョウ …………… 1.5g

日局シュクシャ …………… 1.0g

日局カンゾウ …………… 1.0g

日局リョウキョウ …………… 0.5g

上記の混合生薬より抽出した安中散料エキス粉末  
1,200mgを含有する。

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局結晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素を含有する。

### 2. 製剤の性状

剤形 (色・形状)	内容量 (1包中)	識別記号
淡黄かつ色～黄かつ色の細粒で、特異なおいがあり、味はわずかに辛く甘い。	3.0g	KB-5
	2.0g	EK-5

## 〔効能・効果〕

やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛または腹痛があって、ときに胸やけ、げっぷ、食欲不振、はきけなどを伴う次の諸症：

神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー

## 〔用法・用量〕

通常、成人1日6.0gを2～3回に分割し、食前又は食前に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

## 〔使用上の注意〕

### 1. 重要な基本的注意

(1)本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

(2)本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場合には投与を中止すること。

(3)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

### 2. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(1)カンゾウ含有製剤 (2)グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパシーがあらわれやすくなる。〔「重大な副作用」の項参照〕	グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。

### 3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

#### (1)重大な副作用

1)偽アルドステロン症：低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。

2)ミオパシー：低カリウム血症の結果としてミオパシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。

#### (2)その他の副作用

	頻度不明
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、発赤、痒痒等

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

### 4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

### 5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

## 6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

### [薬効薬理]

#### 1. 胃粘膜保護作用<sup>1)</sup>

本エキス粉末（胃内投与）は、アスピリンで誘発されたラットの胃粘膜電位差の低下を抑制した。

#### 2. 胃酸分泌抑制作用<sup>2)</sup>

本エキス粉末（腹腔内投与）は、胃酸分泌刺激薬であるヒスタミン及び2-deoxy-D-glucoseで誘発されたラットの胃酸分泌の増加を抑制した。

#### 3. 実験的胃粘膜損傷に及ぼす作用<sup>3)</sup>

本エキス粉末（経口投与）は、エタノールおよびアスピリンで誘発されるラットの胃粘膜損傷の形成を抑制した。

### [包装]

クラシエ安中散料エキス細粒

1. **KB-5** 3.0g×28包  
3.0g×168包
2. **EK-5** 2.0g×42包  
2.0g×294包  
500g

### [主要文献]

- 1) 高瀬英樹ほか: 日本薬理学雑誌, **89**, 299 (1987)
- 2) 高瀬英樹ほか: 日本薬理学雑誌, **91**, 309 (1988)
- 3) 高瀬英樹ほか: 日本薬理学雑誌, **91**, 319 (1988)

### [文献請求先]

クラシエ薬品株式会社 医薬学術部

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

※TEL 03(5446)3352 FAX 03(5446)3371

### ※[製品情報お問合せ先]

クラシエ薬品株式会社 お客様相談センター

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL 03(5446)3334 FAX 03(5446)3374

〈受付時間〉10:00~17:00(土、日、祝日、弊社休業日を除く)

発売元

**クラシエ薬品株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(郵便番号 108-8080)

製造販売元

**クラシエ製薬株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(郵便番号 108-8080)