

※※2019年5月改訂（第4版）

※ 2011年8月改訂

貯 法：直射日光をさけ、吸湿注意。

開封後は密栓保存。

使用期間：3年（使用期限は外箱・ラベルに表示）

日本標準商品分類番号	
875200	
承認番号	(61AM) 3848
薬価収載	2007.7
販売開始	2007.7 *1986.10

\*旧販売名による

## 漢方製剤

# クラシエ 半夏厚朴湯 エキス細粒

ハン ゲ コウ ボク トウ

**KB-16** **EK-16**

### 〔組成・性状〕

#### 1. 組成

本薬1日量（6.0g）中

日局ハンゲ …………… 6.0g

日局ブクリョウ …………… 5.0g

日局コウボク …………… 3.0g

日局ソヨウ …………… 2.0g

日局ショウキョウ …………… 1.3g

上記の混合生薬より抽出した日局半夏厚朴湯エキス  
1,500mgを含有する。

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局結  
晶セルロース、日局乳糖水和物、含水二酸化ケイ素を  
含有する。

#### 2. 製剤の性状

剤形 (色・形状)	内容量 (1包中)	識別記号
淡かつ色～かつ色の細粒で、 特異なおいがあり、味はわ ずかに甘く苦い。	3.0g	KB-16
	2.0g	EK-16

### 〔効能・効果〕

気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに  
動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：

不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声

### 〔用法・用量〕

通常、成人1日6.0gを2～3回に分割し、食前又は食間  
に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

### 〔使用上の注意〕

#### 1. 重要な基本的注意

(1)本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）  
を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察  
し、症状・所見の改善が認められない場合には、継  
続投与を避けること。

(2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に  
注意すること。

#### 2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確とな  
る調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
※過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、発赤、瘙痒等
※※肝臓	肝機能異常（AST、ALT等の上昇）

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中  
止すること。

#### 3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量  
するなど注意すること。

#### 4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、  
妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療  
上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にの  
み投与すること。

#### 5. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験  
が少ない〕

### 〔包装〕

クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒

- KB-16** 3.0g×28包  
3.0g×168包
- EK-16** 2.0g×42包  
2.0g×294包  
500g

### 〔文献請求先〕

クラシエ薬品株式会社 医薬学術部  
〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20  
TEL 03(5446)3352 FAX 03(5446)3371

### 〔製品情報お問合せ先〕

クラシエ薬品株式会社 お客様相談センター  
〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20  
TEL 03(5446)3334 FAX 03(5446)3374  
〈受付時間〉10:00～17:00(土、日、祝日、弊社休業日を除く)

発 売 元 **クラシエ 薬品株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20(郵便番号 108-8080)

製造販売元 **クラシエ 製薬株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20(郵便番号 108-8080)