

※2014年 3月改訂 (第5版)
※2010年 4月改訂

日本標準商品分類番号	872615
承認番号	21600AMY00112000
薬価収載	2004年8月
販売開始	2004年9月

◇貯法：遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存
◇使用期限：ラベルに記載

日本薬局方
**消毒用
エタノール**
殺菌消毒剤

**Ethanol
for Disinfection**

火気厳禁 第4類アルコール類
水溶性 危険等級II **10L**

消毒用エタノール「トライックス」

【禁忌】(次の部位には使用しないこと)

損傷皮膚及び粘膜
(損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。)

【組成・性状】

エタノール (C₂H₆O) 76.9~81.4vol% を含有。
無色澄明の液で、特異なおい及びやくような味がある。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、
医療機器の消毒

【用法・用量】

本品をそのまま消毒部位に塗布する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本注意

- (1) 眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合は直ちに水でよく洗い流してください。
(2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

2. 副作用


本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類/頻度	頻度不明
過敏症 [※]	発疹等
皮膚 [※]	刺激症状

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

※製造販売元(輸入元)
株式会社トライックス
東京都中央区築地 4-2-7

製造番号(LOT) 使用期限(EXP)



キャップ:PP
ボトル:PE

3. 適用上の注意

- (1) 人体 ◇投与経路：外用にのみ使用すること。◇使用時：同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
(2) その他 ◇使用時：本剤は、血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。◇器具等材質：(ア) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、長時間浸漬しないこと。(イ) 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐食を防止するために0.2~1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。

4. その他の注意

◇承認外の経皮的エタノール注入療法(PEIT)使用例で、注入時の疼痛、酩酊感、発熱、本剤の局所外流出による重篤な胆道・腹腔内等の出血、肝梗塞、肝不全等が報告されている。

【薬効薬理】

本剤は使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌)及び一部のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 引火性、爆発性があるため、火気(電気メス使用時等も含む)には十分注意すること。
(2) 衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意すること。
(3) 開封時、容器の肩部又は底部を持ち、液がとびださないようにキャップをあけること。

※【文献請求先】

株式会社トライックス
TEL: 03-6226-5855 FAX: 03-6226-5856