

貯法：室温保存
使用期限：容器・外箱に記載の使用期限内に使用してください。
注意：取扱い上の注意の項参照

承認番号	(61AM)4662
薬価収載	1987年10月
販売開始	1987年10月

商品番号 | N40

漢方製剤

コタロー

猪苓湯 エキス細粒
ちよ れい とう

〔組成・性状〕

** (1) 組成

本剤6.0g中
日局 タクシャ……………3.0g
日局 チョレイ……………3.0g
日局 ブクリョウ……………3.0g
日局 カッセキ……………3.0g

上記の混合生薬より抽出した猪苓湯の水製乾燥エキス1.2gと
日局 ゼラチン……………3.0g

を含有する。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ
ン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウ
ムを含有する。

(2) 製剤の性状

本剤は褐色～黄褐色の細粒で、特異なおいがあり、味はやや
甘い。

識別コード：N40

〔効能・効果〕

咽喉がかわき、排尿痛あるいは排尿困難があり、尿の色は赤い
か、または血液の混じるもの、あるいは腰や下肢に浮腫がある
もの。

腎炎、ネフローゼ、膀胱カタル、尿道炎、腎臓・膀胱結石によ
る排尿困難。

〔用法・用量〕

通常、成人1日6.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口
投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

〔使用上の注意〕

(1) 重要な基本的注意

- 1) 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮
して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所
見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 2) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意
すること。

(2) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査
を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹、発赤、痒痒等
消化器	胃部不快感等

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

(3) 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するな
ど注意すること。

(4) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦
又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性
が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。

(5) 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少
ない。]

〔取扱い上の注意〕

- (1) 漢方製剤は吸湿しやすいので、湿気を避け、直射日光の当
らない涼しい場所に保管してください。
特に、ポリ瓶の場合はキャップを強く締めて保管してくだ
さい。
- (2) 本剤は天然の生薬を原料としておりますので、ロットにより
色調等に異同がありますが、効能その他に変わりはありません。

〔包 装〕

コタロー猪苓湯エキス細粒

ポリ瓶 500g
分包 2.0g×231包(462g)
2.0g×42包(84g)

*〔資料請求先〕

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部
〒531-0071
大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06-6371-9106 FAX 06-6377-4140
(9:00～17:30/土、日、祝日、弊社休日を除く)

製造販売元



小太郎漢方製薬株式会社
大阪市北区中津2丁目5番23号