

貯法：室温保存
使用期限：容器・外箱に記載の使用期限内に使用してください。
注意：取扱い上の注意の項参照

商品番号 T72

承認番号	(41A)6819
薬価収載	1967年7月
販売開始	1967年7月
再評価結果	1983年4月

生薬製剤

ヨクイニンエキス錠「コタロー」

〔組成・性状〕

(1) 組成

本剤18錠中に日局ヨクイニンより抽出した水製乾燥エキス2.0gを含有する。

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖水和物を含有する。

(2) 製剤の性状

本剤は灰白色～淡かっ色の錠剤で、ほとんどにおいはなく、味はわずかに甘い。

識別コード：T72

〔効能・効果〕

青年性扁平疣贅、尋常性疣贅。

〔用法・用量〕

ヨクイニンエキスとして、通常成人1日1.0～2.0gを3回に分割経口投与する。(ヨクイニンエキス錠「コタロー」は、通常成人1日9～18錠を3回に分割経口投与する)

なお、年齢、症状により適宜増減する。

〔使用上の注意〕

(1) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹、発赤、痒痒、蕁麻疹等
消化器	胃部不快感、下痢等

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

(2) 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

(3) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。

(4) 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少くない。〕

*〔取扱い上の注意〕

- (1) 本剤は吸湿しやすく、生薬特有のにおいがすることがあります。直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。特に、開封後は調剤が済んだら速やかにキャップを固く締めて保管してください。本剤は湿気を帯びた手で触れると褐色に変色したり、変形することがありますので、投薬時に注意を行ってください。
- (2) 本剤をグラシン紙等の包材に分包して投薬する場合は、気密性の高い容器に入れ、湿度の低い場所（冷暗所）に保管してください。また冷所（例えば冷蔵庫など）に保管した場合、取り出し後そのまま放置されると結露により吸湿して変色の原因となりますので、速やかに保管場所に戻すよう投薬時に注意を行ってください。
- (3) 本剤は天然の生薬を原料としていますので、ロットにより色調等に異同がありますが、効能その他に変わりはありません。

**〔包装〕

ヨクイニンエキス錠「コタロー」

1000錠
2000錠
1260錠(126錠×10)
2520錠(252錠×10)

〔資料請求先〕

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部
〒531-0071
大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06-6371-9106 FAX 06-6377-4140
(9:00～17:30/土、日、祝日、弊社休日を除く)

