日本薬局方 消毒用エタノール

日本薬局方 消毒用エタノール

＊2014年10月改訂（第6版）

日本標準商品分類番号
872615

外用殺菌消毒剤

日本薬局方消毒用エタノール

消毒用エタノール

（ミツマル）

貯　法：
遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存。

承認番号	16100AMZ02523000
薬価収載	1986年　3月
販売開始	1986年　3月
再評価結果	1982年　8月

第4類・アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ・火気厳禁

製造販売元
サンケミファ株式会社
仙台市青葉区芋沢字大竹新田８-１
お客様相談室　TEL(022)394-3031

【禁忌（次の部位には使用しないこと）】
損傷皮膚及び粘膜［損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する］

【組成・性状】

1.組成
エタノール（C_2H_6O）76.9～81.4vol%を含む。

2.性状
本剤は無色澄明の液である。本剤は水と混和する。
本剤は点火するとき、淡青色の炎をあげて燃える。
本剤は揮発性である。

【効能・効果】
手指・皮膚の消毒、手術部位（手術野）の皮膚の消毒、医療機器の消毒。

【用法・用量】
本剤をそのまま消毒部位に塗布する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意
（1）本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には直ちに水でよく洗い流すこと。
（2）広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
［エタノール蒸気に大量または繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。］

2.副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類＼頻度	頻度不明
過敏症 注）	発疹等
皮　膚 注）	刺激症状

注）このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3.適用上の注意
（1）投与経路：外用にのみ使用すること。
（2）使用時：
1）同一部位（皮膚面）に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
2）本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
3）合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
4）本剤は、引火性、爆発性があるため、火気（電気メス使用等も含む）には十分注意すること。また、電気メスを使用する場合は、乾燥させてから使用すること。

4.その他の注意
承認外の経皮的エタノール注入療法（PEIT）使用例で、注入時の疼痛、酩酊感、発熱、本剤の局所外流出による重篤な胆道・腹腔内等での出血、肝梗塞、肝不全等が報告されている。

【薬効薬理】
本剤は、使用濃度において、栄養型細菌（グラム陽性菌、グラム陰性菌）、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞（炭疽菌、破傷風菌等）及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

製造番号

使用期限

折りたたんで廃棄しやすいボトルを採用

溝のある方をつぶす。

溝にそってたたむときちんととたためて空気も入りません。

つぶせるボトルなので寒冷時には、へこみ等、変形することがありますが品質には変わりなくお使いいただけます。

＊（個別包装単位用コード）
(01)04987468100106

＊（販売包装単位用コード）
(01)14987468100103

キャップ：PP
ボトル：PE
ラベル：PP

500mL