

漢方製剤

* 劇薬 (500g入容器のみ)

JPS真武湯エキス顆粒〔調剤用〕

しん ぶ とう
(真 武 湯)

承認番号	(61AM) 第4770号
薬価収載	1987年10月
販売開始	1987年10月

貯法：室温保存
「取扱い上の注意」
の項参照
使用期限：容器又は外箱に表示

【組成・性状】

* *1)本剤は1日量7.5g中、下記の混合生薬より抽出した日局真武湯エキス2.6gを含有する。

日局	ブクリョウ	5.0g	日局	シャクヤク	3.0g
日局	ソウジュツ	3.0g	日局	ショウキョウ	1.0g
日局	ブシ末	1.0g			

添加物として、乳糖水和物、ステアリン酸マグネシウム、
ショ糖脂肪酸エステルを含有する。

2)本剤は淡褐色の顆粒剤で、わずかに苦味があり、特異の芳香を有す。

【効能又は効果】

新陳代謝が沈衰しているものの次の諸症：

諸種の熱病、内臓下垂症、胃腸弛緩症、慢性腸炎、慢性腎炎、
じんましん、湿疹、脳出血、脊髄疾患による運動および知覚
麻痺

【用法及び用量】

通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に
経口投与する。なお、年令、体重、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

(1)慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- 1)体力の充実している患者〔副作用があらわれやすくなり、
その症状が増強されるおそれがある。〕
- 2)暑がり、のぼせが強く、赤ら顔の患者〔心悸亢進、の
ぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれるおそれがある。〕

(2)重要な基本的注意

- 1)本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考
慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・
所見の改善が認められない場合には、継続投与を避ける
こと。
- 2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注
意すること。ブシを含む製剤との併用には、特に注意す
ること。

(3)副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調
査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹、発赤、掻痒、蕁麻疹等
その他	心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等

注1)このような症状があらわれた場合には投与を中止す
ること。

(4)高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量する
など注意すること。

(5)妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しない
ことが望ましい。〔本剤に含まれるブシ末の副作用があら
われやすくなる。〕

(6)小児等への投与

小児等には慎重に投与すること。〔本剤にはブシ末が含
まれている。〕

【取扱い上の注意】

（貯法）開封後は、吸湿性があるので、フタをよく閉
めて保存すること。

【包装】

500g

735g (2.5g × 294包)

【文献請求先】（お問い合わせ先）

大杉製薬株式会社 医薬情報部
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6
TEL 050-3776-0358

製造販売元

ジェーピーエス製薬株式会社

栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発売元

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2