

【組成・性状】

100mL中 アクリノール水和物 0.1g

【効能・効果】

化膿局所の消毒

泌尿器・産婦人科術中術後

化膿性疾患(せつ、よう、扁桃炎、副鼻腔炎、中耳炎)

口腔領域における化膿局所の消毒

【用法・用量】

化膿局所の消毒 0.05～0.1%の液として使用する。

含嗽 0.05～0.1%の液で含嗽する。

【使用上の注意】

副作用

本剤は、副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
皮膚 ^{注1)}	塗布部の疼痛、発赤、腫脹、潰瘍、壊死等
過敏症 ^{注2)}	過敏症状

注1)このような症状があらわれた場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。

注2)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

販売名: **アクリノール消毒液0.1%「昭和」**

TRADE MARK



日本標準商品分類番号 872619

外用殺菌消毒剤

承認番号 22000AMX02322000

薬価基準収載

アクリノール 消毒液 0.1% 500mL

昭和製薬株式会社

大阪府守口市南寺方東通1-4-12

【適用上の注意】

1)投与経路:外用にのみ使用すること。

2)調製時:塩素イオンの共存により、塩酸塩を析出することがある。

【取扱い上の注意】

衣類に付着すると黄色に着色し、洗い落としにくいので注意すること。

貯法:室温、しゃ光保存

製造
番号
使用
期限

GS1-RSS

(01) 14950498800305

JAN

4 950498 800308



キャップ
フィルム

ラベル