

\*\*2011年9月改訂(第4版)

\*2007年9月改訂

貯法	できるだけ湿気を避け、直射日光のあたらない涼しい場所に保管のこと。開封後は特に湿気を避け、フタをよく閉める等取扱いに注意のこと。
----	--

使用期限：外箱・容器に表示

日本標準商品分類番号	
875200	
承認番号	(61AM)4482
薬価収載	1987年10月
販売開始	1987年10月

## 漢方製剤（四物湯）

# 太虎堂の四物湯エキス顆粒

### \*〔組成・性状〕

本品7.5g中

日局トウキ……………4.0g 日局センキュウ……………4.0g

日局シャクヤク……………4.0g 日局ジオウ……………4.0g

上記生薬より抽出した水製乾燥エキス5040mgを含有する。

添加物として日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウムを含有する。

性状：本品は淡茶色～灰褐色の顆粒剤で、特異なにおいがあり、味はわずかに甘い。

識別コード：Tai TM-71

### 〔効能・効果〕

皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症：産後あるいは流産後の疲労回復、月経不順、冷え症、しもやけ、しみ、血の道症

### 〔用法・用量〕

通常成人1日7.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

### 〔使用上の注意〕

#### 1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1)著しく胃腸の虚弱な患者〔食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢等があらわれることがある。〕
- (2)食欲不振、悪心、嘔吐のある患者〔これらの症状が悪化するおそれがある。〕

#### 2. 重要な基本的注意

- (1)本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避ける

こと。

- (2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

#### 3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
消化器	食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢等

#### 4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

#### 5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

#### 6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない〕

### \*〔包装〕

500g、2.5g×84包、2.5g×252包

### \*\*〔文献請求先〕

太虎精堂製薬株式会社 薬事情報部  
〒651-0076 神戸市中央区吾妻通2丁目1番27号  
TEL (078) 232-1015 FAX (078) 232-1077

製造販売元



**太虎精堂**

製薬株式会社

神戸市中央区吾妻通2丁目1の27