

生薬製剤  
\*\*劇薬

\***日本薬局方 加エブシ末**  
(オースギ加工ブシ末)

承認番号	21000AMZ00583000
薬価収載	1999年7月
販売開始	1999年7月

貯法：室温保存 「取扱い上の注意」 の項参照 使用期限：容器に表示
--

**【組成・性状】**

- \* (1) 本剤はハナトリカブト又はオクトリカブトの塊根を高圧蒸気処理により毒性を減じた後、粉末とし、一定のアルカロイド量を含むようにトウモロコシデンプンで調整したものである。  
本剤は、総アルカロイド[ベンゾイルアコニン(C<sub>32</sub>H<sub>46</sub>NO<sub>10</sub>: 603.70)として]0.4~1.2%を含む。
- (2) 本剤は淡褐色の粉末で、特異なにおいがある。  
識別コード：SG-205

**【取扱い上の注意】**

- ・直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、色や味等に多少の差異を生じることがありますが、効果に変わりありません。

**【包装】**

100g、500g

**【効能又は効果】**

漢方処方調剤に用いる。

**【文献請求先】** (お問い合わせ先)

大杉製薬株式会社 医薬情報部  
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6  
TEL 050-3776-0358

**【用法及び用量】**

漢方処方調剤に用いる。

**【使用上の注意】**

(1) 慎重投与 (次の患者には慎重に投与すること)

- 1) 体力の充実している患者[副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。]
- 2) 暑がり、のぼせが強く、赤ら顔の患者[心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれるおそれがある。]

(2) 重要な基本的注意

ブシを含む製剤との併用には注意すること。

(3) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
その他	心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等

(4) 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

(5) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。

(6) 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

\*製造販売元

**高砂薬業株式会社** 大阪市阿倍野区天王寺町南2-1-20

発売元

**大杉製薬株式会社** 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2