

外皮用殺菌消毒剤 **2005年 5月改訂 (第3版)
*2003年 7月改訂

日本薬局方

オキシドール

Oxydol

オキシドール「東海」

500mL



**** 製造販売元**
東海製薬株式会社
名古屋市中川区江松一丁目105

貯 法：遮光した気密容器に入れ、30℃以下で保存する。
使用期限：ラベルに記載

日本標準商品分類番号	872614
承認番号	(61AM)1851
薬価収載	1955年9月
販売開始	1955年9月
再評価結果	1983年4月

***【禁忌】(次の部位には使用しないこと)**
瘻孔、挫創等本剤を使用した際に体腔にしみ込むおそれのある部位

【組成・性状】

1.組成

本剤は過酸化水素 (H₂O₂) 2.5~3.5w/v%を含む。
添加物としてアセトアニリドを含有する。

2.性状

本剤は無色澄明の液で、においはないか、又はオゾンのようににおいがある。

【効能・効果】

- 1.創傷・潰瘍の殺菌・消毒
- 2.外耳・中耳の炎症、鼻炎、咽喉頭炎、扁桃炎などの粘膜の炎症
- 3.口腔粘膜の消毒、齦窩及び根管の清掃・消毒、歯の清浄、口内炎の洗口

【用法・用量】

- 1.創傷・潰瘍：原液のままあるいは2~3倍希釈して塗布・洗浄する。
- 2.耳 鼻 咽喉：原液のまま塗布、滴下あるいは2~10倍 (耳科の場合、時にグリセリン、アルコールで希釈する) 希釈して洗浄、噴霧、含嗽に用いる。
- 3.口 腔：口腔粘膜の消毒、齦窩及び根管の清掃・消毒、歯の清浄には原液又は2倍希釈して洗浄・拭掃する。口内炎の洗口には10倍希釈して洗口する。

製造番号

使用期限

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

長期間又は広範囲に使用しないこと。

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

*** (1) 重大な副作用**

空気塞栓：空気塞栓を起こすことがあるので、循環動態に異常を認めた場合など空気塞栓が疑われる症状がみられた場合は、速やかに本剤の使用を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

□ 腔：連用により口腔粘膜刺激 (頻度不明)

3.適用上の注意

人体


(1) 投与経路：外用にのみ使用し、内服しないこと。

(2) 使用時：

- 1) 眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
- 2) 易刺激性の部位に使用する場合には、正常の部位に使用する場合よりも低濃度とすることが望ましい。
- 3) 深い創傷に使用する場合は希釈液としては、注射用水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。

4.その他の注意

長期大量経口投与によりマウスの十二指腸に腫瘍の発生が認められたとの報告がある。



GST (副剤用) 987394105939

GST (販売用) 987394105937

JAN 987394105930

4 987394105930