



外用殺菌消毒剤

飲用不可

# 消毒用エタIP「メタル」

Etha IP for Disinfection

500mL

**火気厳禁** 第四類アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ

使用期限

製造番号

製造販売元

**中北薬品株式会社**

愛知県津島市白浜町字番場52-1



キャップ：PP  
ボトル：PE

Y-4

\*2007年7月改訂（第2版）

2005年7月作成

貯 法：気密容器

遮光して、火気を避けて室温保存

使用期限：容器に表示

日本標準商品分類番号

872615

承認番号 21700AMZ00032

薬価収載 2005年 7月

販売開始 2005年10月

【禁忌（次の部位には使用しないこと）】

損傷皮膚及び粘膜〔刺激作用を有する〕

【組成・性状】

組 成	有効成分	エタノール76.9～81.4vol%
	添加物	イソプロパノール
製剤の性状		無色澄明の液である。

【効能・効果】

\*手指・皮膚の消毒、手術部位（手術野）の皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

本品をそのまま消毒部位に塗布する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。
- (2) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。  
〔エタノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。〕

2. 副作用

本品は副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症注)	発疹 等
皮膚注)	刺激症状

注)このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

4. 適用上の注意

投与経路：外用にのみ使用すること。

使用時：

- (1) 同一部位（皮膚面）に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- \* (2) 血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
- (3) 引火性、爆発性があるため、火気（電気メス使用等も含む）には十分注意すること。

5. その他の注意

経皮的エタノール注入療法(PEIT)には使用しないこと。

【薬効・薬理】

本品は、使用濃度において、栄養型細菌（グラム陽性菌、グラム陰性菌）、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞（炭疽菌、破傷風菌等）及び一部のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

【取扱い上の注意】

- (1) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
- (2) 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐蝕を防止するため0.2～1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。

GS1 <調剤包装単位>



COI104987333021635

GS1 <販売包装単位>



COI114987333019769