


消毒用エタプロコール®

消毒用エタプロコール®

消毒用エタプロコール®

火気厳禁


第 4 類
アルコール類
水 溶 性
危 険 等 級 II



キャップ: PP
ボトル: PE
ラベル: PET

開封日: 年 月 日

外用殺菌消毒剤
ETHAPROCOHOL® FOR DISINFECTION



飲用不可

エタノール76.9~81.4vol%含有

500mL

製造番号

使用期限

発売元

Ⓔ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593

目安として
ご使用
ください

400

300

200

100

消毒用エタプロコール®

2015年2月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872615
承認番号	21500AMZ00503
薬価収載	2004年7月
販売開始	2003年12月

貯 法: 遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存。
使用期限: 3年(表示の使用期限を参照すること。)
注 意: 飲用不可

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】
損傷皮膚及び粘膜(損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。)

【組成・性状】

- 組成
エタノール(C₂H₆O)76.9~81.4vol%
及び添加物としてイソプロパノール 含有。
- 性状
無色澄明の液で、特異なにおいがある。
点火するとき、淡青色の炎をあげて燃える。
揮発性である。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、
医療機器の消毒

【用法・用量】

本品をそのまま消毒部位に塗布する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
(1) 本剤が眼に入らないように注意すること。
眼に入った場合は直ちによく水洗すること。
(2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の
吸入に注意すること。[エタノール及びイソ
プロパノール蒸気に大量に又は繰り返しさら
された場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすこ
とがある。]

- 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確と
なる調査を実施していない。

	頻度不明
過 敏 症 発 現	発 疹 等
皮 膚 刺 激 症 状	刺 激 症 状

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

- 臨床検査結果に及ぼす影響
注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギー
テストの判断を妨害することがある。

- 適用上の注意

投与経路: 外用にのみ使用すること。

使用時:

- 同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、
脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるの
で注意すること。
- 血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にま
で浸透しないことがあるので、これらが付着し
ている医療器具等に用いる場合には、十分に
洗い落としてから使用すること。
- 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器
具、塗装カテーテル等には、変質するものが
あるので、このような器具は長時間浸漬しな
いこと。
- 本剤は引火性、爆発性があるため、火気(電
気メス使用等も含む)には十分注意すること。
また、電気メスによる発火事故が報告されて
いるので、電気メス等を使用する場合には、本
剤を乾燥させ、アルコール蒸気の拡散を確認
してから使用すること。

- その他の注意

経皮的エタノール注入療法(PEIT)には使用しな
いこと。

【薬効薬理】

本剤は、使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌、
グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、
芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び一部のウイルスに対
する効果は期待できない。