

## 広域駆虫剤

処方箋医薬品：  
注意－医師等の処方箋  
により使用すること

# \*コンバントリン®ドライシロップ100mg

## COMBANTRIN® DRY SYRUP 100mg

ピランテルパモ酸塩ドライシロップ製剤

貯 法：しゃ光・室温保存  
使用期限：外箱に記載

* 承認番号	22100AMX00534000
* 薬価収載	2009年9月
販売開始	2007年11月
国際誕生	1970年9月

**【禁忌】**（次の患者には投与しないこと）  
(1)本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者  
(2)ピペラジン系駆虫薬を投与中の患者（「相互作用」の項参照）

### \*【組成・性状】

販売名	コンバントリンドライシロップ100mg
成分・分量 [1g中]	日局 ピランテルパモ酸塩をピランテルとして100mg
色／剤形／風味	橙色／細粒／ヨーグルト様風味
添加物	D-マンニトール、白糖、カルメロースカルシウム、カルメロースナトリウム、サッカリンナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル、香料、黄色5号

### 【効能・効果】

回虫、鉤虫、蟯虫、東洋毛様線虫の駆除

### 【用法・用量】

通常小児に対し体重1kg当りピランテルとして10mgを1回経口投与する。

体重換算による服用量の概算は、次表の通りである。

体 重	10kg	20kg	30kg	40kg	50kg以上
服 用 量	1包	2包	3包	4包	5包

本剤は食事に関係なく投与することができ、また下剤を使用する必要はない。

本剤は、用時適量の水を加えシロップ剤として投与するが、そのまま経口投与することもできる。

なお、投与は1回のみである。

### 【使用上の注意】

#### 1. 相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

薬 剤 名 等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ピペラジン系 駆虫薬	両剤の駆虫作用が減弱するおそれがある。	両剤の駆虫作用が拮抗したとの報告がある <sup>1)</sup> 。

#### \* 2. 副作用<sup>2)</sup>

コンバントリン錠100mgを投与した、9,544例中372例（3.90%）に副作用が認められ、その主なものは腹痛（1.34%）、頭痛（1.17%）、悪心・嘔吐（1.16%）等であった。（副作用調査終了時）次のような副作用が認められた場合には、必要に応じ、減量、投与中止等の適切な処置を行うこと。

種類	頻度	1%以上又は頻度不明	0.1～1%未満	0.1%未満
精神・神経系	頭痛、嗜眠 <sup>*1</sup> 、不眠 <sup>*1</sup>	めまい		
消化器	腹痛、悪心・嘔吐	下痢、食欲不振		
肝 臓	AST(GOT)の上昇 <sup>*2</sup>			

種類	頻度	1%以上又は頻度不明	0.1～1%未満	0.1%未満
過 敏 症 <sup>*3</sup>	痒疹 <sup>*1</sup> 、蕁麻疹 <sup>*1</sup>			発疹
そ の 他	冷汗 <sup>*1</sup> 、多汗 <sup>*1</sup>	倦怠感		

\* 1：文献報告又は外国での報告のため頻度不明。

\* 2：肝障害のある患者には慎重に投与すること（少数例に一過性の軽微なAST(GOT)上昇の報告がある。文献報告のため頻度不明。）

\* 3：発現した場合には投与を中止すること。

#### 3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

#### 4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合のみ投与すること。

#### 5. 小児等への投与

2歳未満の乳・小児に対する安全性は確立していないので、2歳未満の乳・小児に投与する場合には、慎重に投与すること。

### 【薬物動態】

健康成人5例にピランテルパモ酸塩500mg（ピランテルとして）を経口投与した場合、糞中には4例で60～65%、1例で93%の排泄率を示し、尿中には全例とも1～3%の排泄率を示し、いずれもその大部分が48時間以内に排泄された<sup>3)</sup>。

経口投与した場合、3時間後に血中にピランテル関連物質として0.2～1.1 $\mu$ g/mLが検出されたが、そのほとんどは代謝物と考えられ、5時間以内にほぼ消失した<sup>4)</sup>〔<sup>4)</sup>は外国人データ：参考〕。

### \*【臨床成績】

コンバントリン錠100mgの各種寄生虫症に対する臨床試験の成績は次表の通りである。

寄生虫別疾患名	陰 転 率	
蟯 虫 症 <sup>5-8)</sup>	90.8% (177/195)	
回 虫 症 <sup>9-11)</sup>	93.7% (252/269)	
鉤 虫 症	ズビニ鉤虫 <sup>12,13)</sup>	97.4% ( 37/ 38)
	アメリカ鉤虫 <sup>14-16)</sup>	78.7% (207/263)
東 洋 毛 様 線 虫 症 <sup>17)</sup>	93.3% ( 83/ 89)	


### 【薬効薬理】

ピランテルパモ酸塩は、イヌ回虫あるいはイヌ鉤虫による感染動物（イヌ）及びネズミ蟯虫による感染動物（マウス）のいずれに対しても、1回投与により優れた駆虫効果を示している<sup>18-20)</sup>。

本剤の駆虫効果は、虫体の神経－筋伝達を遮断して運動麻痺を起こすことによるものと考えられている<sup>1)</sup>。

## 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：ピランテルパモ酸塩 (Pyrantel Pamoate)  
化学名：1-Methyl-2-[(1*E*)-2-(thien-2-yl)vinyl]-1,4,5,6-tetrahydro-  
pyrimidine mono[4,4'-methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoate)]  
分子式：C<sub>11</sub>H<sub>14</sub>N<sub>2</sub>S · C<sub>23</sub>H<sub>16</sub>O<sub>6</sub>  
分子量：594.68  
融点：256～264℃(分解)  
構造式：



性状：ピランテルパモ酸塩は、淡黄色～黄色の結晶性粉末で、  
におい及び味はない。N,N-ジメチルホルムアミドに  
やや溶けにくく、メタノール又はエタノール(95)に  
極めて溶けにくく、水、酢酸エチル又はジエチルエー  
テルにほとんど溶けない。

## \*【包装】

コンバントリンドライシロップ100mg：1g×60包

## \*【主要文献】

- 1) Aubry, M. L. et al. : Br. J. Pharmacol. 38 : 332, 1970
- 2) 厚生省薬務局：医薬品副作用情報 No36 (日本医事新報 No2871 : 108, 1979)
- 3) 木村 義尚ほか：応用薬理 5(3) : 347, 1971
- 4) 佐藤製薬株式会社 社内資料：Pyrantel pamoate のヒトにおける代謝研究
- 5) 堀 栄太郎：寄生虫学雑誌 20(2) : 142, 1971
- 6) 佐藤製薬株式会社 社内資料：広島県豊浜町における蟯虫症集団治療の試み
- 7) 横川 宗雄ほか：寄生虫学雑誌 19(6) : 593, 1970
- 8) 山本 久ほか：寄生虫学雑誌 20(5) : 359, 1971
- 9) 小林 昭夫ほか：寄生虫学雑誌 19(3) : 296, 1970
- 10) 佐藤製薬株式会社 社内資料：Pyrantel pamoate と Piperazine malate による回虫駆除効果比較
- 11) 石崎 達ほか：医学のあゆみ 83(2) : 106, 1972
- 12) 堀 栄太郎：寄生虫学雑誌 20(2) : 87, 1971
- 13) 佐藤製薬株式会社 社内資料：Pyrantel pamoate に依る鉤虫治療成績
- 14) 石崎 達ほか：寄生虫学雑誌 20(3) : 164, 1971
- 15) 横川 宗雄ほか：寄生虫学雑誌 19(3) : 301, 1970
- 16) 佐藤製薬株式会社 社内資料：Pyrantel pamoate のアメリカ鉤虫 (*Necator americanus*) 集団駆除効果について
- 17) 谷 重和ほか：秋田県農村医学会雑誌 21(2) : 11, 1975
- 18) 尾崎 文雄ほか：寄生虫学雑誌 20(3) : 188, 1971
- 19) 林 滋生ほか：寄生虫学雑誌 20(3) : 195, 1971
- 20) 影井 昇ほか：寄生虫学雑誌 20(3) : 222, 1971

## \*【文献請求先】

佐藤製薬株式会社 医薬事業部  
〒107-0051 東京都港区元赤坂1丁目5番27号  
TEL. 03-5412-7817  
FAX. 03-3796-6560

製造販売元 **佐藤製薬株式会社**  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号