



TRADE MARK



日本薬局方 500mL

ヒマシ油

火気注意


Castor Oil

ニワトリ印

コザカイ

登録

商標



小堺製薬株式会社 東京都墨田区両国4-36-9

2012年 4月第6版  
 製造販売業者の住所変更に伴う改訂  
 2009年10月第5版改訂  
 (貯法) 気密容器  
 販売名: ヒマシ油「コザカイ・M」

下 剤

日本標準商品分類番号 872356  
 承認番号 16000AMZ04511000  
 薬価収載 1950.10  
 販売開始 1949. 8  
 再評価公表 1981. 8

## 【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

1. 急性腹症が疑われる患者[症状を悪化させるおそれがある。]
2. 瘰癧性便秘[症状を悪化させるおそれがある。]
3. 重症の硬結便[症状を悪化させるおそれがある。]
4. ヘノボジ油、メンマ等の脂溶性駆虫剤を投与中の患者[これらの薬剤の吸収を促進して中毒を起こすおそれがある。]
5. 磷、ナフタリンなどの脂溶性物質による中毒時[これらの吸収を促進して中毒症状を悪化させるおそれがある。]

## 【組成・性状】

本品 1 mL中に、日局 ヒマシ油 1 mLを含有する。  
 本品は無色～微黄色澄明の粘性の油で、わずかに特異なおいがあり、味は初め緩和で、後にわずかにえぐい。

## 【効能・効果】

便秘症  
 食中毒における腸管内容物の排除  
 消化管検査時又は手術前後における腸管内容物の排除

## 【用法・用量】

ヒマシ油として、通常、成人は15～30mL(増量限度60mL)小児は5～15mL、乳幼児は1～5mLを、それぞれそのまま又は水、牛乳などに浮べて頓用する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

## 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意  
小腸の消化吸収を妨げ全身の栄養状態に影響を及ぼすことがあるので連用を避けること。
2. 副作用 (本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。)

種類\頻度	頻度不明
消化器	悪心・嘔吐、腹痛等
過敏症 <sup>注)</sup>	過敏症状

注)このような症状があらわれた場合は  
投与を中止すること。

3. 高齢者への投与  
一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。
4. 妊婦・産婦・授乳婦への投与
  - 1) 子宮収縮を誘発して流産の危険性があるので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。
  - 2) ヒト母乳中に移行し乳児の下痢を起こすことがあるので、授乳中の婦人には投与しないことが望ましい。
5. その他の注意  
即効性であるので、就寝前の服用を避けさせること。

製造販売元  
**小堺製薬株式会社**  
 \*東京都墨田区両国 4-36-9

キャップ: PP  
 外装フィルム: PE  
 ガラス: 瓶

使用期限:  
 製造番号:

〈調剤包装単位コード〉



(01)04987371753147

〈販売包装単位コード〉



(01)14987371141354