

循環機能改善剤

処方箋医薬品\*

\*トラピジル錠50mg「サワイ」  
\*トラピジル錠100mg「サワイ」

TRAPIDIL

トラピジル錠

貯法：室温保存  
使用期限：外箱に表示

日本標準商品分類番号

872171

	錠50mg	錠100mg
*承認番号	22700AMX00044000	22700AMX00045000
薬価収載	2015年6月	2015年6月
販売開始	1987年10月	1987年10月
再評価結果	1999年6月	1999年6月

※注意－医師等の処方箋により使用すること

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

- 1) 頭蓋内出血発作後、止血が完成していないと考えられる患者  
〔本剤は血小板凝集抑制作用を有する。〕
- 2) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

・組成







トラピジル錠50mg「サワイ」：1錠中に日局トラピジル50mgを含有する。

添加物として、カルナウバロウ、カルメロースCa、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、サラシミツロウ、酸化チタン、ステアリン酸Mg、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール6000を含有する。

トラピジル錠100mg「サワイ」：1錠中に日局トラピジル100mgを含有する。

添加物として、カルナウバロウ、カルメロースCa、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、サラシミツロウ、酸化チタン、ステアリン酸Mg、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール6000を含有する。

・製剤の性状

品名	剤形	外形			性状
		直径(mm)	重量(mg)	厚さ(mm)	
トラピジル錠50mg「サワイ」	フィルムコーティング錠	 6.1	 約93	 3.7	白色
〔識別コード：SW 693〕					
トラピジル錠100mg「サワイ」	フィルムコーティング錠	 8.1	 約186	 4.3	白色
〔識別コード：SW 694〕					

【効能・効果】

狭心症

【用法・用量】

トラピジル錠50mg「サワイ」：通常、成人1回2錠(トラピジルとして100mg)、1日3回経口投与する。

なお、症状により適宜増減する。

トラピジル錠100mg「サワイ」：通常、成人1回1錠(トラピジルとして100mg)、1日3回経口投与する。

なお、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

肝障害のある患者〔副作用が発現しやすくなる。〕

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

1) 重大な副作用(頻度不明)

- (1) 皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

- (2) AST(GOT)・ALT(GPT)・ $\gamma$ -GTP上昇等の肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2) その他の副作用

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

	頻度不明
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹・発赤、痒痒感等
肝臓 <sup>注2)</sup>	AST(GOT)・ALT(GPT)の上昇、総ビリルビンの上昇等
消化器	胃重感、胃部膨満感、胃部不快感、嘔気、嘔吐、食欲不振、腹痛、下痢、便秘、口渇、口内炎等
精神神経系	頭痛、めまい、頭部不快感、眠気、しびれ感、不眠、筋肉・関節痛等
循環器	胸部圧迫感、心悸亢進、頻脈、徐脈、血圧低下、胸部不快感、不整脈等
血液	白血球減少、赤血球減少、血小板減少、好酸球増多、出血傾向等
その他	味覚異常、顔面潮紅、発熱、悪寒・戦慄、倦怠感、気分不良、発汗、女性化乳房、呼吸困難、リンパ節腫脹、疼痛、浮腫

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

注2) 観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止すること。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。〔動物実験(マウス)で、高用量において胎児の発育遅延が認められている。〕

2) 授乳中の婦人には投与しないことが望ましいが、やむを得ず投与する場合には授乳を避けさせること。〔動物実験(ラット)で、乳汁中への移行が認められている。〕

5. 過量投与

本剤の大量服用(トラピジルとして15g)で、重症ショック(昏睡状態、頻回の嘔吐、全身痙攣、血圧低下、呼吸困難、四肢冷感等)があらわれたとの報告がある。入院後、直ちに胃腸洗浄、強制利尿等の医薬品中毒に対する一般処置を行った後、吸着型血液浄化法(DHP)と血液透析を併用して行ったところ、臨床所見の急速な改善をみた。また、本剤では、循環虚脱に対する処置が重要と考えられている。

## 6.適用上の注意

**薬剤交付時：**PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている)

## 7.その他の注意

膠原病及び類似の疾患の患者に本剤を投与したところ、副作用の発現頻度が高かったため、これらの患者には投与しないことが望ましいとの報告がある。

### 【薬物動態】

#### 1.生物学的同等性試験


##### ○トラピジル錠50mg「サワイ」

トラピジル錠50mg「サワイ」と標準製剤を健康成人男子にそれぞれ2錠(トラピジルとして100mg)空腹時単回経口投与(クロスオーバー法)し、血清中トラピジル濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。<sup>1)</sup>

各製剤2錠投与時の薬物動態パラメータ

	Cmax ( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )	Tmax (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC <sub>0-10hr</sub> ( $\mu\text{g}\cdot\text{hr}/\text{mL}$ )
トラピジル錠50mg「サワイ」	2.57±0.35	1.4±0.6	1.3±0.7	7.34±1.47
標準製剤(錠剤,50mg)	2.48±0.38	1.3±0.5	1.3±0.6	7.61±1.71

(Mean±S.D.)




##### ○トラピジル錠100mg「サワイ」

トラピジル錠100mg「サワイ」と標準製剤を健康成人男子にそれぞれ1錠(トラピジルとして100mg)空腹時単回経口投与(クロスオーバー法)し、血清中トラピジル濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。<sup>2)</sup>

各製剤1錠投与時の薬物動態パラメータ

	Cmax ( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )	Tmax (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC <sub>0-8hr</sub> ( $\mu\text{g}\cdot\text{hr}/\text{mL}$ )
トラピジル錠100mg「サワイ」	2.95±0.60	1.6±0.9	3.0±4.5	9.70±2.67
標準製剤(錠剤,100mg)	3.01±0.60	1.1±0.4	1.9±1.0	9.07±1.95

(Mean±S.D.)



血清中濃度ならびにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

#### 2. 溶出挙動

本製剤は、日本薬局方外医薬品規格第3部に定められた規格に適合していることが確認されている。

### 【薬効薬理】

1. 冠血管拡張作用を有し、冠血流量を増加させ、心筋の内層、外層血流、虚血部血流を改善する。
2. トロンボキサンA<sub>2</sub>合成の抑制とプロスタサイクリン生成促進によって血管弛緩及び血小板凝集抑制作用を示す。

### 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：トラピジル(Trapidil)


化学名：7-Diethylamino-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine

分子式：C<sub>10</sub>H<sub>15</sub>N<sub>5</sub>

分子量：205.26

融点：101~105℃

構造式：



性状：トラピジルは白色～微黄白色の結晶性の粉末である。水又はメタノールに極めて溶けやすく、エタノール(95)、無水酢酸又は酢酸(100)に溶けやすく、ジエチルエーテルにやや溶けにくい。1.0gを水100mLに溶かした液のpHは6.5~7.5である。

### 【取扱い上の注意】

#### ・安定性試験

包装品を用いた長期保存試験(室温、3年間)の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。<sup>3),4)</sup>

### \*\*【包装】

トラピジル錠50mg「サワイ」：

PTP：100錠(10錠×10)

トラピジル錠100mg「サワイ」：

PTP：100錠(10錠×10)、1,000錠(10錠×100)

### 【主要文献及び文献請求先】

#### ・主要文献

- 1),2) 沢井製薬(株)社内資料 [生物学的同等性試験]
- 3),4) 沢井製薬(株)社内資料 [安定性試験]

#### ・文献請求先 [主要文献(社内資料を含む)は下記にご請求下さい]

沢井製薬株式会社 医薬品情報センター  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目2-30  
TEL：0120-381-999 FAX：06-6394-7355

製造販売元

**沢井製薬株式会社**

大阪市淀川区宮原5丁目2-30