

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2013に準拠して作成

長時間作用型 ARB／持続性 Ca 拮抗薬配合剤

日本薬局方 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩錠

イルアミクス[®] 配合錠 LD「日医工」

イルアミクス[®] 配合錠 HD「日医工」

ILUAMIX[®]

剤形	フィルムコーティング錠
製剤の規制区分	劇薬，処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）
規格・含量	LD：1錠中イルベサルタン 100mg，アムロジピンとして 5mg （アムロジピンベシル酸塩 6.93mg）含有 HD：1錠中イルベサルタン 100mg，アムロジピンとして 10mg （アムロジピンベシル酸塩 13.87mg）含有
一般名	和名：イルベサルタン，アムロジピンベシル酸塩 洋名：Irbesartan, Amlodipine Besilate
製造販売承認年月日 薬価基準収載・発売年月日	承認年月日：2018年2月15日 薬価基準収載：2018年6月15日 発売年月日：2018年6月15日
開発・製造販売（輸入）・ 提携・販売会社名	製造販売元：日医工株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	日医工株式会社 お客様サポートセンター TEL：0120-517-215 FAX：076-442-8948 医療関係者向けホームページ http://www.nichiiko.co.jp/

本IFは2018年2月作成（第1版）の添付文書の記載に基づき改訂した。

最新の添付文書情報は、医薬品医療機器総合機構ホームページ

<http://www.pmda.go.jp/>にてご確認下さい。

IF利用の手引きの概要 —日本病院薬剤師会—

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和63年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第2小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、IFと略す）の位置付け並びにIF記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成10年9月に日病薬学術第3小委員会においてIF記載要領の改訂が行われた。

更に10年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成20年9月に日病薬医薬情報委員会においてIF記載要領2008が策定された。

IF記載要領2008では、IFを紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF等の電磁的データとして提供すること（e-IF）が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版のe-IFが提供されることとなった。

最新版のe-IFは、(独) 医薬品医療機器総合機構のホームページ (<http://www.pmda.go.jp/>) から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-IFを掲載する医薬品情報提供ホームページが公式サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせてe-IFの情報を検討する組織を設置して、個々のIFが添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008年より年4回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、IF記載要領の一部改訂を行いIF記載要領2013として公表する運びとなった。

2. IFとは

IFは「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたIFは、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

【IFの様式】

- ①規格はA4版、横書きとし、原則として9ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤字・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ②IF記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2頁にまとめる。

【IFの作成】

- ①IFは原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ②IFに記載する項目及び配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠する。
- ③添付文書の内容を補完するとのIFの主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤「医薬品インタビューフォーム記載要領2013」（以下、「IF記載要領2013」と略す）により作成されたIFは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（PDF）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

【IFの発行】

- ① 「IF記載要領2013」は、平成25年10月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ② 上記以外の医薬品については、「IF記載要領2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③ 使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはIFが改訂される。

3. IFの利用にあたって

「IF記載要領2013」においては、PDFファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体のIFについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。

また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることもあり、その取扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

IFを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。IFは日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、IFがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、今後インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013年4月改訂)

目 次

I. 概要に関する項目	1	VI. 薬効薬理に関する項目	20
1. 開発の経緯.....	1	1. 薬理的に関連のある化合物又は化合物群	20
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1	2. 薬理作用	20
II. 名称に関する項目	2	VII. 薬物動態に関する項目	21
1. 販売名	2	1. 血中濃度の推移・測定法.....	21
2. 一般名	2	2. 薬物速度論的パラメータ	22
3. 構造式又は示性式	2	3. 吸収	23
4. 分子式及び分子量	2	4. 分布	23
5. 化学名（命名法）	2	5. 代謝	23
6. 慣用名，別名，略号，記号番号	2	6. 排泄	23
7. CAS登録番号	2	7. トランスポーターに関する情報.....	23
III. 有効成分に関する項目	3	8. 透析等による除去率.....	23
1. 物理化学的性質	3	VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目	24
2. 有効成分の各種条件下における安定性	3	1. 警告内容とその理由	24
3. 有効成分の確認試験法.....	3	2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む） ..	24
4. 有効成分の定量法	4	3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	24
IV. 製剤に関する項目	5	4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	24
1. 剤形.....	5	5. 慎重投与内容とその理由.....	24
2. 製剤の組成.....	5	6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	25
3. 懸濁剤，乳剤の分散性に対する注意.....	5	7. 相互作用	26
4. 製剤の各種条件下における安定性	6	8. 副作用.....	27
5. 調製法及び溶解後の安定性	11	9. 高齢者への投与	29
6. 他剤との配合変化（物理化学的変化）	11	10. 妊婦，産婦，授乳婦等への投与.....	29
7. 溶出性.....	11	11. 小児等への投与	29
8. 生物学的試験法	16	12. 臨床検査結果に及ぼす影響	29
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	16	13. 過量投与	30
10. 製剤中の有効成分の定量法	17	14. 適用上の注意.....	30
11. 力価.....	17	15. その他の注意.....	30
12. 混入する可能性のある夾雑物.....	17	16. その他.....	30
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報.....	17	IX. 非臨床試験に関する項目	31
14. その他.....	17	1. 薬理試験	31
V. 治療に関する項目	18	2. 毒性試験	31
1. 効能又は効果	18	X. 管理的事項に関する項目	32
2. 用法及び用量	18	1. 規制区分	32
3. 臨床成績	18		

2. 有効期間又は使用期限.....	32
3. 貯法・保存条件	32
4. 薬剤取扱い上の注意点.....	32
5. 承認条件等.....	32
6. 包装.....	32
7. 容器の材質.....	32
8. 同一成分・同効薬.....	32
9. 国際誕生年月日	32
10. 製造販売承認年月日及び承認番号	32
11. 薬価基準収載年月日	33
12. 効能又は効果追加, 用法及び用量変更追加等 の年月日及びその内容.....	33
13. 再審査結果, 再評価結果公表年月日及びその 内容.....	33
14. 再審査期間.....	33
15. 投与期間制限医薬品に関する情報	33
16. 各種コード.....	33
17. 保険給付上の注意.....	33
X I. 文献	34
1. 引用文献	34
2. その他の参考文献.....	34
X II. 参考資料	34
1. 主な外国での発売状況.....	34
2. 海外における臨床支援情報	34
X III. 備考	34
付表 1—1	35
付表 1—2	36
付表 1—3	37
付表 1—4	38

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

本剤はイルベサルタン及びアムロジピンベシル酸塩を有効成分とする長時間作用型 ARB／持続性 Ca 拮抗薬配合剤である。

イルアミクス配合錠 LD「日医工」及びイルアミクス配合錠 HD「日医工」は、日医工株式会社が後発医薬品として開発を企画し、規格及び試験方法を設定、安定性試験、生物学的同等性試験を実施し、2018年2月15日に承認を取得、2018年6月15日に上市した。(薬食発 1121 第2号(平成26年11月21日)に基づき承認申請)

2. 製品の治療学的・製剤学的特性

- (1) 本剤はイルベサルタン及びアムロジピンベシル酸塩を有効成分とする長時間作用型 ARB／持続性 Ca 拮抗薬配合剤である。
- (2) 錠剤の両面に販売名、規格、社名をレーザー印字した。
- (3) 100錠及び140錠包装の個装箱は、開封を示す目印「開封済」と、販売名、使用期限、製造番号、GS1 データバーを記載した調剤棚に利用可能な切り取りタグ付きである。
- (4) バラ 200錠のボトルはキャップに貼付可能な副片ラベル付きである。
- (5) 重大な副作用(頻度不明)として、血管浮腫、高カリウム血症、ショック、失神、意識消失、腎不全、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、低血糖、横紋筋融解症、無顆粒球症、白血球減少、血小板減少、房室ブロックが報告されている。

II. 名称に関する項目

1. 販売名

(1) 和名

イルアミクス®配合錠 LD「日医工」

イルアミクス®配合錠 HD「日医工」

(2) 洋名

ILUAMIX®

(3) 名称の由来

日本ジェネリック医薬品学会により商標登録された配合剤の統一ブランド名称

2. 一般名

(1) 和名 (命名法)

イルベサルタン, アムロジピンベシル酸塩 (JAN)



(2) 洋名 (命名法)

Irbesartan (JAN,INN), Amlodipine Besilate (JAN)

(3) ステム

イルベサルタン	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬：-sartan
アムロジピンベシル酸塩	ニフェジピン系の Ca ²⁺ チャネル拮抗薬：-dipine

3. 構造式又は示性式

イルベサルタン	アムロジピンベシル酸塩
	 <p>及び鏡像異性体</p>

4. 分子式及び分子量

イルベサルタン	分子式：C ₂₅ H ₂₈ N ₆ O	分子量：428.53
アムロジピンベシル酸塩	分子式：C ₂₀ H ₂₅ ClN ₂ O ₅ · C ₆ H ₆ O ₃ S	分子量：567.05

5. 化学名 (命名法)

イルベサルタン	2-Butyl-3-{{2'-(1 <i>H</i> -tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl}methyl}-1, 3-diazaspiro[4. 4]non-1-en-4-one
アムロジピンベシル酸塩	3-Ethyl 5-methyl(4 <i>RS</i>)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3, 5-dicarboxylate monobenzenesulfonate

6. 慣用名, 別名, 略号, 記号番号

特になし

7. CAS 登録番号

イルベサルタン	138402-11-6
アムロジピンベシル酸塩	111470-99-6

Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

イルベサルタン	白色の結晶性の粉末である。 本品は結晶多形が認められる。
アムロジピンベシル酸塩	白色～帯黄白色の結晶性の粉末である。 (僅かに特異なおいがあり、味は僅かに苦い。)

(2) 溶解性

イルベサルタン	酢酸(100)に溶けやすく、メタノールにやや溶けにくく、エタノール(99.5)に溶けにくく、水にほとんど溶けない。
アムロジピンベシル酸塩	メタノールに溶けやすく、エタノール(99.5)にやや溶けにくく、水に溶けにくい。

(3) 吸湿性

該当資料なし

(4) 融点(分解点), 沸点, 凝固点

アムロジピンベシル酸塩: 融点 約 198°C (分解)

(5) 酸塩基解離定数

該当資料なし

(6) 分配係数

該当資料なし

(7) その他の主な示性値

アムロジピンベシル酸塩: 本品のメタノール溶液(1→100)は旋光性を示さない。

2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

3. 有効成分の確認試験法

イルベサルタン	(1) 紫外可視吸光度測定法 本品のメタノール溶液につき吸収スペクトルを測定し、本品のスペクトルと本品の参照スペクトルを比較するとき、両者のスペクトルは同一波長のところに同様の強度の吸収を認める。 (2) 赤外吸収スペクトル測定法 臭化カリウム錠剤法により試験を行い、本品のスペクトルと本品の参照スペクトルを比較するとき、両者のスペクトルは同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。
アムロジピンベシル酸塩	(1) 紫外可視吸光度測定法 本品の塩酸・メタノール試液溶液につき吸収スペクトルを測定し、本品のスペクトルと本品の参照スペクトル又はアムロジピンベシル酸塩標準品のスペクトルを比較するとき、両者のスペクトルは同一波長のところに同様の強度の吸収を認める。 (2) 赤外吸収スペクトル測定法 臭化カリウム錠剤法により試験を行い、本品のスペクトルと本品の参照スペクトル又はアムロジピンベシル酸塩標準品のスペクトルを比較するとき、両者のスペクトルは同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。 (3) 沈殿反応 本品に硝酸ナトリウム及び無水炭酸ナトリウムを加えて徐々に加熱する。冷後、残留物を希塩酸及び水に溶解し、塩化バリウム試液を加えるとき、白色の沈殿を生じる。







4. 有効成分の定量法

イルベサルタン	電位差滴定法 本品を酢酸に溶かし、過塩素酸で滴定する。
アムロジピンベシル酸塩	液体クロマトグラフィー 検出器：紫外吸光光度計 移動相：メタノール，リン酸二水素カリウム溶液混液

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別, 外観及び性状

	色調 剤形	形 状			本体表示 包装コード
		質量(mg)	直径(mm)	厚さ(mm)	
イルアミクス配合錠 LD「日医工」	白色～帯黄白色 のフィルムコー ティング錠	   248	8.6	4.5	本体：イルアミクス LD 日医工 包装：㊤ 399
イルアミクス配合錠 HD「日医工」	うすいだいだい 色のフィルムコー ティング錠	   248	8.6	4.5	本体：イルアミクス HD 日医工 包装：㊤ 400

(2) 製剤の物性

(「IV-4.製剤の各種条件下における安定性」の項参照)

(3) 識別コード

(「IV-1.(1)剤形の区別, 外観及び性状」の項参照)

(4) pH, 浸透圧比, 粘度, 比重, 無菌の旨及び安定な pH 域等

該当資料なし

2. 製剤の組成

(1) 有効成分 (活性成分) の含量

LD：1錠中イルベサルタン 100mg 及びアムロジピンとして 5mg (アムロジピンベシル酸塩 6.93mg) を含有する。

HD：1錠中イルベサルタン 100mg 及びアムロジピンとして 10mg (アムロジピンベシル酸塩 13.87mg) を含有する。

(2) 添加物

添加目的	添 加 物
賦形剤	D-マンニトール, 結晶セルロース
崩壊剤	クロスカルメロースナトリウム
結合剤	ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体
滑沢剤	ステアリン酸マグネシウム
コーティング剤	ヒプロメロース, マクロゴール 6000, 酸化チタン
着色剤	(HDのみ) 黄色三二酸化鉄, 三二酸化鉄
光沢化剤	カルナウバロウ

(3) その他

該当記載事項なし

3. 懸濁剤, 乳剤の分散性に対する注意

該当しない

4. 製剤の各種条件下における安定性¹⁾

(1) 加速試験

本品につき加速試験（40℃，75%RH，6ヵ月）を行った結果，イルアミクス配合錠 LD「日医工」及びイルアミクス配合錠 HD「日医工」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

◇イルアミクス配合錠 LD「日医工」 加速試験 [最終包装形態 (PTP 包装)]

測定項目 <規格>		ロット 番号	保存期間			
			開始時	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月
性状 <白色～帯黄白色のフィルム コーティング錠>		IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	適合	同左	同左	同左
確認試験 (HPLC, 紫外可視吸光度測定法)		IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	適合	同左	同左	同左
製剤均一性	含量均一性試験 (%) イルベサルタン <15.0%以下>	IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	1.0～2.4 1.2～1.9 1.8～3.4	—	—	1.0～3.0 1.7～3.4 1.2～4.1
	含量均一性試験 (%) アムロジピンベシル酸塩 <15.0%以下>	IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	2.0～3.4 2.0～3.1 1.9～2.9	—	—	2.4～4.5 3.4～4.2 2.2～2.9
溶出性	イルベサルタン (%) <30分, 70%以上>	IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	89.2～93.6 91.0～94.9 91.0～94.3	91.9～96.4 91.3～95.2 88.0～95.4	88.7～92.6 87.7～92.1 86.5～92.0	90.2～100.7 89.5～97.6 88.6～97.4
	アムロジピンベシル酸塩 (%) <30分, 75%以上>	IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	89.6～94.8 87.1～94.8 82.4～97.9	83.9～96.4 93.1～97.0 84.7～96.1	77.8～95.1 86.3～95.1 83.1～95.9	85.1～99.2 90.4～98.7 87.5～100.6
含量	イルベサルタン (%) ※ <95.0～105.0%>	IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	102.2 101.4 101.6	102.4 101.8 101.7	103.0 102.6 102.7	102.0 101.3 100.8
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ※ <95.0～105.0%>	IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	98.1 97.1 98.4	99.1 98.4 98.9	97.8 97.7 98.7	99.0 98.5 98.6

※：表示量に対する含有率 (%)

◇イルアミクス配合錠 LD「日医工」 加速試験 [最終包装形態 (バラ包装)]

測定項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間				
		開始時	1 ヶ月	3 ヶ月	6 ヶ月	
性状 ＜白色～帯黄白色のフィルム コーティング錠＞	IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	適合	同左	同左	同左	
確認試験 (HPLC, 紫外可視吸光度測定法)	IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	適合	同左	同左	同左	
製剤均一性	含量均一性試験 (%) イルベサルタン ＜15.0%以下＞	IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	1.0～2.4 1.2～1.9 1.8～3.4	—	—	1.1～1.9 1.7～1.9 1.7～2.2
	含量均一性試験 (%) アムロジピンベシル酸塩 ＜15.0%以下＞	IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	2.0～3.4 2.0～3.1 1.9～2.9	—	—	3.0～3.5 3.6～4.1 2.3～3.7
溶出性	イルベサルタン (%) ＜30 分, 70%以上＞	IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	89.2～93.6 91.0～94.9 91.0～94.3	89.0～94.1 88.9～93.4 88.0～93.1	86.9～94.7 87.3～92.8 86.2～92.6	88.4～92.1 81.9～87.6 87.3～92.1
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ＜30 分, 75%以上＞	IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	89.6～94.8 87.1～94.8 82.4～97.9	86.8～96.1 85.4～96.7 80.9～95.5	82.9～92.6 77.4～92.1 87.6～92.9	94.0～100.6 81.5～97.8 92.8～99.8
含量	イルベサルタン (%) ※ ＜95.0～105.0%＞	IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	102.2 101.4 101.6	102.9 102.6 101.9	101.2 101.4 100.6	101.2 100.9 100.3
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ※ ＜95.0～105.0%＞	IRB100AML5TC-1 IRB100AML5TC-2 IRB100AML5TC-3	98.1 97.1 98.4	98.3 98.6 98.9	98.1 98.0 97.9	99.0 98.3 99.2

※：表示量に対する含有率 (%)

◇イルアミクス配合錠 HD「日医工」 加速試験 [最終包装形態 (PTP 包装)]

測定項目 ＜規格＞	ロット 番号	保存期間				
		開始時	1 ヶ月	3 ヶ月	6 ヶ月	
性状 ＜うすいだい色のフィルム コーティング錠＞	IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	適合	同左	同左	同左	
確認試験 (HPLC, 紫外可視吸光度測定法)	IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	適合	同左	同左	同左	
製剤均一性	含量均一性試験 (%) イルベサルタン ＜15.0%以下＞	IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	1.4～2.4 1.4～1.9 1.4～2.6	—	—	1.2～2.6 1.4～2.4 1.4～2.2
	含量均一性試験 (%) アムロジピンベシル酸塩 ＜15.0%以下＞	IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	2.0～3.4 1.9 1.7～2.2	—	—	1.7～3.5 1.4～3.4 1.4～2.6
溶出性	イルベサルタン (%) ＜30 分, 70%以上＞	IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	88.7～97.9 89.0～97.9 87.6～98.7	83.7～93.3 90.0～94.0 88.8～93.2	88.1～93.5 87.4～91.9 88.3～92.5	91.2～96.3 92.2～97.2 91.1～95.5
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ＜30 分, 75%以上＞	IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	83.2～96.8 90.4～98.8 89.5～98.4	85.0～94.2 87.1～96.7 87.8～96.8	90.2～95.5 83.6～96.9 86.9～96.3	91.1～97.6 92.1～99.5 94.6～99.0
含量	イルベサルタン (%) ※ ＜95.0～105.0%＞	IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	101.8 101.5 101.3	100.3 100.0 100.1	100.7 100.1 100.4	101.7 101.4 101.1
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ※ ＜95.0～105.0%＞	IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	97.9 98.9 99.1	98.2 99.3 99.4	98.0 99.2 99.5	98.6 99.8 100.4

※：表示量に対する含有率 (%)

◇イルアミクス配合錠 HD 「日医工」 加速試験 [最終包装形態 (バラ包装)]

測定項目 <規格>		ロット 番号	保存期間			
			開始時	1 ヶ月	3 ヶ月	6 ヶ月
性状 <うすいだいだい色のフィルム コーティング錠>		IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	適合	同左	同左	同左
確認試験 (HPLC, 紫外可視吸光度測定法)		IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	適合	同左	同左	同左
製剤均一性	含量均一性試験 (%) イルベサルタン <15.0%以下>	IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	1.4~2.4 1.4~1.9 1.4~2.6	—	—	1.2~2.4 1.9~3.3 1.4~1.9
	含量均一性試験 (%) アムロジピンベシル酸塩 <15.0%以下>	IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	2.0~3.4 1.9 1.7~2.2	—	—	1.4~2.6 1.2~1.9 1.2~2.4
溶出性	イルベサルタン (%) <30 分, 70%以上>	IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	88.7~97.9 89.0~97.9 87.6~98.7	88.9~93.3 88.2~94.0 89.0~94.4	87.7~92.8 86.1~92.6 88.1~93.0	84.1~95.2 84.5~93.2 87.0~94.8
	アムロジピンベシル酸塩 (%) <30 分, 75%以上>	IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	83.2~96.8 90.4~98.8 89.5~98.4	85.3~96.6 82.6~99.5 85.8~98.7	81.6~96.6 88.9~100.0 88.1~100.4	88.7~97.5 88.6~98.8 92.7~98.2
含量	イルベサルタン (%) ※ <95.0~105.0%>	IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	101.8 101.5 101.3	100.3 100.3 99.9	100.8 101.0 100.6	101.3 101.1 100.9
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ※ <95.0~105.0%>	IRB100AML10TC-1 IRB100AML10TC-2 IRB100AML10TC-3	97.9 98.9 99.1	97.3 98.9 98.1	98.8 100.0 99.9	98.7 99.6 99.9

※: 表示量に対する含有率 (%)

(2) 無包装の安定性試験

◇イルアミクス配合錠 LD「日医工」 無包装 40℃ [遮光, 気密容器]

測定項目 <規格>		ロット 番号	保存期間				
			開始時	2 週	1 ヶ月	2 ヶ月	3 ヶ月
性状<白色～帯黄白色の フィルムコーティング錠>		CV0100	適合	同左	同左	同左	同左
溶 出 性	イルベサルタン (%) <30 分, 70%以上>	CV0100	90.8～96.6	93.5～96.7	90.0～95.6	93.8～96.0	92.0～94.2
	アムロジピンベシル酸塩 (%) <30 分, 75%以上>	CV0100	92.4～98.7	94.7～102.3	95.2～97.9	97.6～101.1	94.2～100.0
含 量	イルベサルタン (%) ※ <95.0～105.0%>	CV0100	98.9	99.5	99.1	99.4	98.8
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ※ <95.0～105.0%>	CV0100	98.6	99.3	98.7	98.9	98.4
(参考値) 硬度 (N) <19.6N 以上>		CV0100	153	155	153	156	151

※：表示量に対する含有率 (%)

◇イルアミクス配合錠 LD「日医工」 無包装 25℃・75%RH [遮光, 開放]

測定項目 <規格>		ロット 番号	保存期間				
			開始時	2 週	1 ヶ月	2 ヶ月	3 ヶ月
性状<白色～帯黄白色の フィルムコーティング錠>		CV0100	適合	同左	同左	同左	同左
溶 出 性	イルベサルタン (%) <30 分, 70%以上>	CV0100	90.8～96.6	89.7～93.6	90.5～93.9	89.7～92.6	89.2～90.5
	アムロジピンベシル酸塩 (%) <30 分, 75%以上>	CV0100	92.4～98.7	92.3～99.6	91.6～97.5	90.1～98.4	89.5～96.8
含 量	イルベサルタン (%) ※ <95.0～105.0%>	CV0100	98.9	99.0	99.6	99.2	99.4
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ※ <95.0～105.0%>	CV0100	98.6	98.7	99.1	98.5	98.8
(参考値) 硬度 (N) <19.6N 以上>		CV0100	153	129	131	125	122

※：表示量に対する含有率 (%)

◇イルアミクス配合錠 LD「日医工」 無包装 室温, 曝光 [D65 光源, シャレをラップで覆う]

測定項目 <規格>		ロット 番号	総曝光量			
			開始時	30 万 Lx・hr	60 万 Lx・hr	120 万 Lx・hr
性状<白色～帯黄白色の フィルムコーティング錠>		CV0100	適合	同左	同左	同左
溶 出 性	イルベサルタン (%) <30 分, 70%以上>	CV0100	90.8～96.6	95.5～98.5	94.8～97.1	94.9～97.3
	アムロジピンベシル酸塩 (%) <30 分, 75%以上>	CV0100	92.4～98.7	97.9～99.6	91.1～99.6	95.3～98.4
含 量	イルベサルタン (%) ※ <95.0～105.0%>	CV0100	98.9	99.0	99.2	98.8
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ※ <95.0～105.0%>	CV0100	98.6	98.0	97.9	97.5
(参考値) 硬度 (N) <19.6N 以上>		CV0100	153	157	159	161

※：表示量に対する含有率 (%)

◇イルアミクス配合錠 HD「日医工」 無包装 40℃ [遮光, 気密容器]

測定項目 ＜規格＞		ロット 番号	保存期間				
			開始時	2 週	1 ヶ月	2 ヶ月	3 ヶ月
性状くうすいだいだい色の フィルムコーティング錠＞		CV0100	適合	同左	同左	同左	同左
溶 出 性	イルベサルタン (%) ＜30 分, 70%以上＞	CV0100	93.2～95.6	94.2～95.5	90.6～94.8	93.4～95.1	90.7～94.3
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ＜30 分, 75%以上＞	CV0100	94.2～98.0	96.6～99.9	94.6～98.7	92.0～100.3	96.1～99.2
含 量	イルベサルタン (%) ※ ＜95.0～105.0%＞	CV0100	100.0	99.7	100.0	99.4	99.6
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ※ ＜95.0～105.0%＞	CV0100	98.6	98.5	98.3	98.1	98.9
(参考値) 硬度 (N) ＜19.6N 以上＞		CV0100	168	167	162	160	162

※：表示量に対する含有率 (%)

◇イルアミクス配合錠 HD「日医工」 無包装 25℃・75%RH [遮光, 開放]

測定項目 ＜規格＞		ロット 番号	保存期間				
			開始時	2 週	1 ヶ月	2 ヶ月	3 ヶ月
性状くうすいだいだい色の フィルムコーティング錠＞		CV0100	適合	同左	同左	同左	同左
溶 出 性	イルベサルタン (%) ＜30 分, 70%以上＞	CV0100	93.2～95.6	89.3～91.7	86.4～91.9	88.4～89.9	85.8～89.8
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ＜30 分, 75%以上＞	CV0100	94.2～98.0	80.6～99.3	90.0～96.7	84.1～97.8	92.6～97.5
含 量	イルベサルタン (%) ※ ＜95.0～105.0%＞	CV0100	100.0	99.2	99.6	99.7	99.5
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ※ ＜95.0～105.0%＞	CV0100	98.6	98.3	98.1	97.6	97.8
(参考値) 硬度 (N) ＜19.6N 以上＞		CV0100	168	132	132	134	124

※：表示量に対する含有率 (%)

◇イルアミクス配合錠 HD「日医工」 無包装 室温, 曝光 [D65 光源, シャレをラップで覆う]

測定項目 ＜規格＞		ロット 番号	総曝光量			
			開始時	30 万 Lx・hr	60 万 Lx・hr	120 万 Lx・hr
性状くうすいだいだい色の フィルムコーティング錠＞		CV0100	適合	同左	同左	同左
溶 出 性	イルベサルタン (%) ＜30 分, 70%以上＞	CV0100	93.2～95.6	95.0～96.3	93.8～96.4	94.8～96.0
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ＜30 分, 75%以上＞	CV0100	94.2～98.0	95.9～99.7	94.6～99.1	96.9～97.7
含 量	イルベサルタン (%) ※ ＜95.0～105.0%＞	CV0100	100.0	99.6	99.5	99.7
	アムロジピンベシル酸塩 (%) ※ ＜95.0～105.0%＞	CV0100	98.6	98.2	97.5	97.8
(参考値) 硬度 (N) ＜19.6N 以上＞		CV0100	168	164	172	170

※：表示量に対する含有率 (%)

本試験は、「(社) 日本病院薬剤師会：錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について (答申), 平成 11 年 8 月 20 日」を参考に評価した。

5. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

6. 他剤との配合変化（物理化学的変化）

該当しない

7. 溶出性

（1）溶出規格

イルアミクス配合錠 LD「日医工」及びイルアミクス配合錠 HD「日医工」は、日本薬局方医薬品各条に定められたイルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩錠の溶出規格に適合していることが確認されている。

（試験液に溶出試験第 2 液 900mL を用い、パドル法により、50rpm で試験を行う）

溶出規格

成分名	規定時間	溶出率
イルベサルタン	30 分	70%以上
アムロジピンベシル酸塩	30 分	75%以上

(2) 溶出試験²⁾

<イルアミクス配合錠 HD「日医工」>

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン等の一部改正について（平成 24 年 2 月 29 日
薬食審査発 0229 第 10 号）

(イルベサルタン)

試験条件

装置：日本薬局方 溶出試験法 パドル法


回転数及び試験液：50rpm (pH1.2, pH3.0, pH6.8, 水), 100rpm (pH6.8)

[判定]

- ・ pH1.2 (50rpm) では、標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。
- ・ pH3.0 (50rpm) では、標準製剤が 360 分における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す時点(15 分)及び 360 分において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率の±9%の範囲にあった。
- ・ pH6.8 (50rpm) では、標準製剤の平均溶出率が 60%及び 85%付近の 2 時点において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率の±15%の範囲にあった。
- ・ 水 (50rpm) では、標準製剤が 360 分における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す時点及び 360 分において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率の±9%の範囲にあった。
- ・ pH6.8 (100rpm) では、標準製剤は 15 分以内に平均 85%以上溶出し、15 分における本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率の±15%の範囲にあった。

イルアミクス配合錠 HD「日医工」の有効成分イルベサルタンについて、溶出挙動を標準製剤（配合錠，100mg）と比較した結果、全ての試験液において「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合した。

(溶出曲線)



(n=12)

(アマロジピン)

試験条件

装置：日本薬局方 溶出試験法 パドル法


回転数及び試験液：50rpm (pH1.2, pH3.0, pH6.8, 水), 100rpm (pH6.8)

[判定]

- ・ pH1.2 (50rpm) では、標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。
- ・ pH3.0 (50rpm) では、標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。
- ・ pH6.8 (50rpm) では、標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。
- ・ 水 (50rpm) では、標準製剤の平均溶出率が 40%及び 85%付近の 2 時点において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率の±15%の範囲にあった。
- ・ pH6.8 (100rpm) では、標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。

イルアミクス配合錠 HD「日医工」の有効成分アマロジピンについて、溶出挙動を標準製剤（配合錠，10mg）と比較した結果、全ての試験液において「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合した。

(溶出曲線)



(3) 含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験³⁾

＜イルアミクス配合錠 LD「日医工」＞

イルアミクス配合錠 LD「日医工」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン（平成 24 年 2 月 29 日 薬食審査発 0229 第 10 号）」に基づき、イルアミクス配合錠 HD「日医工」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた。

(イルベサルタン)

試験条件

装置：日本薬局方 溶出試験法 パドル法


回転数及び試験液：50rpm (pH1.2, pH3.0, pH6.8, 水), 100rpm (pH6.8)

[判定]

- ・ pH1.2 (50rpm) では、標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。また、最終比較時点 (15 分) における本品の個々の溶出率は、本品の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが 12 個中 1 個以下で、±25%の範囲を超えるものがなかった。
- ・ pH3.0 (50rpm) では、標準製剤が 360 分における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す時点及び 360 分において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±6%の範囲にあった。また、最終比較時点 (360 分) における本品の個々の溶出率は、本品の平均溶出率±9%の範囲を超えるものが 12 個中 1 個以下で、±15%の範囲を超えるものがなかった。
- ・ pH6.8 (50rpm) では、標準製剤の平均溶出率が約 60%及び 85%となる 2 時点において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±10%の範囲にあった。また、最終比較時点 (20 分) における本品の個々の溶出率は、本品の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが 12 個中 1 個以下で、±25%の範囲を超えるものがなかった。
- ・ 水 (50rpm) では、標準製剤が 360 分における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す時点及び 360 分において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±6%の範囲にあった。また、最終比較時点 (360 分) における本品の個々の溶出率は、本品の平均溶出率±9%の範囲を超えるものが 12 個中 1 個以下で、±15%の範囲を超えるものがなかった。
- ・ pH6.8 (100rpm) では、標準製剤の平均溶出率が約 60%及び 85%となる 2 時点において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±10%の範囲にあった。また、最終比較時点 (15 分) における本品の個々の溶出率は、本品の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが 12 個中 1 個以下で、±25%の範囲を超えるものがなかった。

イルアミクス配合錠 LD「日医工」の有効成分イルベサルタンについて、溶出挙動を標準製剤（イルアミクス配合錠 HD「日医工」）と比較した結果、全ての試験液において「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合した。

(溶出曲線)



(n=12)

(アムロジピン)

試験条件

装置：日本薬局方 溶出試験法 パドル法


回転数及び試験液：50rpm (pH1.2, pH5.0, pH6.8, 水), 100rpm (pH1.2)

[判定]

- pH1.2 (50rpm) では、標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。また、最終比較時点 (15 分) における本品の個々の溶出率は、本品の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが 12 個中 1 個以下で、±25%の範囲を超えるものがなかった。
- pH5.0 (50rpm) では、標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。また、最終比較時点 (15 分) における本品の個々の溶出率は、本品の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが 12 個中 1 個以下で、±25%の範囲を超えるものがなかった。
- pH6.8 (50rpm) では、標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。また、最終比較時点 (15 分) における本品の個々の溶出率は、本品の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが 12 個中 1 個以下で、±25%の範囲を超えるものがなかった。
- 水 (50rpm) では、標準製剤の平均溶出率が約 40%及び 85%となる 2 時点において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±10%の範囲にあった。また、最終比較時点 (240 分) における本品の個々の溶出率は、本品の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが 12 個中 1 個以下で、±25%の範囲を超えるものがなかった。
- pH1.2 (100rpm) では、標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。また、最終比較時点 (15 分) における本品の個々の溶出率は、本品の平均溶出率±15%の範囲を超えるものが 12 個中 1 個以下で、±25%の範囲を超えるものがなかった。

イルアミクス配合錠 LD「日医工」の有効成分アムロジピンについて、溶出挙動を標準製剤（イルアミクス配合錠 HD「日医工」）と比較した結果、全ての試験液において「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合した。

(溶出曲線)



8. 生物学的試験法

該当しない

9. 製剤中の有効成分の確認試験法

(1) 液体クロマトグラフィー，紫外可視吸光度測定法

定量法（1）で得た試料溶液及び標準溶液につき、液体クロマトグラフィーにより試験を行うとき、試料溶液のイルベサルタンのピーク及び標準溶液の主ピークの保持時間は等しい。また、それらのピークの吸収スペクトルは同一波長のところに同様の強度の吸収を認める。

(2) 液体クロマトグラフィー，紫外可視吸光度測定法

定量法（2）で得た試料溶液及び標準溶液につき、液体クロマトグラフィーにより試験を行うとき、試料溶液のアムロジピンのピーク及び標準溶液の主ピークの保持時間は等しい。また、それらのピークの吸収スペクトルは同一波長のところに同様の強度の吸収を認める。

10. 製剤中の有効成分の定量法

(1) イルベサルタン；液体クロマトグラフィー

検出器：紫外吸光光度計

移動相：メタノール，リン酸塩緩衝液混液

(2) アムロジピンベシル酸塩；液体クロマトグラフィー

検出器：紫外吸光光度計

移動相：メタノール，リン酸塩緩衝液混液

11. 力価

該当しない

12. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報

該当しない

14. その他

特になし

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

高血圧症

<効能・効果に関連する使用上の注意>

過度な血圧低下のおそれ等があり，本剤を高血圧治療の第一選択薬としないこと。

2. 用法及び用量

通常，成人には1日1回1錠（イルベサルタン/アムロジピンとして100mg/5mg又は100mg/10mg）を経口投与する。本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。

<用法・用量に関連する使用上の注意>

(1) 以下のイルベサルタンとアムロジピンの用法・用量を踏まえ，患者毎に用量を決めること。

イルベサルタン

通常，成人にはイルベサルタンとして50～100mgを1日1回経口投与する。

なお，年齢，症状により適宜増減するが，1日最大投与量は200mgまでとする。

アムロジピン

・高血圧症

通常，成人にはアムロジピンとして2.5～5mgを1日1回経口投与する。なお，症状に応じ適宜増減するが，効果不十分な場合には1日1回10mgまで増量することができる。

(2) 原則として，イルベサルタン100mg及びアムロジピンとして5mgを併用している場合，あるいはいずれか一方を使用し血圧コントロールが不十分な場合に，100mg/5mgへの切り替えを検討すること。

(3) 原則として，イルベサルタン100mg及びアムロジピンとして5mgを併用若しくは100mg/5mgで血圧コントロールが不十分な場合に，100mg/10mgへの切り替えを検討すること。

3. 臨床成績

(1) 臨床データパッケージ

該当資料なし

(2) 臨床効果

該当資料なし

(3) 臨床薬理試験

該当資料なし

(4) 探索的試験

該当資料なし

(5) 検証的試験

1) 無作為化並行用量反応試験

該当資料なし

2) 比較試験

該当資料なし

3) 安全性試験

該当資料なし

4) 患者・病態別試験

該当資料なし

(6) 治療的使用

1) 使用成績調査・特定使用成績調査（特別調査）・製造販売後臨床試験（市販後臨床試験）

該当資料なし

2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要

該当しない

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連のある化合物又は化合物群

[イルベサルタン]

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬

(カンデサルタン, シレキセチル, ロサルタンカリウム等)

[アムロジピン]

1,4-ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬

(ニフェジピン, ニカルジピン塩酸塩等)

2. 薬理作用

(1) 作用部位・作用機序

[イルベサルタン]⁴⁾

アンジオテンシンⅡ受容体のサブタイプ AT₁ 受容体の拮抗薬。内因性昇圧物質のアンジオテンシンⅡに対して受容体レベルで競合的に拮抗することにより降圧作用を現す。

[アムロジピン]⁵⁾

ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬としての作用を示すが、作用の発現が緩徐で持続的であるという特徴を有する。ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬は膜電位依存性 L 型カルシウムチャネルに特異的に結合し、細胞内へのカルシウムの流入を減少させることにより、冠血管や末梢血管の平滑筋を弛緩させる。

(2) 薬効を裏付ける試験成績

該当資料なし

(3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 最高血中濃度到達時間

(「臨床試験で確認された血中濃度」の項参照)


(3) 臨床試験で確認された血中濃度⁶⁾

<イルアミクス配合錠 HD「日医工」>

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン等の一部改正について（平成 24 年 2 月 29 日 薬食審査発 0229 第 10 号）

イルアミクス配合錠 HD「日医工」及び標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠（イルベサルタンとして 100mg 及びアムロジピンとして 10mg）健康成人男性に絶食単回経口投与して血漿中イルベサルタン濃度及びアムロジピン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC, Cmax）について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、イルベサルタン及びアムロジピンともに $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

[イルベサルタン]




[薬物速度論的パラメータ]

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUCt (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
イルアミクス配合錠 HD「日医工」	8499.7±2238.0	1874.9±534.1	1.78±0.93	10.63±4.62
標準製剤 (配合錠，100mg)	7838.0±1765.9	1885.0±475.0	1.20±0.73	10.72±4.77

(1錠投与，Mean±S.D.，n=23)

[アムロジピン]



[薬物速度論的パラメータ]

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUCt (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
イルアミクス配合錠 HD「日医工」	318.40±78.00	9.62±2.24	4.91±1.04	41.2±10.6
標準製剤 (配合錠，10mg)	322.64±83.78	9.25±2.00	5.00±0.80	42.5±13.1

(1錠投与，Mean±S.D.，n=23)

血漿中濃度並びに AUC，Cmax 等のパラメータは，被験者の選択，体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(4) 中毒域

該当資料なし

(5) 食事・併用薬の影響

(「Ⅷ - 7. 相互作用」の項参照)

(6) 母集団（ポピュレーション）解析により判明した薬物体内動態変動要因

該当資料なし

2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

(3) バイオアベイラビリティ

該当資料なし

(4) 消失速度定数

該当資料なし

(5) クリアランス

該当資料なし

(6) 分布容積

該当資料なし

(7) 血漿蛋白結合率

該当資料なし

3. 吸収

該当資料なし

4. 分布

(1) 血液-脳関門通過性

該当資料なし

(2) 血液-胎盤関門通過性

(「VIII - 10. 妊婦, 産婦, 授乳婦等への投与」の項参照)

(3) 乳汁への移行性

(「VIII - 10. 妊婦, 産婦, 授乳婦等への投与」の項参照)

(4) 髄液への移行性

該当資料なし

(5) その他の組織への移行性

該当資料なし

5. 代謝

(1) 代謝部位及び代謝経路

該当資料なし

(2) 代謝に関与する酵素 (CYP450 等) の分子種

アムロジピンの代謝には主として薬物代謝酵素 CYP3A4 が関与していると考えられている。

(3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4) 代謝物の活性の有無及び比率

該当資料なし

(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ

該当資料なし

6. 排泄

(1) 排泄部位及び経路

該当資料なし

(2) 排泄率

該当資料なし

(3) 排泄速度

該当資料なし

7. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

8. 透析等による除去率

該当資料なし

Ⅷ. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由

該当記載事項なし

2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む）

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

- (1) 本剤の成分又はジヒドロピリジン系化合物に対し過敏症の既往歴のある患者
- (2) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）
- (3) アリスキレンを投与中の糖尿病患者（ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く）〔非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧のリスク増加が報告されている。（「重要な基本的注意」の項参照）〕

3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由

（「Ⅴ. 治療に関する項目」参照）

4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由

（「Ⅴ. 治療に関する項目」参照）

5. 慎重投与内容とその理由

- (1) 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者（「重要な基本的注意」の項参照）
- (2) 高カリウム血症の患者（「重要な基本的注意」の項参照）
- (3) 重篤な腎機能障害のある患者〔過度の降圧により腎機能を悪化させるおそれがある。〕
- (4) 肝機能障害のある患者，特に胆汁性肝硬変及び胆汁うっ滞のある患者〔イルベサルタンは主に胆汁中に排泄されるため，これらの患者では血中濃度が上昇するおそれがある。アムロジピンは主として肝臓で代謝されるため，肝機能障害のある患者では，血中濃度半減期の延長及び血中濃度－時間曲線下面積（AUC）が増大することがある。アムロジピン高用量（10mg）において副作用の発現頻度が高くなる可能性があるため，増量時には慎重に投与すること。（「副作用」の項参照）〕
- (5) 脳血管障害のある患者〔過度の降圧が脳血流不全を引き起こし，病態を悪化させるおそれがある。〕
- (6) 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）

6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法

- (1) 本剤はイルベサルタンとアムロジピンの配合剤であり、イルベサルタンとアムロジピン双方の副作用が発現するおそれがあるため、適切に本剤の使用を検討すること。
- (2) 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者においては、イルベサルタンによる腎血流量の減少や糸球体ろ過圧の低下により急速に腎機能を悪化させるおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。
- (3) 高カリウム血症の患者においては、イルベサルタンにより高カリウム血症を増悪させるおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。また、腎機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、高カリウム血症が発現するおそれがあるので、血清カリウム値に注意すること。
- (4) アリスキレンを併用する場合、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。なお、eGFR が60mL/min/1.73m²未満の腎機能障害のある患者へのアリスキレンとの併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。
- (5) 本剤の投与によって、一過性の急激な血圧低下を起こすおそれがあるので、そのような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、特に次の患者では患者の状態を十分に観察すること。
 - 1) 血液透析中の患者
 - 2) 利尿降圧剤投与中の患者
 - 3) 嚴重な減塩療法中の患者
- (6) イルベサルタンを含むアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤投与中に重篤な肝機能障害があらわれたとの報告がある。肝機能検査を実施するなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- (7) 降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
- (8) 手術前 24 時間は投与しないことが望ましい。
- (9) アムロジピンは血中濃度半減期が長く投与中止後も緩徐な降圧効果が認められるので、本剤投与中止後に他の降圧剤を使用するときは、用量並びに投与間隔に留意するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

7. 相互作用

アムロジピンの代謝には主として薬物代謝酵素 CYP3A4 が関与していると考えられている。

(1) 併用禁忌とその理由

該当しない

(2) 併用注意とその理由

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カリウム保持性利尿剤 スピロラクトン トリアムテレン等 カリウム補給製剤 塩化カリウム	血清カリウム値が上昇することがあるので注意すること。	機序：イルベサルタンのアルドステロン分泌抑制によりカリウム貯留作用が増強する可能性がある。 危険因子：腎機能障害のある患者
アリスキレン	腎機能障害, 高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため, 腎機能, 血清カリウム値及び血圧を十分に観察すること。 なお, eGFR が 60mL/min/1.73m ² 未満の腎機能障害のある患者へのアリスキレンとの併用については, 治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。	併用によりレニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。
アンジオテンシン変換酵素阻害剤	腎機能障害, 高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため, 腎機能, 血清カリウム値及び血圧を十分に観察すること。	
非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) COX-2 選択的阻害剤	イルベサルタンの降圧作用が減弱するおそれがある。	血管拡張作用を有するプロスタグランジンの合成阻害により, イルベサルタンの降圧作用を減弱させる可能性がある。
	腎機能が低下している患者では, さらに腎機能が悪化するおそれがある。	プロスタグランジンの合成阻害により, 腎血流量が低下するためと考えられる。
リチウム	イルベサルタンによるリチウム中毒が報告されているので, 血中リチウム濃度に注意すること。	リチウムの再吸収はナトリウムと競合するため, イルベサルタンのナトリウム排泄作用により, リチウムの再吸収が促進されることが考えられる。
降圧作用を有する薬剤	相互に作用を増強するおそれがある。慎重に観察を行うなど注意して使用する。	相互に作用を増強するおそれがある。
CYP3A4 阻害剤 エリスロマイシン ジルチアゼム リトナビル イトラコナゾール等	エリスロマイシン及びジルチアゼムとの併用により, アムロジピンの血中濃度が上昇したとの報告がある。	アムロジピンの代謝が競合的に阻害される可能性が考えられる。
CYP3A4 誘導剤 リファンピシン等	アムロジピンの血中濃度が低下するおそれがある。	アムロジピンの代謝が促進される可能性が考えられる。
グレープフルーツジュース	アムロジピンの降圧作用が増強されるおそれがある。同時服用をしないように注意すること。	グレープフルーツに含まれる成分がアムロジピンの代謝を阻害し, アムロジピンの血中濃度が上昇する可能性が考えられる。

続き

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
シンバスタチン	アムロジピンとシンバスタチン80mg（国内未承認の高用量）との併用により、シンバスタチンのAUCが77%上昇したとの報告がある。	機序不明。
タクロリムス	アムロジピンとの併用によりタクロリムスの血中濃度が上昇し、腎障害等のタクロリムスの副作用が発現するおそれがある。併用時にはタクロリムスの血中濃度をモニターし、必要に応じてタクロリムスの用量を調整すること。	アムロジピンとタクロリムスは、主としてCYP3A4により代謝されるため、併用によりタクロリムスの代謝が阻害される可能性が考えられる。

8. 副作用

(1) 副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(2) 重大な副作用と初期症状（以下、全て頻度不明）

- 1) **血管浮腫**：顔面，口唇，咽頭，舌等の腫脹を症状とする血管浮腫があらわれることがあるので，観察を十分に行い，異常が認められた場合には投与を中止し，適切な処置を行うこと。
- 2) **高カリウム血症**：重篤な高カリウム血症があらわれることがあるので，観察を十分に行い，異常が認められた場合には，直ちに適切な処置を行うこと。
- 3) **ショック，失神，意識消失**：ショック，血圧低下に伴う失神，意識消失があらわれることがあるので，観察を十分に行い，冷感，嘔吐，意識消失等があらわれた場合には，直ちに適切な処置を行うこと。
特に，血液透析中，嚴重な減塩療法中，利尿降圧剤投与中の患者では患者の状態を十分に観察すること。
- 4) **腎不全**：腎不全があらわれることがあるので，観察を十分に行い，異常が認められた場合には投与を中止し，適切な処置を行うこと。
- 5) **劇症肝炎，肝機能障害，黄疸**：劇症肝炎，AST (GOT)，ALT (GPT)，ALP， γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害，黄疸があらわれることがあるので，観察を十分に行い，異常が認められた場合には投与を中止し，適切な処置を行うこと。
- 6) **低血糖**：低血糖があらわれることがある（糖尿病治療中の患者であらわれやすい）ので，観察を十分に行い，脱力感，空腹感，冷汗，手の震え，集中力低下，痙攣，意識障害等があらわれた場合には投与を中止し，適切な処置を行うこと。
- 7) **横紋筋融解症**：筋肉痛，脱力感，CK (CPK) 上昇，血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので，観察を十分に行い，このような場合には直ちに投与を中止し，適切な処置を行うこと。また，横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。

続き

- 8) **無顆粒球症, 白血球減少, 血小板減少** : 無顆粒球症, 白血球減少, 血小板減少があらわれることがあるので, 検査を行うなど観察を十分に行い, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。
- 9) **房室ブロック** : 房室ブロック (初期症状 : 徐脈, めまい等) があらわれることがあるので, 異常が認められた場合には投与を中止し, 適切な処置を行うこと。

(3) その他の副作用

次のような副作用が認められた場合には, 必要に応じ, 減量, 投与中止等の適切な処置を行うこと。

	頻度不明
過 敏 症 ^{注1)}	発疹, そう痒, 蕁麻疹, 光線過敏症, 多形紅斑, 血管炎, 血管浮腫
肝 臓	肝機能障害, ALT (GPT) 上昇, AST (GOT) 上昇, ALP 上昇, ビリルビン上昇, γ -GTP 上昇, LDH 上昇, 黄疸, 腹水
筋・骨格系	関節痛, 筋痙攣, 背部痛, 筋肉痛, 筋力低下, 筋緊張亢進
血 液	貧血, 紫斑, 白血球増加, 赤血球減少, ヘマトクリット減少, ヘモグロビン減少, 白血球減少, 好酸球増加, 血小板減少
循 環 器	浮腫 ^{注2)} , 動悸, ほてり (熱感, 顔面潮紅等), 失神, 頻脈, 起立性低血圧, 心房細動, 胸痛, 期外収縮, 血圧低下, 徐脈, 洞房又は房室ブロック, 洞停止
消 化 器	逆流性食道炎, 下痢・軟便, 口内炎, 心窩部痛, 便秘, 胃腸炎, 悪心, 嘔吐, 胸やけ, 胃不快感, 口渇, 消化不良, 排便回数増加, 膵炎, 腹痛, 腹部膨満
腎 臓	尿管結石, 頻尿・夜間頻尿, クレアチニン上昇, BUN 上昇, 尿中蛋白陽性, 尿沈渣異常, 尿潜血陽性, 排尿障害
精神神経系	めまい・ふらつき, 頭痛・頭重, 眠気, しびれ, 末梢神経障害, もうろう感, 不眠, 振戦, 気分動揺, 錐体外路症状
代謝異常	CK (CPK) 上昇, 尿酸上昇, 尿中ブドウ糖陽性, 糖尿病, コレステロール上昇, 血中カリウム減少, 血中カリウム上昇, 高血糖
そ の 他	脳梗塞, 異常感覚, けん怠感, CRP 上昇, 咳嗽, 体重増加, 脱毛, 脱力感, 勃起障害, 鼻出血, 鼻炎, 霧視, 味覚異常, 発熱, 総蛋白減少, 耳鳴, 疲労, 視力異常, 呼吸困難, 多汗, (連用により) 歯肉肥厚 ^{注1)} , 性功能異常, 女性化乳房, 体重減少, 疼痛, 皮膚変色

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

注2) アムロジピン製剤を増量して10mgを投与した場合に, 高い頻度で認められたとの報告がある。

(4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

該当資料なし

(5) 基礎疾患, 合併症, 重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度

該当資料なし

(6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法

- 1) **禁忌**：本剤の成分又はジヒドロピリジン系化合物に対し過敏症の既往歴のある患者には投与しないこと。
- 2) **重大な副作用**：①顔面，口唇，咽頭，舌等の腫脹を症状とする血管浮腫があらわれることがあるので，観察を十分に行い，異常が認められた場合には投与を中止し，適切な処置を行うこと。②ショック，血圧低下に伴う失神，意識消失があらわれることがあるので，観察を十分に行い，冷感，嘔吐，意識消失等があらわれた場合には，直ちに適切な処置を行うこと。特に，血液透析中，嚴重な減塩療法中，利尿降圧剤投与中の患者では患者の状態を十分に観察すること。
- 3) **その他の副作用**：過敏症（発疹，そう痒，蕁麻疹，光線過敏症，多形紅斑，血管炎，血管浮腫）症状があらわれた場合には投与を中止すること。

9. 高齢者への投与

- (1) 高齢者では一般に過度の降圧は好ましくないとされているので，患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。[脳梗塞等が起こるおそれがある。]
- (2) 他社が実施した国内臨床試験では65歳未満の非高齢者と65歳以上の高齢者において，イルベサルタン／アムロジピン製剤の効果及び安全性に差はみられなかった。
- (3) アムロジピンは，高齢者での体内動態試験で血中濃度が高く，血中濃度半減期が長くなる傾向が認められているので，患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

10. 妊婦，産婦，授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。また，投与中に妊娠が判明した場合には，直ちに投与を中止すること。[妊娠中期及び末期に他のアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤やアンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与された高血圧症の患者で羊水過少症，胎児・新生児の死亡，新生児の低血圧，腎不全，高カリウム血症，頭蓋の形成不全及び羊水過少症によると推測される四肢の拘縮，頭蓋顔面の奇形，肺の發育不全等があらわれたとの報告がある。アムロジピンは動物実験で妊娠末期に投与すると妊娠期間及び分娩時間が延長することが認められている。]
- (2) 授乳中の婦人への投与を避け，やむを得ず投与する場合には授乳を中止させること。[イルベサルタンでは動物実験（ラット）において乳汁中への移行が認められている。また，動物実験（ラット出生前及び出生後の発生並びに母体の機能に関する試験）の50mg/kg/日以上で哺育期間において出生児の体重増加抑制が認められている。アムロジピンではヒト母乳中へ移行することが報告されている。⁷⁾]

11. 小児等への投与

低出生体重児，新生児，乳児，幼児又は小児に対する安全性は確立していない。[使用経験がない。]

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

該当記載事項なし

13. 過量投与

(1) **症状**：イルベサルタンの主な徴候，症状は，著しい血圧低下，頻脈と考えられる。アムロジピンは，過度の末梢血管拡張により，ショックを含む著しい血圧低下と反射性頻脈を起こすことがある。

(2) **処置**：通常，次のような処置を行う。

1) 心・呼吸機能のモニターを行い，頻回に血圧を測定する。著しい血圧低下が認められた場合は，四肢の挙上，輸液の投与等，心血管系に対する処置を行う。症状が改善しない場合は，循環血液量及び排尿量に注意しながら昇圧剤の投与を考慮する。

2) 催吐，活性炭投与又は胃洗浄：アムロジピン服用直後に活性炭を投与した場合，アムロジピンの AUC は 99%減少し，服用 2 時間後では 49%減少したことから，アムロジピン過量投与時の吸収抑制処置として活性炭投与が有効であると報告されている。

注意：イルベサルタン及びアムロジピンは蛋白結合率が高いため，血液透析による除去は有効ではない。

14. 適用上の注意

薬剤交付時：PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。(PTP シートの誤飲により，硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し，更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)

15. その他の注意

因果関係は明らかではないが，アムロジピンによる治療中に心筋梗塞や不整脈（心室性頻拍を含む）がみられたとの報告がある。

16. その他

【取扱い上の注意】

使用期限内であっても，開封後はなるべく速やかに使用すること。

IX. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験

(1) **薬効薬理試験** (「VI. 薬効薬理に関する項目」参照)

(2) **副次的薬理試験**

該当資料なし

(3) **安全性薬理試験**

該当資料なし

(4) **その他の薬理試験**

該当資料なし

2. 毒性試験

(1) **単回投与毒性試験**

該当資料なし

(2) **反復投与毒性試験**

該当資料なし

(3) **生殖発生毒性試験**

該当資料なし

(4) **その他の特殊毒性**

該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

製 剤	イルアミクス配合錠 LD「日医工」 イルアミクス配合錠 HD「日医工」	劇薬，処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）
有効成分	イルベサルタン	なし
	アムロジピンベシル酸塩	毒薬*，劇薬

※：1錠中 amlodipine besilate として 13.87mg 以下を含有するものは劇薬である。

2. 有効期間又は使用期限

外箱等に表示の使用期限内に使用すること（3年：安定性試験結果に基づく）

3. 貯法・保存条件

気密容器で室温保存

4. 薬剤取扱い上の注意点

(1) 薬局での取り扱い上の留意点について

（「規制区分」，「貯法・保存条件」の項参照）

(2) 薬剤交付時の取扱いについて（患者等に留意すべき必須事項等）

患者向医薬品ガイド：有り，くすりのしおり：有り

（「Ⅷ. 安全性（使用上の注意等）に関する項目」を参照）

(3) 調剤時の留意点について

該当記載事項なし

5. 承認条件等

該当しない

6. 包装

	PTP 包装	バラ包装
イルアミクス配合錠 LD「日医工」	100錠（10錠×10）	200錠
	140錠（14錠×10）	
イルアミクス配合錠 HD「日医工」	100錠（10錠×10）	200錠
	140錠（14錠×10）	

7. 容器の材質

PTP：ポリ塩化ビニル・ポリ塩化ビニリデン複合フィルム，アルミニウム箔

バラ：ポリエチレン容器，ポリプロピレンキャップ

8. 同一成分・同効薬

同一成分：アイミクス配合錠 LD，アイミクス配合錠 HD

9. 国際誕生年月日

該当資料なし

10. 製造販売承認年月日及び承認番号

	製造承認年月日	承認番号
イルアミクス配合錠 LD「日医工」	2018年2月15日	23000AMX00252000
イルアミクス配合錠 HD「日医工」	2018年2月15日	23000AMX00253000

11. 薬価基準収載年月日

	薬価基準収載年月日
イルアミクス配合錠 LD「日医工」	2018年6月15日
イルアミクス配合錠 HD「日医工」	2018年6月15日

12. 効能又は効果追加, 用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

該当しない

13. 再審査結果, 再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

14. 再審査期間

該当しない

15. 投与期間制限医薬品に関する情報

本剤は、投薬期間制限の対象となる医薬品ではない。

16. 各種コード

	薬価基準収載 医薬品コード	レセプト 電算コード	HOT(9桁) コード
イルアミクス配合錠 LD「日医工」	2149118F1160	622629301	126293301
イルアミクス配合錠 HD「日医工」	2149118F2166	622625901	126259901

17. 保険給付上の注意

本剤は保険診療上の後発医薬品である。

X I. 文献

1. 引用文献

- 1) 日医工株式会社 社内資料：安定性試験
- 2) 日医工株式会社 社内資料：溶出試験 (HD)
- 3) 日医工株式会社 社内資料：生物学的同等性試験 (LD)
- 4) 第十七改正日本薬局方解説書 C-681, 廣川書店, 東京 (2016)
- 5) 第十七改正日本薬局方解説書 C-284, 廣川書店, 東京 (2016)
- 6) 中川美聡 他：医学と薬学, 75 (3), 219 (2018)
- 7) Naito T, et al. : J Hum Lact 31(2) : 301, 2015

2. その他の参考文献

なし

X II. 参考資料

1. 主な外国での発売状況

なし

2. 海外における臨床支援情報

なし

X III. 備考

その他の関連資料

なし

付表 1-1

薬食発 1121 第 2 号（平成 26 年 11 月 21 日）に基づく承認申請時に添付する資料

別表 1 及び別表 2-（1）医療用医薬品より改変

添付資料の内容		新有効成分 含有製剤 (先発医薬品)	その他の医薬品 (後発医薬品)	剤形追加に係る 医薬品 (後発医薬品)
イ 起源又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料	1 起源又は発見の経緯	○	×	○
	2 外国における使用状況	○	×	○
	3 特性及び他の医薬品との比較検討等	○	×	○
ロ 製造方法並びに規格及び試験方法等に関する資料	1 構造決定及び物理化学的性質等	○	×	×
	2 製造方法	○	△	○
	3 規格及び試験方法	○	○	○
ハ 安定性に関する資料	1 長期保存試験	○	×	△
	2 苛酷試験	○	×	△
	3 加速試験	○	○	○
ニ 薬理作用に関する資料	1 効力を裏付ける試験	○	×	×
	2 副次的薬理・安全性薬理	○	×	×
	3 その他の薬理	△	×	×
ホ 吸収, 分布, 代謝, 排泄に関する資料	1 吸収	○	×	×
	2 分布	○	×	×
	3 代謝	○	×	×
	4 排泄	○	×	×
	5 生物学的同等性	×	○	○
	6 その他の薬物動態	△	×	×
ヘ 急性毒性, 亜急性毒性, 慢性毒性, 催奇形性その他の毒性に関する資料	1 単回投与毒性	○	×	×
	2 反復投与毒性	○	×	×
	3 遺伝毒性	○	×	×
	4 がん原性	△	×	×
	5 生殖発生毒性	○	×	×
	6 局所刺激性	△	×	×
	7 その他の毒性	△	×	×
ト 臨床試験の成績に関する資料	臨床試験成績	○	×	×
チ 法第五十二条第一項に規定する添付文書等記載事項に関する資料	添付文書等記載事項	○	○	○

○：添付，×：添付不要，△：個々の医薬品により判断される

付表 1-2

薬食発第 0331015 号（平成 17 年 3 月 31 日）に基づく承認申請時に添付する資料

別表 1 及び別表 2-（1）医療用医薬品より改変

添付資料の内容		新有効成分 含有製剤 (先発医薬品)	その他の医薬品 (後発医薬品)	剤形追加に係る 医薬品 (後発医薬品)
イ 起源又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料	1 起源又は発見の経緯	○	×	○
	2 外国における使用状況	○	×	○
	3 特性及び他の医薬品との比較検討等	○	×	○
ロ 製造方法並びに規格及び試験方法等に関する資料	1 構造決定及び物理化学的性質等	○	×	×
	2 製造方法	○	△	○
	3 規格及び試験方法	○	○	○
ハ 安定性に関する資料	1 長期保存試験	○	×	△
	2 苛酷試験	○	×	△
	3 加速試験	○	○	○
ニ 薬理作用に関する資料	1 効力を裏付ける試験	○	×	×
	2 副次的薬理・安全性薬理	○	×	×
	3 その他の薬理	△	×	×
ホ 吸収, 分布, 代謝, 排泄に関する資料	1 吸収	○	×	×
	2 分布	○	×	×
	3 代謝	○	×	×
	4 排泄	○	×	×
	5 生物学的同等性	×	○	○
	6 その他の薬物動態	△	×	×
ヘ 急性毒性, 亜急性毒性, 慢性毒性, 催奇形性その他の毒性に関する資料	1 単回投与毒性	○	×	×
	2 反復投与毒性	○	×	×
	3 遺伝毒性	○	×	×
	4 がん原性	△	×	×
	5 生殖発生毒性	○	×	×
	6 局所刺激性	△	×	×
	7 その他の毒性	△	×	×
ト 臨床試験の成績に関する資料	臨床試験成績	○	×	×

○：添付，×：添付不要，△：個々の医薬品により判断される

付表 1-3

医薬発第 481 号（平成 11 年 4 月 8 日）に基づく承認申請時に添付する資料

別表 1 及び別表 2-（1）医療用医薬品より改変

添付資料の内容		新有効成分 含有製剤 (先発医薬品)	その他の医薬品 (後発医薬品)	剤形追加に係る 医薬品 (後発医薬品)
イ 起源又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料	1 起源又は発見の経緯	○	×	○
	2 外国における使用状況	○	×	○
	3 特性及び他の医薬品との比較検討等	○	×	○
ロ 物理的・化学的性質並びに規格及び試験方法等に関する資料	1 構造決定	○	×	×
	2 物理的・科学的性質等	○	×	×
	3 規格及び試験方法	○	○	○
ハ 安定性に関する資料	1 長期保存試験	○	×	△
	2 苛酷試験	○	×	△
	3 加速試験	○	○	○
ニ 急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、催奇形性その他の毒性に関する資料	1 単回投与毒性	○	×	×
	2 反復投与毒性	○	×	×
	3 生殖発生毒性	○	×	×
	4 変異原性	○	×	×
	5 がん原性	△	×	×
	6 局所刺激性	△	×	×
	7 その他の毒性	△	×	×
ホ 薬理作用に関する資料	1 効力を裏付ける試験	○	×	×
	2 一般薬理	○	×	×
ヘ 吸収、分布、代謝、排泄に関する資料	1 吸収	○	×	×
	2 分布	○	×	×
	3 代謝	○	×	×
	4 排泄	○	×	×
	5 生物学的同等性	×	○	○
ト 臨床試験の成績に関する資料	臨床試験成績	○	×	×

○：添付，×：添付不要，△：個々の医薬品により判断される

付表 1-4

薬発第 698 号（昭和 55 年 5 月 30 日）に基づく承認申請時に添付する資料

別表 1 及び別表 2-（1）医療用医薬品より改変

添付資料の内容		新有効成分 含有製剤 (先発医薬品)	その他の医薬品 (後発医薬品)	剤形追加に係る 医薬品 (後発医薬品)
イ 起源又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料	1 起源又は発見の経緯	○	×	○
	2 外国における使用状況	○	×	○
	3 特性及び他の医薬品との比較検討等	○	×	○
ロ 物理的・化学的性質並びに規格及び試験方法等に関する資料	1 構造決定	○	×	×
	2 物理的・化学的性質等	○	×	×
	3 規格及び試験方法	○	○	○
ハ 安定性に関する資料	1 長期保存試験	○	×	×
	2 苛酷試験	○	×	×
	3 加速試験	×	○	○
ニ 急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、催奇形性その他の毒性に関する資料	1 急性毒性	○	×	×
	2 亜急性毒性	○	×	×
	3 慢性毒性	○	×	×
	4 生殖に及ぼす影響	○	×	×
	5 依存性	△	×	×
	6 抗原性	△	×	×
	7 変異原性	△	×	×
	8 がん原性	△	×	×
	9 局所刺激	△	×	×
ホ 薬理作用に関する資料	1 効力を裏付ける試験	○	×	×
	2 一般薬理	○	×	×
ヘ 吸収、分布、代謝、排泄に関する資料	1 吸収	○	×	×
	2 分布	○	×	×
	3 代謝	○	×	×
	4 排泄	○	×	×
	5 生物学的同等性	×	○	○
ト 臨床試験の試験成績に関する資料	臨床試験の試験成績	○	×	○

○：添付，×：添付不要，△：個々の医薬品により判断される