

※【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

ジスルフィラム、シアナミド、カルモフール、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者([1]相互作用の項参照)

〔組成・性状〕

本品は1mL中、日局キヨウニン水1mLを含有する無色～微黄色澄明の液で、ベンズアルデヒド様のにおい及び特異な味がある。

pH: 3.5～5.0 比重 d_{20}^{20} : 0.968～0.978

〔効能・効果〕

急性気管支炎に伴う咳嗽及び喀痰喀出困難

〔用法・用量〕

キヨウニン水として、通常成人1日3mLを3～4回に分割経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
但し、極量として、1回2mL、1日6mLをこえないものとする。

〔使用上の注意〕

※(1)相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム (ノックピン)	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血压降下、恶心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起こすおそれがある。	
シアナミド (シアナマイド)		
カルモフール (ミフロール)		
プロカルバジン塩酸塩	本剤はエタノールを含有しているため。	



鎮咳去たん剤

※2009年7月改訂(第3版)

2005年4月改訂

規制区分:劇薬

貯 貯:遮光した気密容器

製造番号 ラベルに記載

使用期限

日本標準商品分類番号	872241
承認番号	16100AMZ00821
製価収載	1950年9月
販売開始	1949年1月



キヨウニン水 シオエ

500mL

製造番号

使用期限

製造販売元



シオエ製薬株式会社

兵庫県尼崎市潮江3丁目1番11号

販 売



日本新薬株式会社

京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフム系抗生物質(セフメノキシム塩酸塩、セフオペラゾンナトリウム、セフペラゾンナトリウム、セフミノクスナトリウム水和物、セフメタゾールナトリウム、ラタモキセフナトリウム)メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、恶心、頻脈、多汗、頭痛等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

〔2〕副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

●その他の副作用

大量投与(頻度不明) 恶心・嘔吐、下痢、めまい、頭痛、瞳孔散大、心悸亢進、過呼吸、チアノーゼ、意識喪失、窒息性痙攣等の症状があらわれるおそれがある。

〔3〕高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

〔4〕小児等への投与

小児等への投与を避けること。[小児等では副作用が発現しやすい。]

コード<調剤>

コード<販売>

