

去痰剤  
 \*\*2009年7月改訂(第3版)  
 \*2006年12月改訂

日本薬局方  
**セネガシロップ**  
 Senega Syrup  
 セネガシロップ「東海」  
 500mL



\*製造販売元  
**東海製薬株式会社**  
 名古屋市中川区江松一丁目105

貯法: 気密容器  
 使用期限: ラベルに記載

日本標準商品分類番号	872231
承認番号	(61AM)1866
薬価収載	1955年9月
販売開始	1955年9月
再評価結果	1981年8月

**\*\*【禁忌】(次の患者には投与しないこと)**  
 ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン  
 塩酸塩を投与中の患者(「相互作用」の項参照)

**【組成・性状】**

**1. 組成**

本剤100mL中、セネガ4g及び添加物としてエタノール、白糖を含有する。

**2. 性状**

本剤は黄褐色の濃稠な液で、サリチル酸メチルような特異なおいがあり、味は甘い。

**【効能・効果】**

下記疾患に伴う喀痰喀出困難  
 急性気管支炎、感冒・上気道炎

**【用法・用量】**

セネガシロップとして、通常成人1日10~35mLを3回に分割経口投与する。  
 なお、年齢、症状により適宜増減する。

製造番号

使用期限

**【使用上の注意】**

**1. 相互作用**

**\*\* (1) 併用禁忌 (併用しないこと)**

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム ・ノックセン シアナミド ・シアナミド カルモフル ・ミフロール プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

**\*\* (2) 併用注意 (併用に注意すること)**

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 ・セフメゾキシム塩酸塩 ・セフトラゾキサト륨 ・セフトラゾキサト륨水和物 ・セフメタゾールナトリウム ・ラタモキシフトラキム メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

**2. 副作用**

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

**その他の副作用**

**大量投与 (頻度不明)**  
 嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振を起こすことがある。

キャップ: PP  
 中 栓: PE  
 外装フィルム: PVC

GS1-RSS



JAN

987394113119

4