



蜂 印

Senega Syrup
日本薬局方

セネガシロップ

** セネガシロップ〈ハチ〉

500mL

販売

小野薬品工業株式会社
大阪市中央区久太郎町1丁目8番2号

製造販売

東洋製薬化成株式会社
大阪市鶴見区鶴見2丁目5番4号

GS1<調剤包装単位>



(01)04987039460431

GS1<販売包装単位>



(01)14987039131451

**2016年 1月改訂(第10版)

*2014年 3月改訂

日本標準商品分類番号

872231

承認番号 (61AM)3168

薬価収載 1986年3月

販売開始 1986年3月

再評価結果 1981年8月

貯法: 気密容器

使用期限: ラベルに表示(3年)

去たん剤

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン
塩酸塩を投与中の患者(「相互作用」の項参照)

【組成・性状】

- 組成 100mL中 セネガ4g含有。
添加物として白糖、デヒドロ酢酸ナトリウム、エタノール、カラメルを含有する。
- 性状 黄褐色の濃稠な液で、サリチル酸メチル様の特異なにおいがあり、味は甘い。

【効能・効果】

下記疾患に伴う喀痰喀出困難
急性気管支炎、感冒・上気道炎

【用法・用量】

セネガシロップとして、通常成人1日10~35mLを3回に分
割経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

- 相互作用
(1)併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム (ノックピン) シアナミド (シアナマイド) カルモフル (ミフロール) プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアル コール反応(顔面 潮紅、血圧降下、悪 心、頻脈、めまい、 呼吸困難、視力低下 等)を起こすおそれ がある。	本剤はエタノ ールを含有して いるため。

(2)併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾール チオメチル基を有する セフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸塩 セフォバゾンナトリウム セフペラゾンナトリウム セフミノクスナトリウム水和物 セフメタゾールナトリウム ラタモキシセフトナトリウム メトロニダゾール	これらの薬剤とのアル コール反応(顔面 潮紅、悪心、頻脈、 多汗、頭痛等)を起 こすおそれがある。	本剤はエタノ ールを含有して いるため。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査
を実施していない。

その他の副作用

	頻度不明
大量投与	嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振

*【薬効薬理】

咽頭等の粘膜刺激により舌咽神経を介して反射的に気道液分
泌を増加し、分泌された粘液の排出機能をも亢進して、去たん
作用を現すものと推定される。

【文献請求先】

東洋製薬化成株式会社 医薬情報部
〒533-0031
大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号
電話 0120-443-471



使用期限

製造番号