



蜂

印

1R

Apricot Kernel Water

日本薬局方

キョウニン水

**キョウニン水<ハチ>

500mL

使用期限

製造番号

販売

小野薬品工業株式会社

大阪市中央区久太郎町1丁目8番2号

製造販売

東洋製薬化成株式会社

大阪市鶴見区鶴見2丁目5番4号

GS1<調剤包装単位>



(01)704987039458612

GS1<販売包装単位>



(01)14987039121902

**2015年 5月改訂(第8版)

*2012年 4月改訂

日本標準商品分類番号

872241

承認番号 (61AM)3158

薬価収載 1986年3月

販売開始 1986年3月

再評価結果 1981年8月

貯法: 遮光、気密容器

使用期限: ラベルに表示(3年)

鎮咳去たん剤

劇薬

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者(「相互作用」の項参照)

【組成・性状】

1. 組成 1mL中 日本薬局方キョウニン水1mL含有。

2. 性状 無色~微黄色澄明の液で、ベンズアルデヒド様のおい及び特異な味がある。

pH: 3.5~5.0

【効能・効果】

急性気管支炎に伴う咳嗽及び喀痰喀出困難

【用法・用量】

キョウニン水として、通常成人1日3mLを3~4回に分割経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

但し、極量として、1回2mL、1日6mLをこえないものとする。

【使用上の注意】

1. 相互作用

(1)併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム (ノックピン)	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。
シアナミド (シアナマイド)		
カルモフル (ミフロール)		
プロカルバジン塩酸塩		

(2)併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸塩 セフォペラゾンナトリウム セフペラゾンナトリウム セフミノクスナトリウム水和物 セフメタゾールナトリウム ラタモキシフェナトリウム メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

	頻度不明
大量投与	悪心・嘔吐、下痢、めまい、頭痛、瞳孔散大、心悸亢進、過呼吸、チアノーゼ、意識喪失、窒息性痙攣等

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

4. 小児等への投与

小児等への投与を避けること。

【文献請求先】

東洋製薬化成株式会社 医薬情報部

*〒533-0031

*大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号

*電話 0120-443-471

キャップ:PP
バックシール:PE,PP
キャップシール:PS
ガラス:瓶