



# 去痰剤

## 日本薬局方 セネガシロップ セネガシロップ「メタル」

Senega Syrup

# 500mL



ガラス 瓶

キャップ:PP

製造番号

使用期限

製造販売元

中北薬品株式会社

愛知県津島市白浜町字番場52-1

F

\*\*2016年10月改訂(第8版)  
\*2009年7月改訂

貯法: 室温保存  
使用期限: 容器に表示  
注意: 「取扱い上の注意」参照

日本標準商品分類番号	872231
承認番号	16000AMZ05828
薬価収載	1985年12月

販売開始	1986年1月
再評価結果	1981年8月

### \*【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者(「相互作用」の項参照)

### 【組成・性状】

#### 組成

本品 1 mL中、日局セネガ0.04gの10vol%エタノール抽出液を含む。添加物として白糖を含む。

#### 製剤の性状

本品は黄褐色の濃稠な液で、サリチル酸メチルのような特異なおいがあり、味は甘い。

### 【効能・効果】

下記疾患に伴う喀痰咯出困難  
急性気管支炎、感冒・上気道炎

### 【用法・用量】

セネガシロップとして、通常、成人 1日10~35mLを3回に分割経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

### 【使用上の注意】

#### 1. 相互作用

### \* (1) 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム ノックピン シアナミド シアナマイド カルモフル ミフール プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧低下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

### \* (2) 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸塩 セフォペラゾンナトリウム セフペラゾンナトリウム セフミノクスナトリウム水和物 セフメタゾールナトリウム ラタモксеフナトリウム メロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

### 2. 副作用

本品は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類/頻度	頻度不明
大量投与	嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振

### 【薬効薬理】

咽喉などの粘膜刺激により気道液分泌を増加し、分泌された粘液の排出機能をも亢進し、去痰作用をあらわすと推定される。(サポニン)

### 【取扱い上の注意】

本品は原料に天然物が含まれておりますので、その産地や採集時期により、製品の色調やにおいが一定しないことがあります。

### \*\* <安定性試験>

最終包装製品を用いた長期安定性試験の結果、本剤は通常の流通下において3年間安定であることが確認された。

### 【文献請求先】

中北薬品株式会社 製薬工場事業部  
〒496-0016 愛知県津島市白浜町字番場52-1  
TEL 0567-32-1431 FAX 0567-32-2961



(01)04987333021864