

NIKKO

去痰剤

セネガシロップ 「ニッコー」

SENEGA SYRUP「NIKKO」

日本薬局方 セネガシロップ

500mL

製造販売元

 日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

2015年5月改訂(第2版)	
2010年6月作成	
日本標準商品分類番号	872231
承認番号	16100AMZ01305
薬価収載	1979年1月
販売開始	1979年1月
再評価結果	1987年8月

貯法：室温保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)
ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者(「1.相互作用」の項参照)

【組成・性状】

- 組成
本品100mL中 日局セネガ4gの10vol%エタノール抽出液を含有する。
添加物として白糖を含有する。
- 性状
本品は黄褐色の濃稠な液で、サリチル酸メチルのような特異なおいがあり、味は甘い。

【効能・効果】

下記疾患に伴う喀痰喀出困難
急性気管支炎、感冒・上気道炎

【用法・用量】

セネガシロップとして、通常成人1日10~35mLを3回に分割経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

【取扱い上の注意】

本剤は原料に天然物が含まれておりますので、その産地や採集時期により、製品の色調やにおいが一定しないことがあります。

【使用上の注意】

1.相互作用

(1)併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム(ノックピソ) シアナミド(シアナマイド) カルモフル(ミフロール) プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起すおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

(2)併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 セフェメキシム塩酸塩 セフォペラゾンナトリウム セフトラゾラム水和物 セフトキシムナトリウム ラタモキシセフトラゾラム メロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等)を起すおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
その他の副作用
大量投与 嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振(頻度不明)を起すことがある。



キャップ：PP 製造番号

ガラス：瓶 使用期限

《調剤包装単位用コード》
81422316286940
(07)04987291232418

《販売包装単位用コード》
14987291832417