

貯 法：遮光し，なるべく30℃以下で保存

使用期限：外箱等に表示の使用期限内に使用すること

承認番号	22100AMX01586000
薬価収載	2009年9月
販売開始	2010年3月
再評価結果	1981年8月

## 鎮咳去痰剤

セキコデ配合シロップ  
SEKICODE

ジヒドロコデインリン酸塩・エフェドリン塩酸塩・塩化アンモニウムシロップ

## 【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

1. 重篤な呼吸抑制のある患者〔呼吸抑制を増強する。〕
- \*\* 2. 12歳未満の小児（「小児等への投与」の項参照）
3. 気管支喘息発作中の患者〔気道分泌を妨げる。〕
4. 重篤な肝障害のある患者〔昏睡に陥ることがある。〕
5. 慢性肺疾患に続発する心不全の患者〔呼吸抑制や循環不全を増強する。〕
6. 痙れん状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）にある患者〔脊髄の刺激効果があらわれる。〕
7. 急性アルコール中毒の患者〔呼吸抑制を増強する。〕
8. 本剤の成分及びアヘンアルカロイドに対し過敏症の患者
9. カテコールアミン（アドレナリン，イソプロテレノール，ドパミン等）を投与中の患者（「相互作用」の項参照）

## 【組成・性状】

## 1. 組成

販売名	セキコデ配合シロップ	
成分・分量	1 mL中	
	ジヒドロコデインリン酸塩	2 mg
	エフェドリン塩酸塩	2 mg
	塩化アンモニウム	5 mg
添加物	白糖，カンゾウエキス，ポリソルベート80，パラオキシ安息香酸メチル，パラオキシ安息香酸プロピル，カラメル，安息香酸ベンジル，エタノール，エチルバニリン，バニリン，プロピレングリコール，メントール，香料，グリセリン	

## 2. 製剤の性状

剤形	黒褐色の液
におい・味	特異な芳香があり，味は甘いがわずかに苦みが残る。

## 【効能・効果】

下記疾患に伴う咳嗽および喀痰略出困難  
急性気管支炎，慢性気管支炎，感冒・上気道炎

## \*【用法・用量】

通常成人1回3～5 mLを1日3回食後又は食間にそのまま，又は白湯でうすめて経口投与する。

12～14歳：成人量の2/3

## 【使用上の注意】

## 1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 心機能障害のある患者〔循環不全を増強するおそれがある。〕
- (2) 呼吸機能障害のある患者〔呼吸抑制を増強するおそれがある。〕
- (3) 肝・腎機能障害のある患者〔代謝・排泄が遅延し，副作用があらわれるおそれがある。〕
- (4) 脳に器質的障害のある患者〔呼吸抑制や頭蓋内圧の上昇を起こすおそれがある。〕
- (5) ショック状態にある患者〔循環不全や呼吸抑制を増強するおそれがある。〕

- (6) 代謝性アシドーシスのある患者〔呼吸抑制を起こすおそれがある。〕
- (7) 甲状腺機能低下症（粘液水腫等）の患者〔呼吸抑制や昏睡を起こすおそれがある。〕
- (8) 甲状腺機能亢進症の患者〔甲状腺機能亢進症が悪化するおそれがある。〕
- (9) 副腎皮質機能低下症（アジソン病等）の患者〔呼吸抑制作用に対し，感受性が高くなっている。〕
- (10) 薬物依存の既往歴のある患者〔依存性を生じやすい。〕
- (11) 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
- (12) 衰弱者〔呼吸抑制作用に対し，感受性が高くなっている。〕
- (13) 前立腺肥大症，尿道狭窄，尿路手術後の患者〔排尿障害が悪化するおそれがある。〕
- (14) 器質的幽門狭窄，麻痺性イレウス又は最近消化管手術を行った患者〔消化管運動を抑制する。〕
- (15) 痙れんの既往歴のある患者〔痙れんを誘発するおそれがある。〕
- (16) 胆のう障害及び胆石のある患者〔胆道痙れんを起こすことがある。〕
- (17) 重篤な炎症性腸疾患のある患者〔連用した場合，巨大結腸症を起こすおそれがある。〕
- (18) 高血圧症の患者〔エフェドリン塩酸塩には血圧上昇作用がある。〕
- (19) 心疾患のある患者〔エフェドリン塩酸塩には心刺激作用がある。〕
- (20) 糖尿病の患者〔血糖が上昇するおそれがある。〕
- (21) 緑内障の患者〔眼圧が上昇するおそれがある。〕

## 2. 重要な基本的注意

- (1) 用法・用量どおり正しく使用しても効果が認められない場合は，本剤が適当でないと考えられるので，投与を中止すること。  
なお，12歳以上の小児に投与する場合には，使用法を正しく指導し，経過の観察を十分に行うこと。
- (2) 重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるため，18歳未満の肥満，閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は重篤な肺疾患を有する患者には投与しないこと。
- (3) 過度に使用を続けた場合，不整脈，場合によっては心停止を起こすおそれがあるため，使用が過度にならないように注意すること。
- (4) 連用により薬物依存を生じることがあるので，観察を十分に行い，慎重に投与すること（「副作用」の項参照）。
- (5) 眠気，めまいが起こることがあるので，本剤投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

## 3. 相互作用

本剤に含まれるジヒドロコデインリン酸塩は，主として肝代謝酵素UGT2B7，UGT2B4及び一部CYP3A4，CYP2D6で代謝される。

## (1) 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カテコールアミン アドレナリン （ボスミン）， イソプロテレノール （プロタノール等）， ドパミン等	不整脈，場合によっては心停止を起こすおそれがある。	併用によりエフェドリン塩酸塩の交感神経刺激作用が増強される。

## (2) 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
キサンチン誘導体 テオフィリン、 ジプロフィリン等 ステロイド剤 プレドニゾロン、 ベタメタゾン等 利尿剤 フロセミド、 ヒドロクロロチア ジド等	血清カリウム値が低下するおそれがあるので、血清カリウム値をモニターするとともに、減量するなど注意すること。 〔副作用〕の項参照	併用によりエフェドリンの血清カリウム低下作用が増強される。
MAO阻害剤 甲狀腺製剤 レボチロキシン、 リオチロン等	エフェドリンの作用が増強されるおそれがあるので、減量するなど慎重に投与すること。	併用によりエフェドリン塩酸塩の交感神経刺激作用が増強される。
中枢神経抑制剤 フェノチアジン系 薬剤 バルビツール酸系 薬剤等 吸入麻酔剤 MAO阻害剤 三環系抗うつ剤 $\beta$ -遮断剤 アルコール	呼吸抑制、低血圧及び顕著な鎮静又は昏睡が起こることがある。	併用によりジヒドロコデインリン酸塩の中枢神経抑制作用が増強される。
抗コリン作用を有する薬剤	麻痺性イレウスに至る重篤な便秘又は尿貯留が起こるおそれがある。	ジヒドロコデインリン酸塩により抗コリン作用が増強される。
クマリン系抗凝血剤 ワルファリン	クマリン系抗凝血剤の作用が増強されることがある。	機序不明
**ナルメフェン塩酸塩水和物	本剤の効果が減弱するおそれがある。	$\mu$ オピオイド受容体拮抗作用により、本剤の作用が競合的に阻害される。

## 4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

### (1) 重大な副作用（頻度不明）

#### 1) 依存性

連用により薬物依存を生じることがあるので、観察を十分に行い、慎重に投与すること。また、連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止により、あくび、くしゃみ、流涙、発汗、悪心、嘔吐、下痢、腹痛、散瞳、頭痛、不眠、不安、せん妄、振戦、全身の筋肉・関節痛、呼吸促進等の退薬症候があらわれることがあるので、投与を中止する場合には、1日用量を徐々に減量するなど、患者の状態を観察しながら行うこと。

#### 2) 呼吸抑制

呼吸抑制があらわれることがあるので、息切れ、呼吸緩慢、不規則な呼吸、呼吸異常等があらわれた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

なお、ジヒドロコデインリン酸塩による呼吸抑制には、麻薬拮抗剤（ナロキソン、レバロルフアン等）が拮抗する。

#### 3) 錯乱

錯乱があらわれることがあるので、このような場合には、減量又は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

#### 4) 無気肺、気管支痙攣、喉頭浮腫

無気肺、気管支痙攣、喉頭浮腫があらわれるとの報告がある。

#### 5) 麻痺性イレウス、中毒性巨大結腸

炎症性腸疾患の患者に投与した場合は、麻痺性イレウス、中毒性巨大結腸があらわれるとの報告がある。

#### 6) 重篤な血清カリウム値の低下

$\beta_2$ -刺激剤により重篤な血清カリウム値の低下が報告されている。また、 $\beta_2$ -刺激剤による血清カリウム値の低下作用は、キサンチン誘導体、ステロイド剤及び利尿剤の併用により増強されることがあるので、重症喘息患者では特に注意すること。さらに、低酸素血症は、血清カリウム値の低下が心リズムに及ぼす作用を増強することがある。このような場合には、血清カリウム値をモニターすることが望ましい。

## (2) 重大な副作用（類薬）

### せん妄

ジヒドロコデインリン酸塩の類似化合物（モルヒネ）においてせん妄があらわれるとの報告があるので、このような場合には、減量又は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

## (3) その他の副作用

	頻度不明
循環器	不整脈、心悸亢進、血圧変動、顔面潮紅
精神神経系	眠気、めまい、視調節障害、頭痛・頭重、振戦、不眠、神経過敏、脱力感、発汗
消化器	悪心、嘔吐、食欲不振、便秘
過敏症 <sup>注)</sup>	発疹、痒痒感
泌尿器	排尿困難
長期連用 <sup>注)</sup>	不安、幻覚、妄想を伴う精神症状
その他	口渇

注：このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること。

## 5. 高齢者への投与

低用量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら、慎重に投与すること。〔一般に高齢者では生理機能が低下しており、特に呼吸抑制の感受性が高い。〕

## 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。〔ジヒドロコデインリン酸塩の類似化合物（コデイン）の動物実験（マウス）で催奇形作用（化骨遅延）が報告されている。〕

(2) 分娩前に投与した場合、出産後新生児に退薬症候（多動、神経過敏、不眠、振戦等）があらわれることがある。

(3) 分娩時の投与により、新生児に呼吸抑制があらわれることがある。

(4) 授乳中の婦人には、本剤投与中は授乳を避けさせること。〔ジヒドロコデインリン酸塩の類似化合物（コデイン）で、母乳への移行により、乳児でモルヒネ中毒（傾眠、哺乳困難、呼吸困難等）が生じたとの報告がある。なお、CYP2D6の活性が過剰であることが判明している患者（Ultra-rapid Metabolizer）では、母乳中のジヒドロモルヒネ濃度が高くなるおそれがある。〕<sup>1)、2)</sup>

## 7. 小児等への投与

12歳未満の小児には投与しないこと。〔呼吸抑制の感受性が高い。海外において、12歳未満の小児で死亡を含む重篤な呼吸抑制のリスクが高いとの報告がある。〕

## 8. 過量投与

### (1) 症状

呼吸抑制、意識不明、痙攣、錯乱、血圧低下、重篤な脱力感、重篤なめまい、嗜眠、心拍数の減少、神経過敏、不安、縮瞳、皮膚冷感等を起こすことがある。

### (2) 処置

過量投与時には以下の治療を行うことが望ましい。

1) 投与を中止し、気道確保、補助呼吸及び呼吸調節により適切な呼吸管理を行う。

2) 麻薬拮抗剤投与を行い、患者に退薬症候又は麻薬拮抗剤の副作用が発現しないよう慎重に投与する。なお、麻薬拮抗剤の作用持続時間はジヒドロコデインリン酸塩のそれより短いので、患者のモニタリングを行うか又は患者の反応に応じて初回投与後は注入速度を調節しながら持続静注する。

3) 必要に応じて補液、昇圧剤等の投与又は他の補助療法を行う。

## 9. その他の注意

遺伝的にCYP2D6の活性が過剰であることが判明している患者（Ultra-rapid Metabolizer）では、本剤に含まれるジヒドロコデインリン酸塩の活性代謝産物であるジヒドロモルヒネの血中濃度が上昇し、副作用が発現しやすくなるおそれがある。

## 【薬効薬理】

ジヒドロコデインリン酸塩は麻薬に属する中枢性鎮咳剤で、咳嗽中枢の反射性興奮を抑えることにより強い鎮咳作用をあらわす。その作用はコデインリン酸塩よりも強く、14倍（イヌ）、11倍（ネコ）であり、またヒトではコデインリン酸塩の1/2量で効果をあらわす<sup>3)</sup>。

エフェドリン塩酸塩は気管支拡張作用を示す。アセチルコリン及びヒスタミンによるモルモット摘出気管筋の収縮に対し、緩解作用を示す<sup>4)</sup>。

塩化アンモニウムは気道分泌促進作用<sup>5)</sup>、喀痰溶解作用<sup>6)</sup>を有し、痰の咯出を容易にする。


## 【有効成分に関する理化学的知見】

### 1. ジヒドロコデインリン酸塩

一般名：ジヒドロコデインリン酸塩 (Dihydrocodeine Phosphate)

化学名：(5R, 6S)-4, 5-Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-ol  
monophosphate

構造式：



分子式：C<sub>18</sub>H<sub>23</sub>NO<sub>3</sub>·H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>

分子量：399.38

性状：白色～帯黄白色の結晶性の粉末である。

水又は酢酸 (100) に溶けやすく、エタノール (95) に溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

1.0gを水10mLに溶かした液のpHは3.0～5.0である。


光によって変化する。

### 2. エフェドリン塩酸塩

一般名：エフェドリン塩酸塩 (Ephedrine Hydrochloride)

化学名：(1R, 2S)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol  
monohydrochloride

構造式：



分子式：C<sub>10</sub>H<sub>15</sub>NO·HCl

分子量：201.69

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末である。

水に溶けやすく、エタノール (95) にやや溶けやすく、酢酸 (100) に溶けにくく、アセトニトリル又は無水酢酸にほとんど溶けない。

1.0gを水20mLに溶かした液のpHは4.5～6.5である。

融点：218～222℃

### 3. 塩化アンモニウム

一般名：塩化アンモニウム (Ammonium Chloride)

分子式：NH<sub>4</sub>Cl

分子量：53.49

性状：無色の結晶又は白色の結晶性の粉末又は塊で、においはなく、味は塩辛く冷感がある。

水又はグリセリンに溶けやすく、エタノール (95) に溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

やや吸湿性である。

1.0gに水を加えて溶かし、20mLとした液のpHは4.6～6.0である。

## 【包装】

セキコデ配合シロップ

500mL

## 【主要文献】

- 1) Koren G. et al : Lancet 2006 ; 368 : 704
- 2) Madadi P. et al : Clinical pharmacology and therapeutics 2009 ; 85 ( 1 ) : 31-35
- 3) 加瀬佳年 : 臨床薬理学大系, 第六巻, 中山書店 1969 ; 291
- 4) Carminati, G. M. & Cattorini, M. : Arch.Int.Pharmacodyn., 1966 ; 163 : 186
- 5) Perry, W.F. & Boyd, E.M. : J.Pharmacol.Exp.Ther., 1941 ; 73 : 65
- 6) 河盛勇造, ほか : 診断と治療, 1966 ; 54 : 64

## 【文献請求先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。

日医工株式会社 お客様サポートセンター

〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21

☎ (0120) 517-215

Fax (076) 442-8948