

\*\*2007年6月改訂(第2版)  
\*1999年2月改訂  
\*\*貯法: 気密容器、室温保存  
(「取扱い上の注意」の項参照)  
\*\*使用期限: 容器、外箱に表示

健胃剤  
**ピクサン**® (BIASAN)

日本標準商品分類番号	
872339	
承認番号	愛薬第8270号
薬価収載	1957年10月
販売開始	1957年10月
再評価結果	1989年9月

◆禁忌(次の患者には投与しないこと)

ナトリウム摂取の制限を必要とする患者  
[ナトリウム貯留増加により、症状が増悪するおそれがある]

◆組成・性状

本品1g中、次の成分を含む

「日局」炭酸水素ナトリウム	855.0mg
「日局」ゲンチアナ末	85.5mg
「日局」ケイヒ末	27.9mg
「日局」ショウキョウ末	27.9mg
「日局」サンショウ末	1.2mg
「日局」ℓ-メントール	2.5mg

販売名	形状	色	味	におい	識別コード
ピクサン	散剤	淡黄かっ色	特異な塩味	特異なにおい	BIASAN

◆効能・効果

下記消化器症状の改善  
食欲不振、胃部不快感、胃もたれ、嘔気・嘔吐

◆用法・用量

通常成人1回1.1~1.5gを1日3回経口投与する。  
なお、年齢、症状により適宜増減する。

◆使用上の注意

(1) 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- 1) 浮腫のある患者 [症状が悪化するおそれがある]
- 2) 心不全の患者 [症状が悪化するおそれがある]
- 3) 高血圧症の患者 [症状が悪化するおそれがある]

(2) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、発赤、癢痒等

注1)このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

(3) 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

(4) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

\*(5) 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。  
[使用経験が少ない]

\*\*◆取扱い上の注意

- (1) 本剤は生薬を含むため、製造ロットにより多少色調等が異なることがあるが、品質には影響ない。
- (2) 本品の品質を保持するため、直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管し、開封後は湿気に注意して、フタを十分に閉める等、取扱いに注意すること。

◆包装

500g 1.1g×1,008包

\*\*◆文献請求先

本草製薬株式会社 学術部  
〒468-0046 名古屋市天白区古川町125番地