

外用局所収れん剤

亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」

Zinc Oxide(10%)Simple Oint. "Hoei"

貯 法：気密容器、室温保存
使用期限：4年
(容器に表示の使用期限内
に使用すること)

承認番号	16000AMZ04069
薬価収載	1985年8月
販売開始	1985年8月
再評価結果	1985年7月

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】

重度または広範囲の熱傷〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。〕

【組成・性状】

組成

販 売 名	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」
成分・含量 (1g中)	日局 酸化亜鉛 100mg
添 加 物	ダイズ油、ミツロウ、ジブチルヒドロキシトルエン

製剤の性状

本剤は白色～淡黄色の軟膏で、わずかに特異なにおいがある。
(基剤：単軟膏系)

【効能・効果】

1. 下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐
外傷、熱傷、凍傷、湿疹・皮膚炎、肛門そう痒症、白癬、
面皰う、癬、よう(癬)
2. その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿润面

【用法・用量】

通常、症状に応じ、1日1～数回、患部に塗擦又は貼布する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類	頻度	頻度不明
過 敏 症 ^{注)}		過敏症状
皮 膚 ^{注)}		発疹、刺激感等

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

使用部位

眼には使用しないこと。

【薬効薬理】

皮膚のたん白質と結合して被膜を形成し、収れん、消炎、保護並びに緩和な防腐作用を現す。また、浸出液の吸収及び分泌抑制により、創面又は潰瘍面などを乾燥させる。酸化亜鉛の作用に加え、皮膚軟化性(軟膏)及び皮膚密着性(軟膏・チンク油)を持ち痂皮を軟化し(軟膏)、炎症を消退させ(チンク油)、肉芽形成・表皮形成を促進させて皮膚疾患を改善する(軟膏・チンク油)。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：〔日局〕酸化亜鉛 (Zinc Oxide)

〔日局別名〕亜鉛華

分子式：ZnO

分子量：81.41

性 状：本品は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。

本品は水、エタノール(95)、酢酸(100)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。

本品は希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。

本品は空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

※【取扱い上の注意】

安定性試験：最終包装製品を用いた長期保存試験(室温保存、4年)の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」は通常の市場流通下において4年間安定であることが確認された¹⁾。

【包 装】

500g

※【主要文献】

- 1) 社内資料 (安定性試験資料)

※※【文献請求先】

ファイザー株式会社 製品情報センター
〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7
学術情報ダイヤル 0120-664-467
FAX 03-3379-3053

製造販売元

マイラン製薬株式会社

大阪市中央区本町2丁目6番8号

※※販売

ファイザー株式会社

東京都渋谷区代々木3-22-7

