

## 【使用上の注意】

### 1 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

**過敏症**(頻度不明) 発赤、発疹等の過敏症状<sup>(注)</sup>  
(注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

### 2 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にだけ投与する。[使用経験が少ない。]

### 3 小児等への投与

未熟児、新生児、乳児又は小児に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない。]

### 4 適用上の注意

- (1) 湿潤面への使用は避けること。
- (2) 眼又は眼の周囲には使用しないこと。

## 【取扱い上の注意】

〈貯法〉 気密容器に入れ、火気を避けて保存する。

**アルコール類 危険等級Ⅱ・水溶性**

**火気厳禁**

外用消炎・鎮痛・鎮痒剤

# カンファール精

Camphor Spirit



2008年3月改訂

日本標準商品分類番号 872645

貯法等 室温保存  
気密容器  
「使用上の注意」の項参照

承認番号 14600AMZ02359000

薬価基準取載

販売開始 1982年2月

再評価結果 1982年1月

## 【組成 性状】

本品100mL中 日局dL-カンフル10g、日局エタノール84mLを含有する。

本品は無色澄明の液でカンフルの香気を有する。

## 【効能 効果】

下記疾患における局所刺激、血行の改善、消炎、鎮痛  
鎮痒

筋肉痛 挫傷、打撲、捻挫、凍傷(第1度) 凍瘡  
皮膚掻痒症


## 【用法 用量】

通常 患部に適量を塗布あるいは塗擦する。



製造番号

使用期限



製造販売元

**山善製薬株式会社**

大阪市中央区道修町2丁目2番4号



(01)14987296326157

