

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会の IF 記載要領 2013 に準拠して作成

眼科用副腎皮質ホルモン製剤

デキサメタゾン眼軟膏 0.1%「ニットー」

Dexamethasone Ophthalmic Ointment 0.1%「NITTO」

デキサメタゾン眼軟膏

| | |
|--|---|
| 剤 形 | 眼軟膏剤 |
| 製 剤 の 規 制 区 分 | 該当しない |
| 規 格 ・ 含 量 | 1g 中 日局 デキサメタゾン 1mg 含有 |
| 一 般 名 | 和名:デキサメタゾン(JAN) 洋名:Dexamethasone(JAN) |
| 製 造 販 売 承 認 年 月 日 薬価基準収載・発売年月日 | 製造販売承認年月日:2018年12月21日(販売名変更) 薬価基準収載年月日:2019年6月14日(販売名変更) 発 売 年 月 日:1995年12月6日 |
| 開 発 ・ 製 造 販 売 (輸 入) ・ 提 携 ・ 販 売 会 社 名 | 製造販売元:日東メディック株式会社 |
| 医 薬 情 報 担 当 者 の 連 絡 先 | |
| 問 い 合 わ せ 窓 口 | 日東メディック株式会社 おくすり相談窓口 TEL:03-3523-0345 FAX:03-3523-0346 医療関係者向けホームページ http://www.nittomedic.co.jp/index.html |

本IFは2019年3月改訂の添付文書の記載に基づき作成した。

最新の添付文書情報は、医薬品医療機器総合機構ホームページ <http://www.pmda.go.jp/> にてご確認下さい。

IF利用の手引きの概要

－日本病院薬剤師会－

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和 63 年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第 2 小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、IF と略す）の位置付け並びに IF 記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10 年 9 月に日病薬学術第 3 小委員会において IF 記載要領の改訂が行われた。

更に 10 年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受け、平成 20 年 9 月に日病薬医薬情報委員会において新たな IF 記載要領 2008 が策定された。

IF 記載要領 2008 では、IF を紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF 等の電磁的データとして提供すること（e-IF）が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版の e-IF が提供されることとなった。

最新版の e-IF は、（独）医薬品医療機器総合機構のホームページ (<http://www.pmda.go.jp/>) から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-IF を掲載する医薬品医療機器総合機構ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせて e-IF の情報を検討する組織を設置して、個々の IF が添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008 年より年 4 回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、IF 記載要領の一部改訂を行い IF 記載要領 2013 として公表する運びとなった。

2. IFとは

IF は「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等は IF の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された IF は、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

[IF の様式]

- ①規格は A4 版、横書きとし、原則として 9 ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ② IF 記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF 利用の手引きの概要」の全文を記載するも

のとし、2頁にまとめる。

[I F の作成]

- ① I F は原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ② I F に記載する項目及び配列は日病薬が策定した I F 記載要領に準拠する。
- ③添付文書の内容を補完するとの I F の主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」（以下、「I F 記載要領 2013」と略す）により作成された I F は、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（P D F）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

[I F の発行]

- ① 「I F 記載要領 2013」は、平成 25 年 10 月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ②上記以外の医薬品については、「I F 記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合には I F が改訂される。

3. I F の利用にあたって

「I F 記載要領 2013」においては、P D F ファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報をを利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体の I F については、医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、I F の原点を踏まえ、医療現場に不足している情報や I F 作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR 等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、I F の利用性を高める必要がある。

また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、I F が改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、I F の使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器総合機構ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることがあり、その取扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

I F を薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。I F は日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、I F があくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013 年 4 月改訂)

目 次

| | | | |
|-----------------------------|----|---------------------------|----|
| I. 概要に関する項目 | 1 | VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目 | 11 |
| 1. 開発の経緯 | 1 | 1. 警告内容とその理由 | 11 |
| 2. 製品の治療学的・製剤学的特性 | 1 | 2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む) | 11 |
| II. 名称に関する項目 | 2 | 3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由 | 11 |
| 1. 販売名 | 2 | 4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由 | 11 |
| 2. 一般名 | 2 | 5. 慎重投与内容とその理由 | 11 |
| 3. 構造式又は示性式 | 2 | 6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法 | 11 |
| 4. 分子式及び分子量 | 2 | 7. 相互作用 | 11 |
| 5. 化学名(命名法) | 2 | 8. 副作用 | 11 |
| 6. 慣用名、別名、略号、記号番号 | 2 | 9. 高齢者への投与 | 12 |
| 7. CAS 登録番号 | 2 | 10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与 | 12 |
| III. 有効成分に関する項目 | 3 | 11. 小児等への投与 | 12 |
| 1. 物理化学的性質 | 3 | 12. 臨床検査結果に及ぼす影響 | 12 |
| 2. 有効成分の各種条件下における安定性 | 4 | 13. 過量投与 | 13 |
| 3. 有効成分の確認試験法 | 4 | 14. 適用上の注意 | 13 |
| 4. 有効成分の定量法 | 4 | 15. その他の注意 | 13 |
| IV. 製剤に関する項目 | 5 | 16. その他 | 13 |
| 1. 剤形 | 5 | | |
| 2. 製剤の組成 | 5 | | |
| 3. 用時溶解して使用する製剤の調製法 | 5 | | |
| 4. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意 | 5 | | |
| 5. 製剤の各種条件下における安定性 | 5 | | |
| 6. 溶解後の安定性 | 6 | | |
| 7. 他剤との配合変化(物理化学的变化) | 6 | | |
| 8. 溶出性 | 6 | | |
| 9. 生物学的試験法 | 6 | | |
| 10. 製剤中の有効成分の確認試験法 | 6 | | |
| 11. 製剤中の有効成分の定量法 | 6 | | |
| 12. 力価 | 6 | | |
| 13. 混入する可能性のある夾雑物 | 6 | | |
| 14. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報 | 6 | | |
| 15. 刺激性 | 6 | | |
| 16. その他 | 6 | | |
| V. 治療に関する項目 | 7 | | |
| 1. 効能又は効果 | 7 | | |
| 2. 用法及び用量 | 7 | | |
| 3. 臨床成績 | 7 | | |
| VI. 薬効薬理に関する項目 | 8 | | |
| 1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群 | 8 | | |
| 2. 薬理作用 | 8 | | |
| VII. 薬物動態に関する項目 | 9 | | |
| 1. 血中濃度の推移・測定法 | 9 | | |
| 2. 薬物速度論的パラメータ | 9 | | |
| 3. 吸収 | 9 | | |
| 4. 分布 | 9 | | |
| 5. 代謝 | 10 | | |
| 6. 排泄 | 10 | | |
| 7. トランスポーターに関する情報 | 10 | | |
| 8. 透析等による除去率 | 10 | | |
| | | XI. 文献 | 17 |
| | | 1. 引用文献 | 17 |
| | | 2. その他の参考文献 | 17 |
| | | XII. 参考資料 | 18 |
| | | 1. 主な外国での発売状況 | 18 |
| | | 2. 海外における臨床支援情報 | 18 |
| | | XIII. 備考 | 19 |
| | | 1. その他の関連資料 | 19 |

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

デキサメタゾンは、副作用の少ないコルチコイドとして開発された合成副腎皮質ホルモンであり、強い抗炎症作用を持つ。

D·E·X 0.1%眼軟膏 T は、デキサメタゾンを 0.1%含有する眼軟膏剤であり、後発医薬品として、1980 年 4 月に製造販売承認を取得し、1995 年 12 月に発売に至った。

なお、2018 年 12 月に『デキサメタゾン眼軟膏 0.1%「ニットー」』として販売名変更の承認を取得し、翌年 6 月に薬価収載された。

2. 製品の治療学的・製剤学的特性

- (1) デキサメタゾンは、副作用の少ない合成副腎皮質ホルモンであり、強い抗炎症作用、抗アレルギー作用を持つ。
- (2) 抗炎症作用の強さはヒドロコルチゾンの 25 倍、プレドニゾロンの 6 倍で、ベタメタゾンと同程度である。
- (3) 基剤のゲル化炭化水素は、温度により稠度がほとんど変化しない。
- (4) 副作用については以下の通りである。

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

重大な副作用として、緑内障、角膜ヘルペス、角膜真菌症、緑膿菌感染症、穿孔、後のう下白内障を起こすことがあると報告がある。(12 頁参照)

II. 名称に関する項目

II. 名称に関する項目

1. 販売名

(1) 和名

デキサメタゾン眼軟膏 0.1%「ニットー」

(2) 洋名

Dexamethasone Ophthalmic Ointment 0.1%「NITTO」

(3) 名称の由来

有効成分の一般名による

2. 一般名

(1) 和名(命名法)

デキサメタゾン(JAN)


(2) 洋名(命名法)

Dexamethasone(JAN、INN、USAN)

(3) ステム

プレドニゾン及びプレドニゾロン誘導体:-methasone

3. 構造式又は示性式



4. 分子式及び分子量

分子式:C₂₂H₂₉FO₅

分子量:392.46

5. 化学名(命名法)

9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione

6. 慣用名、別名、略号、記号番号

該当資料なし

7. CAS 登録番号

50-02-2

III. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

白色～微黄色の結晶又は結晶性の粉末である。結晶多形が認められる。

(2) 溶解性

メタノール、エタノール(95)、又はアセトンにやや溶けにくく、アセトニトリルに溶けにくく、水にほとんど溶けない。

(3) 吸湿性

該当資料なし

(4) 融点(分解点)、沸点、凝固点

融点: 約 245°C (分解)

(5) 酸塩基解離定数

該当資料なし


(6) 分配係数

該当資料なし

(7) その他の主な示性値

旋光度: $[\alpha]_D^{20}: +86 \sim +94^\circ$ (乾燥後、0.1g、メタノール、10mL、100mm)


紫外可視吸収スペクトル¹⁾:



本品 1.0mg/エタノール 10mL、この液 2mL に塩酸フェニルヒドラジン試液 10mL を加え、振り混ぜ、60°Cの水浴中で 20 分間加熱後放冷

対照: エタノール 2.0mL を用いて同様に操作して得た液

赤外吸収スペクトル¹⁾:



試料調製法: 臭化カリウム錠剤法

III. 有効成分に関する項目

2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

3. 有効成分の確認試験法

日局「デキサメタゾン」による

4. 有効成分の定量法

日局「デキサメタゾン」による

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 投与経路

点眼

(2) 剤形の区別、外観及び性状

剤形:眼軟膏剤

規格:1g 中 日局 デキサメタゾン 1mg 含有

性状:白色半透明な眼軟膏剤

(3) 製剤の物性

該当資料なし

(4) 識別コード

該当しない

(5) pH、浸透圧比、粘度、比重、安定な pH 域等

該当しない

(6) 無菌の有無

本剤は無菌製剤である。

2. 製剤の組成

(1) 有効成分(活性成分)の含量

1g 中 日局 デキサメタゾン 1mg 含有

(2) 添加物

流動パラフィン(基剤)、ゲル化炭化水素(基剤)

(3) 添付溶解液の組成及び容量

該当しない

3. 用時溶解して使用する製剤の調製法

該当しない

4. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意

該当しない

5. 製剤の各種条件下における安定性

デキサメタゾン眼軟膏 0.1%「ニットー」において、各種条件下における安定性は以下であった。²⁾

| 試験 | 保存条件 | 保存期間 | 保存形態 | 結果 |
|--------|----------|-------|--------|---------------------|
| 長期保存試験 | 室温(なりゆき) | 36 ヶ月 | 最終包装製品 | 変化なし※注 ¹ |

※注 1 試験項目:定量

IV. 製剤に関する項目

6. 溶解後の安定性

該当しない

7. 他剤との配合変化(物理化学的变化)

該当資料なし

8. 溶出性

該当しない

9. 生物学的試験法

該当しない

10. 製剤中の有効成分の確認試験法

- (1)テトラメチルアンモニウムヒドロキシド試液及び塩化トリフェニルトラゾリウム試液による呈色反応、紫外可視吸光度測定法
- (2)2,6-ジ-t-ブチルクレゾール試液及び水酸化ナトリウム試液による呈色反応

11. 製剤中の有効成分の定量法

液体クロマトグラフィー

12. 力価

該当しない

13. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

14. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報

該当しない

15. 刺激性

該当資料なし

16. その他

該当しない

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

外眼部および前眼部の炎症性疾患の対症療法
(眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、上強膜炎、前眼部ブドウ膜炎、術後炎症)

2. 用法及び用量

通常、1日1～3回、適量を塗布する。
なお、症状により適宜増減する。

3. 臨床成績

(1) 臨床データパッケージ

該当資料なし

(2) 臨床効果

該当資料なし

(3) 臨床薬理試験

該当資料なし

(4) 探索的試験

該当資料なし

(5) 検証的試験

1) 無作為化並行用量反応試験

該当資料なし

2) 比較試験

該当資料なし

3) 安全性試験

該当資料なし

4) 患者・病態別試験

該当資料なし

(6) 治療的使用

1) 使用成績調査・特定使用成績調査(特別調査)・製造販売後臨床試験(市販後臨床試験)

該当資料なし

2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要

該当しない

VII. 薬効薬理に関する項目

VII. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群

副腎皮質ホルモン

2. 薬理作用

(1) 作用部位・作用機序^{1), 3), 4)}

作用部位: 外眼部および前眼部

作用機序: デキサメタゾンは、副作用の少ないコルチコイドとして開発された合成皮質ホルモンであり、強い抗炎症作用をもつ。

副腎皮質ステロイドのうち糖質コルチコイドは、毛細管壁や細胞膜に対して直接作用してその透過性を減少させ、白血球の炎症部への集合を抑制するなどにより、局所の炎症を消退させる。また、抗体産生を抑制し、組織のヒスタミン合成能と、結合能を抑制して抗アレルギー作用を示すと考えられている。この作用は、ヒドロコルチゾン、コルチゾンに比べてデキサメタゾンの方が強力であるといわれる。

(2) 薬効を裏付ける試験成績

<生物学的同等性試験>⁵⁾

(1) 抗炎症作用

起炎剤として BSA を用いた誘発ブドウ膜炎モデル(ウサギ)において、抗炎症作用を本剤と標準製剤(眼軟膏、0.1%)の比較を行ったところ有意な差は認められず、生物学的同等性が確認された。

(2) 房水蛋白增加抑制作用

起炎剤として BSA を用いた誘発ブドウ膜炎モデル(ウサギ)において房水中蛋白增加に対する抑制作用について、本剤と標準製剤(眼軟膏、0.1%)の比較を行ったところ、両剤ともに房水中蛋白濃度を抑制した。また両薬剤の間には房水中蛋白增加抑制作用に有意な差は認められなかった。以上により、両製剤の生物学的同等性が確認された。

(3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 最高血中濃度到達時間

該当資料なし

(3) 臨床試験で確認された血中濃度

該当資料なし

(4) 中毒域

該当資料なし

(5) 食事・併用薬の影響

該当資料なし

(6) 母集団(ポピュレーション)解析により判明した薬物体内動態変動要因

該当資料なし

2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

(3) バイオアベイラビリティ

該当資料なし

(4) 消失速度定数

該当資料なし

(5) クリアランス

該当資料なし

(6) 分布容積

該当資料なし

(7) 血漿蛋白結合率

該当資料なし

3. 吸収

該当資料なし

4. 分布

(1) 血液一脳関門通過性

該当資料なし

(2) 血液一胎盤関門通過性

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

(3) 乳汁への移行性

該当資料なし

(4) 髄液への移行性

該当資料なし

(5) その他の組織への移行性

該当資料なし

5. 代謝

(1) 代謝部位及び代謝経路

該当資料なし

(2) 代謝に関与する酵素(CYP450等)の分子種

該当資料なし

(3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4) 代謝物の活性の有無及び比率

該当資料なし

(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ

該当資料なし

6. 排泄

(1) 排泄部位及び経路

該当資料なし

(2) 排泄率

該当資料なし

(3) 排泄速度

該当資料なし

7. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

8. 透析等による除去率

該当資料なし

VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

1. 警告内容とその理由

該当しない

2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【原則禁忌】(次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること)

1. 角膜上皮はく離又は角膜潰瘍のある患者

[これらの疾患が増悪するおそれがある。また、角膜穿孔を生ずるおそれがある。]

2. ウィルス性結膜・角膜疾患、結核性眼疾患、真菌性眼疾患又は化膿性眼疾患のある患者

[これらの疾患が増悪するおそれがある。また、角膜穿孔を生ずるおそれがある。]

3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由

該当しない

4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由

該当しない

5. 慎重投与内容とその理由

該当しない

6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法

該当しない

7. 相互作用

(1) 併用禁忌とその理由

該当しない

(2) 併用注意とその理由

該当しない

8. 副作用

(1) 副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

(2) 重大な副作用と初期症状

重大な副作用(頻度不明)

眼

- 1) 緑内障:連用により、数週後から眼内圧亢進、緑内障があらわれることがあるので、定期的に眼内圧検査を実施すること。
- 2) 角膜ヘルペス、角膜真菌症、緑膿菌感染症:角膜ヘルペス、角膜真菌症、緑膿菌感染症等を誘発することがある。このような場合には、適切な処置を行うこと。
- 3) 穿孔:角膜ヘルペス、角膜潰瘍又は外傷等に投与した場合には穿孔を生ずることがある。
- 4) 後のう下白内障:長期投与により、後のう下白内障があらわれることがある。

(3) その他の副作用

副作用が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

| 種類＼頻度 | 頻度不明 |
|---------------------------|----------------|
| 眼 | 刺激感 |
| 下垂体・副腎皮質系機能 (長期連用した場合) | 下垂体・副腎皮質系機能の抑制 |
| その他 | 創傷治癒の遅延 |

(4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

該当資料なし

(5) 基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度

該当資料なし

(6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法

「2.禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)」の項を参照すること。

9. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので注意すること。

10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には長期・頻回投与を避けること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]

11. 小児等への投与

特に2歳未満の場合には、慎重に投与すること。[乳児・小児に対する安全性は確立していない。]

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

該当資料なし

13. 過量投与

該当資料なし

14. 適用上の注意

投与経路:点眼用にのみ使用すること。

15. その他の注意

該当しない

16. その他

該当資料なし

IX. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験

(1) 薬効薬理試験(「VI. 薬効薬理に関する項目」参照)

(2) 副次的薬理試験

該当資料なし

(3) 安全性薬理試験

該当資料なし

(4) その他の薬理試験

該当資料なし

2. 毒性試験

(1) 単回投与毒性試験

該当資料なし

(2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

(3) 生殖発生毒性試験

該当資料なし

(4) その他の特殊毒性

該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

製 剤:該当しない

有効成分:該当しない

2. 有効期間又は使用期限

使用期限:外箱及びチューブに表示(3年)

3. 貯法・保存条件

室温保存

4. 薬剤取扱い上の注意点

(1) 薬局での取り扱い上の留意点について

該当しない

(2) 薬剤交付時の取扱いについて(患者等に留意すべき必須事項等)

「VIII. 14.適用上の注意」の項を参照すること。

くすりのしおり:有り

(3) 調剤時の留意点について

該当しない

5. 承認条件等

該当しない

6. 包装

デキサメタゾン眼軟膏 0.1%「ニットー」:3.5g×5本

3.5g×10本

7. 容器の材質

容 器:金属アルミニウム

キャップ:ポリエチレン

8. 同一成分・同効薬

同一成分薬:サンテゾーン 0.05%眼軟膏

同 効 薬:デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム、フルオロメトロン

9. 国際誕生年月日

不明

X. 管理的事項に関する項目

10. 製造販売承認年月日及び承認番号

製造販売承認年月日:2018年12月21日

承認番号:23000AMX00843000

(旧販売名)D・E・X0.1%眼軟膏 T 承認年月日:1980年4月22日

11. 薬価基準収載年月日

2019年6月14日

(旧販売名)D・E・X0.1%眼軟膏 T:2005年7月8日 経過措置期間終了:2020年3月31日

12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

該当しない

13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

14. 再審査期間

該当しない

15. 投薬期間制限医薬品に関する情報

本剤は、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)の一部を改正した平成20年厚生労働省告示第97号(平成20年3月19日付)の「投薬期間に上限が設けられている医薬品」には該当しない。

16. 各種コード

| 販売名 | HOT(9桁)番号 | 厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード | レセプト電算コード |
|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| デキサメタゾン眼軟膏 0.1%「ニットー」 | 102013701 | 1315700M2057 | 620201301 |

17. 保険給付上の注意

本剤は診療報酬における後発医薬品である。

XI. 文献

1. 引用文献

- 1) Goodman, L. S. et al.:The Pharmacological Basis of Therapeutics, 4th ed. 1491 macmillan ('75)
- 2) 日東メディック(株) 社内資料:安定性試験
- 3) Tonelli, G:Tox. Appl. Pharm., **8**, 250 ('66)
- 4) Havener, W. H:Ocular Pharmacology 4th ed. 347 ('78)
- 5) 日東メディック(株) 社内資料:生物学的同等性試験

2. その他の参考文献

該当資料なし

XII. 参考資料

XII. 参考資料

1. 主な外国での発売状況

該当しない

2. 海外における臨床支援情報

該当資料なし

XIII. 備考

1. その他の関連資料

該当資料なし

