

500mL

## 外皮用殺菌消毒剤

イチコール

(ニワトリ印消毒アルコール)

## 【成 分】

本品100mL中、メタノール変性アルコール50.2g  
日局イソプロパノール18.4gを含む。



商標

製造販売元

小堺製薬株式会社

\*東京都墨田区両国4-36-9

登録

外皮用  
殺菌消毒剤

イチコール

\*2012年4月 第9版

製造販売業者の住所変更に伴う改訂

2008年2月 第8版 改訂

【貯法】保存条件 火気を避けて保存する。

容 器 気密容器

【禁忌】(次の部位には使用しないこと。)

損傷皮膚及び粘膜〔刺激作用を有するので〕

## 【組成・性状】

本品100mL中、メタノール変性アルコール50.2g、  
日局イソプロパノール18.4gを含む。

添加物として青色2号を含有する。

本品は淡青色透明の液で、特異なにおいがある。  
本品は水、ジエチルエーテル、またはクロロホルムと混和する。

本品は燃えやすく、揮発性である。

【効能・効果】手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】そのまま塗擦、清浄用として用いる。

## 【使用上の注意】

## (1)副作用

(本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。)

種類	頻度	頻度不明
過敏症注	発疹等	
皮膚注	刺激症状	

注)このような症状があわれた場合には使用を中止すること。

## (2)臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギー試験の判断を妨害することがある。

**アルコール類、危険等級Ⅱ、水溶性  
火気厳禁 飲用不可**

キャップ:PP  
容 器:PE  
外装フィルム:PE

日本標準商品分類番号872615  
承認番号13213KUZ11227000  
薬価収載 1957.12  
販売開始 1957.12  
再評価結果 1983.4

## (3)適用上の注意

## 1)人体

- ア、外用にのみ使用すること。
- イ、眼に入らないよう注意すること。入った場合は水でよく洗い流すこと。
- ウ、広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- エ、同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

## 2)その他

本剤は血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。

## 【薬効薬理】

本剤は、使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞(炭疽菌、破傷風菌等)及び一部のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

## 【取扱い上の注意】

(1)金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐蝕を防止するために0.2~1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。

(2)合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カーテール等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。

使用期限:

製造番号:

&lt;調剤包装単位コード&gt;

&lt;販売包装単位コード&gt;

(01)04987371890149

(01)14987371141095