


SIZE : W229×H85^m/_m.

<p>TRADE MARK</p> <p>※ 2005年 5月改訂 (第2版) 1999年12月改訂</p>		<p>日本標準商品分類番号 8 7 2 6 6 1 承認番号 16000AMZ06575 薬価収載 1985年12月 販売開始 1985年12月</p>	<p>皮膚軟化剤</p> <p>日本薬局方</p> <h1 style="text-align: center;">氷 酢 酸</h1> <p style="text-align: center;">「タイセイ」</p> <h2 style="text-align: center;">Glacial Acetic Acid</h2> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">500g</p> <p>貯法：気密容器</p> <p style="text-align: center;">* 製造販売元 大成薬品工業株式会社 福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>第4類第2石油類・水溶性・危険等級Ⅲ [火気厳禁]</p> </div>	<p>【組成】 酢酸 (C₂H₄O₂) 99.0%以上を含む。</p> <p>【性状】 無色透明の揮発性液又は無色か白色の結晶塊で、刺激性の特異なおい及び酸味がある。</p> <p>【効能・効果/用法・用量】 洗浄液、収れん液の調剤に用いる。また、緩衝・矯味の目的で調剤に用いる。</p> <p>【使用上の注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・そのままの液を内服しないこと。 ・眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流し、直ちに眼科医の診断を受けること。 ・刺激作用があるので皮膚に付着した場合には、すぐに多量の水又はぬるま湯で洗い流すこと。 ・誤って摂取した場合、口、咽喉、腹部に激痛を与え粘膜に潰瘍を生じ、嘔吐、吐血、下痢を起こし、呼吸及び体温の異常、虚脱などの症状と共に、たん白尿、尿毒症を併発するおそれがある。激痛にはモルヒネ注射を行い、牛乳、卵白、水酸化マグネシウム又はカルシウムを与える。炭酸塩、重炭酸塩投与は避け、胃洗浄は行ってはならない。 <p>【薬効薬理】 本剤は皮膚、粘膜を刺激し、これを腐食、発泡、発赤させる作用がある。また揮発性油、脂肪、カンフル、樹脂、ゼラチンなど多くの有機化合物を溶解する能力が優れている。</p> <p>【取扱い上の注意】 ・本剤の蒸気は引火しやすいので注意すること (引火点約44℃)。</p>
			<p>使用期限</p>	<p>製造番号</p>
			<p>中栓: PE 外栓: PP 本体: ガラス</p>	<p>L160920 8081</p>

商品コードNo▶	3 1 6 0 3 - 8 0 8 1	選択機種▶	M・CD74・CD102
----------	---------------------------------------	-------	--------------

製版課 校正表 4-DS7062-280926-07	色 見 本 指 示	丸信カラー	類似品・リンク製品の有無	
お客様 営業 校正者 設計者		DIC等の色チップ	オフセット(ケース)	
		現物見本	オフセット(ラベル)	
		(32) (21)	インクジェット紙 オンデマンド出力紙 その他出力紙	
月 日 月 日		H23.04 CEXX	改版前にあわせる	シール
		その他別指示	その他[]	

改版前と
色数・色共に
変更無し