

精神神経安定剤

レボトミン[®]筋注 25mg

レボメプロマジン塩酸塩注

LEVOTOMIN[®] INTRAMUSCULAR INJECTION 25mg

劇薬
処方箋医薬品^注

貯法：遮光保存，室温保存

使用期限：外箱及びラベルに表示の使用期限内に使用すること

注 意：「取扱上の注意」の項参照

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

承認番号	21400AMZ00174
薬価収載	2002年7月
販売開始	1963年1月
再評価結果	1973年11月

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

- (1) 昏睡状態，循環虚脱状態の患者[これらの状態を悪化させるおそれがある.]
- (2) パルビツール酸誘導体・麻酔剤等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患者[中枢神経抑制剤の作用を延長し増強させる.]
- ** (3) アドレナリンを投与中の患者(アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く)(「相互作用」の項参照)
- (4) フェノチアジン系化合物及びその類似化合物に対し過敏症の患者

【原則禁忌】(次の患者には投与しないことを原則とするが，特に必要とする場合には慎重に投与すること)
皮質下部の脳障害(脳炎，脳腫瘍，頭部外傷後遺症等)の疑いがある患者[高熱反応があらわれるおそれがある]ので，このような場合には全身を氷で冷やすか，又は解熱剤を投与するなど適切な処置を行うこと.]

【組成・性状】

有効成分 〔1管(1mL)中〕	レボメプロマジン塩酸塩 27.78mg (レボメプロマジンとして25mgに相当)
添加物 〔1管(1mL)中〕	塩化ナトリウム 5mg ピロ亜硫酸ナトリウム 0.5mg 乾燥亜硫酸ナトリウム 0.6mg アスコルビン酸 1mg 塩酸 適量 水酸化ナトリウム 適量
性状	無色澄明の液
pH	4.0~6.0
浸透圧比	0.7~0.9(生理食塩液に対する比)

【効能・効果】

統合失調症，躁病，うつ病における不安・緊張

【用法・用量】

レボメプロマジンとして，通常，成人1回25mgを筋肉内注射する。

なお，年齢・症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- (1) 肝障害又は血液障害のある患者(肝障害又は血液障害を悪化させるおそれがある.)
- (2) 褐色細胞腫，動脈硬化症あるいは心疾患の疑いのある患者[血圧の急速な変動がみられることがある.]
- (3) 重症喘息，肺気腫，呼吸器感染症等の患者[呼吸抑制があらわれることがある.]
- (4) てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある

患者[痙攣閾値を低下させることがある.]

- (5) 幼児，小児(「小児等への投与」の項参照)
- (6) 高齢者(「高齢者への投与」の項参照)
- (7) 高温環境にある者[体温調節中枢を抑制するため，環境温度に影響されるおそれがある.]
- (8) 脱水・栄養不良状態等を伴う身体的疲弊のある患者[Syndrome malin(悪性症候群)が起こりやすい.]

2. 重要な基本的注意

- (1) 眠気，注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので，本剤投与中の患者には**自動車の運転等危険を伴う機械の操作**に従事させないように注意すること。
- (2) 制吐作用を有するため，他の薬剤に基づく中毒，腸閉塞，脳腫瘍等による嘔吐症状を不顕性化することがあるので注意すること。
- (3) 抗精神病薬において，肺塞栓症，静脈血栓症等の血栓塞栓症が報告されているので，不動状態，長期臥床，肥満，脱水状態等の危険因子を有する患者に投与する場合には注意すること。

3. 相互作用

(1) 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
** アドレナリン(アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く)(ボスミン)	アドレナリンの作用を逆転させ，重篤な血圧降下を起こすことがある。	アドレナリンはアドレナリン作動性 α ， β -受容体の刺激剤であり，本剤の α -受容体遮断作用により， β -受容体刺激作用が優位となり，血圧降下作用が増強される。

(2) 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
中枢神経抑制剤(パルビツール酸誘導体・麻酔剤等)	睡眠(催眠)・精神機能抑制の増強，麻酔効果の増強・延長，血圧降下等を起こすことがあるので，減量するなど慎重に投与すること。	相互に中枢神経抑制作用を増強させることがある。
降圧剤	起立性低血圧等を起こすことがあるので，減量するなど慎重に投与すること。	相互に降圧作用を増強させることがある。
アトロピン様作用を有する薬剤	口渇，眼圧上昇，排尿障害，頻脈，腸管麻痺等を起こすことがあるので，減量するなど慎重に投与すること。	相互にアトロピン様作用を増強させることがある。
アルコール(飲酒)	眠気，精神運動機能低下等を起こすことがある。	相互に中枢神経抑制作用を増強させることがある。

ドンペリドン メトクロプラ ミド	内分泌機能調節異常 又は錐体外路症状が 発現するおそれがある。	ともに中枢ドパミ ン受容体遮断作用 を有する。
リチウム	心電図変化、重症の 錐体外路症状、持続 性のジスキネジア、 突発性のSyndrome malin (悪性症候群)、 非可逆性の脳障害を 起こすおそれがある ので、観察を十分に 行い、このような症 状があらわれた場合 には投与を中止する こと。	機序は不明である が、併用による抗ド パミン作用の増強等 が考えられている。
ドパミン作動薬 (レボドパ製剤、 プロモクリプチ ンメシル酸塩)	相互に作用を減弱さ せるおそれがある。	ドパミン作動性神 経において、作用 が拮抗することに よる。

(3) 接触注意 (接触しないように注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
有機燐殺虫剤	縮瞳、徐脈等の症状 があらわれることが ある。	本剤は有機燐殺虫 剤の抗コリンエス テラーゼ作用を増 強し毒性を強める ことがある。

4. 副作用

(1) 重大な副作用

- **1) Syndrome malin (悪性症候群) (頻度不明) :** 無動緘黙、強度の筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現し、それに引き続き発熱がみられる場合は、投与を中止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な処置を行うこと。本症発症時には、白血球の増加や血清CK (CPK) の上昇がみられることが多く、また、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。なお、高熱が持続し、意識障害、呼吸困難、循環虚脱、脱水症状、急性腎障害へと移行し、死亡した例が報告されている。
- 2) **突然死 (頻度不明) :** 血圧降下、心電図異常 (QT間隔の延長、T波の平低化や逆転、二峰性T波ないしU波の出現等) につづく突然死が報告されているので、とくにQT部分に変化があれば投与を中止すること。また、フェノチアジン系化合物投与中の心電図異常は、大量投与されていた例に多いとの報告がある。
- 3) **再生不良性貧血、無顆粒球症、白血球減少 (いずれも頻度不明) :** 再生不良性貧血、無顆粒球症、白血球減少があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、減量又は投与を中止すること。
- 4) **麻痺性イレウス (0.1%未満) :** 腸管麻痺 (食欲不振、悪心・嘔吐、著しい便秘、腹部の膨満あるいは弛緩及び腸内容物のうっ滞等) を来し、麻痺性イレウスに移行することがあるので、腸管麻痺があらわれた場合には投与を中止すること。なお、この悪心・嘔吐は、本剤の制吐作用により不顕性化することもあるので注意すること。
- 5) **遅発性ジスキネジア (0.1~5%未満)、遅発性ジストニア (頻度不明) :** 長期投与により、遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア等の不随意運動があらわれ、投与中止後も持続することがある。
- 6) **抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) (0.1%未満) :** 低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、痙攣、意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) があらわれることがあるので¹⁾、このような場合には投与を中止し、水分摂取の制限等適切な処置を行うこと。

- 7) **眼障害 (頻度不明) :** 長期又は大量投与により、角膜・水晶体の混濁、網膜・角膜の色素沈着があらわれることがある。
- 8) **SLE様症状 (頻度不明) :** SLE様症状があらわれることがある。
- 9) **横紋筋融解症 (頻度不明) :** 横紋筋融解症があらわれることがあるので、CK (CPK) 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等に注意すること。
- 10) **肺塞栓症、深部静脈血栓症 (いずれも頻度不明) :** 抗精神病薬において、肺塞栓症、静脈血栓症等の血栓塞栓症が報告されているので、観察を十分に行い、息切れ、胸痛、四肢の疼痛、浮腫等が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

種類	頻度	5%以上又は 頻度不明	0.1~5%未満	0.1%未満
循環器 ^{注1)}		血圧降下、頻脈、不整脈、心疾患悪化		
血液 ^{注2)}		白血球減少症、顆粒球減少症、血小板減少性紫斑病		
消化器		食欲亢進、食欲不振、舌苔、悪心・嘔吐、下痢、便秘		
肝臓 ^{注2)}				肝障害
錐体外路症状		パーキンソン症候群 (手指振戦、筋強剛、流涎等)、ジスキネジア (口周部、四肢等の不随意運動等)、ジストニア (眼球上転、眼瞼痙攣、舌突出、痙攣性斜頸、頸後屈、体幹側屈、後弓反張等)、アカシジア (静坐不能)		
眼		縮瞳、眼内圧亢進、視覚障害		
内分泌			体重増加、女性化乳房、乳汁分泌、射精不能、月経異常、糖尿	
精神神経系		錯乱、不眠、眩暈、頭痛、不安、興奮、易刺激、痙攣		
過敏症 ^{注3)}		過敏症状、光線過敏症		
その他		口渇、鼻閉、倦怠感、発熱、浮腫、尿閉、無尿、頻尿、尿失禁、皮膚の色素沈着		

注1) 観察を十分に行い慎重に投与すること。

注2) 観察を十分に行い、異常が認められた場合には、減量又は投与を中止すること。

注3) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

5. 高齢者への投与

高齢者では起立性低血圧、錐体外路症状、脱力感、運動失調、排泄障害等が起こりやすいので、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。〔動物実験で、胎児死亡、流産、早産等の胎児毒性が報告されている。また、妊娠後期に抗精神病薬が投与されている場合、新生児に哺乳障害、傾眠、呼吸障害、振戦、筋緊張低下、易刺激性等の離脱症状や錐体外路症状があらわれたとの報告がある。〕

(2) 授乳中の婦人には投与しないことが望ましい。〔母乳中へ移行することが報告されている。〕

7. 小児等への投与

幼児、小児には慎重に投与すること。〔幼児、小児では錐体外路症状、特にジスキネジアが起りやすい。〕

8. 過量投与

症状：

傾眠から昏睡までの中枢神経系の抑制、血圧低下と錐体外路症状である。その他、激越と情緒不安、痙攣、口渴、腸閉塞、心電図変化及び不整脈等があらわれる可能性がある。

処置：

本質的には対症療法かつ補助療法である。

9. 適用上の注意

(1) 投与経路：

経口投与が困難な場合や緊急の場合、また、経口投与が不十分と考えられる場合にのみ使用すること。なお、経口投与が可能で効果が十分と判断された場合には、速やかに経口投与にきりかえること。

(2) 筋肉内注射時：

- 筋肉内投与により局所の発赤、発熱、腫脹、壊死、化膿等がみられることがある。
- 筋肉内注射にあたっては、組織・神経などへの影響を避けるため、下記の点に注意すること。
 - ①筋肉内投与はやむを得ない場合にのみ必要最小限に行うこと。なお、特に同一部位への反復注射は行わないこと。また低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児には特に注意すること。
 - ②神経走行部位を避けるよう注意すること。
 - ③注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり、血液の逆流をみた場合は、直ちに針を抜き、部位をかえて注射すること。

(3) 投与速度：

起立性低血圧があらわれることがあるので、注射方法について十分注意し、その注射速度はできるだけ遅くすること。

(4) アンブルカット時：

本剤の容器はワンポイントカットアンブルを使用しているため、丸印を上にして下方向へ折ること。なお、アンブルカット時の異物混入を避けるためエタノール綿等で清拭しカットすること。

10. その他の注意

- (1) 本剤による治療中、原因不明の突然死が報告されている。
- (2) 外国で実施された認知症に関連した精神病症状(承認外効能・効果)を有する高齢患者を対象とした17の臨床試験において、非定型抗精神病薬投与群はプラセボ投与群と比較して死亡率が1.6～1.7倍高かったとの報告がある。また、外国での疫学調査において、定型抗精神病薬も非定型抗精神病薬と同様に死亡率の上昇に関与するとの報告がある。

【薬効薬理】

動物での作用³⁾

- (1) アポモルフィンによって生じる行動変化に対して拮抗作用を示す。また、自発運動抑制作用、条件回避反応抑制作用、麻酔増強・鎮痛増強作用を示す。

試験項目	動物	効力比 (クロルプロマジンを1とする)
抗アポモルフィン作用(嘔吐)	イヌ	0.9
条件回避反応抑制作用	ラット	2
自発運動抑制作用	マウス	2.5

麻酔増強、鎮痛増強作用	マウス	4
-------------	-----	---

(2) カタレプシー惹起作用

ラット、イヌ、サルにおけるカタレプシー惹起作用はクロルプロマジンとほぼ同等である。

〈作用機序〉

レボメプロマジンの作用機序は、まだ完全に明らかにされていないが、中枢神経系におけるドパミン作動性、ノルアドレナリン作動性あるいはセロトニン作動性神経等に対する抑制作用によると考えられている。

【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：レボメプロマジン塩酸塩, Levomepromazine Hydrochloride (JAN)

化学名：(R)-N, N-dimethyl-2-[(2-methoxyphenothiazin-10-yl) methyl]propylamine monohydrochloride

分子式：C₁₉H₂₄N₂OS · HCl

分子量：364.93

構造式：



性状：白色の結晶性の粉末で、においはない。

水又はクロロホルムに極めて溶けやすく、酢酸(100)又はエタノール(95)に溶けやすく、アセトンにやや溶けやすく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

光によって徐々に着色する。

融点：約146℃

【取扱い上の注意】

1. 本剤を多量ないし恒常的に取り扱う際には、ときに蕁麻疹様の過敏症状を呈することがあるので、この場合はゴム手袋を使用するか、しばしば手や顔を洗浄するなど露出皮膚面に対する一般的保護手段を講じること。
2. 光により分解変色する。着色の認められるものは使用しないこと。

【包装】

レボトミン筋注25mg：1 mL×50管


【主要文献及び文献請求先】


1. 主要文献

- 1) 河田泰原 他：新潟市民病院医誌 1990；11(1)：151-155
- 2) Bagli, M. et al.：Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. 1995；33(12)：646-652
- 3) Courvosier, S. et al.：Psychotropic Drugs 1957；373-391

* 2. 文献請求先

田辺三菱製薬株式会社 くすり相談センター
〒541-8505 大阪市中央区道修町3-2-10
電話 0120-753-280

*  製造販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区道修町3-2-10

*  プロモーション提携
吉富薬品株式会社
大阪市中央区道修町3-2-10