



承認番号	21900AMX00669000
薬価収載	2007年6月
販売開始	1965年3月
再評価結果	1977年10月

水虫治療剤

ハイアラージン[®]軟膏2%

Hi-Alarzin[®] Ointment 2%
(トルナフタート製剤)

【貯法】
室温保存
【使用期限】
ケース等に表示（製造後5年）

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

販売名	ハイアラージン軟膏2%
成分・含量 (1g中)	日局 トルナフタート 20mg
添加物	マクロゴール400、マクロゴール4000、マクロ ゴール20000、ジブチルヒドロキシトルエン
剤形・性状	白色の軟膏

【効能・効果】

汗疱状白癬、頑癬、小水疱性斑状白癬、癬風

【用法・用量】

通常、1日2～3回、適量を患部に塗布又は塗擦する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

患部が化膿しているなど湿潤、びらんが著しい場合には、あらかじめ適切な処置を行った後使用すること。

2. 副作用

	0.1%未満	頻度不明
過敏症 [※]		過敏症状
皮膚 [※]	局所刺激、発赤、皮膚炎等	

注) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

3. 適用上の注意

投与時：

- 長期間使用しても症状の改善が認められない場合には、改めて診断し適切な治療を行うことが望ましい。
- 広範囲の病巣に使用した場合は、副作用があらわれやすいので注意して使用すること。
- 眼科用に使用しないこと。


【薬効薬理】

各種真菌類に対するトルナフタートの抗菌力¹⁾

対象菌	MIC (μg/mL)
<i>Trichophyton rubrum</i>	0.0125
<i>T. interdigitale</i>	0.025
<i>T. asteroides</i>	0.025
<i>Microsporum gypseum</i>	0.0125
<i>Microsporum japonicum</i>	0.005
<i>Epidermophyton inguinale</i>	0.005
<i>Candida albicans</i>	>500
<i>Cryptococcus neoformans</i>	>500
<i>Aspergillus fumigatus</i>	>500
<i>Aspergillus niger</i>	0.0125

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：トルナフタート (Tolnaftate)
化学名：O-Naphthalen-2-yl N-methyl-N-(3-methylphenyl)thiocarbamate
分子式：C₁₉H₁₇NOS
分子量：307.41
構造式：



性状：トルナフタートは白色の粉末で、においはない。クロロホルムに溶けやすく、ジエチルエーテルにやや溶けにくく、メタノール又はエタノール（95）に溶けにくく、水にほとんど溶けない。

【包装】

ハイアラージン軟膏2%
チューブ：10g×25
ポリ容器：500g

【主要文献】

1)日本曹達株式会社 社内資料（薬効薬理）

****【文献請求先】**

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。
日本ジェネリック株式会社 お客様相談室
〒100-6739 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
TEL 0120-893-170 FAX 0120-893-172

®登録商標

**販売元

JG 日本ジェネリック株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

製造販売元

chosei 長生堂製薬株式会社
徳島市市府町府中92番地