

承認番号	21800AMX10148000
薬価収載	2006年1月
販売開始	1965年3月
再評価結果	1977年10月

水虫治療剤

日本薬局方 トルナフタート液

ハイアラージン®外用液 2%

Hi-Alarzin® Solution 2%

【貯法】
室温保存、気密容器
【使用期限】
外箱及びラベルに表示の
使用期限内に使用すること(製造後5年)
【注意】
【取扱い上の注意】の項参照

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

販売名	ハイアラージン外用液 2%
成分・含量 (1g中)	日局 トルナフタート 20mg
添加物	無水エタノール、メチルエチルケトン、マクロ ゴール400、サリチル酸メチル、ジブチルヒドロ キシトルエン
剤形・性状	無色透明の液で特異な芳香がある。

【効能・効果】

汗疱状白癬、頑癬、小水疱性斑状白癬、癬風

【用法・用量】

通常、1日2~3回、適量を患部に塗布又は塗擦する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

患部が化膿しているなど湿潤、びらんが著しい場合には、
あらかじめ適切な処置を行った後使用すること。

2. 副作用

	0.1%未満	頻度不明
過敏症 ^{注)}		過敏症状
皮膚 ^{注)}	局所刺激、発赤、皮 膚炎等	

注) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

3. 適用上の注意

投与時:

- (1) 長期間使用しても症状の改善が認められない場合には、
改めて診断し適切な治療を行うことが望ましい。
- (2) 広範囲の病巣に使用した場合は、副作用があらわれやす
いので注意して使用すること。
- (3) 眼科用に使用しないこと。


【薬効薬理】

各種真菌類に対するトルナフタートの抗菌力¹⁾

対象菌	MIC (μg/mL)
<i>Trichophyton rubrum</i>	0.0125
<i>T. interdigitale</i>	0.025
<i>T. asteroides</i>	0.025
<i>Microsporum gypseum</i>	0.0125
<i>Microsporum japonicum</i>	0.005
<i>Epidermophyton inguinale</i>	0.005
<i>Candida albicans</i>	>500
<i>Cryptococcus neoformans</i>	>500
<i>Aspergillus fumigatus</i>	>500
<i>Aspergillus niger</i>	0.0125

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名: トルナフタート (Tolnaftate)
化学名: *O*-Naphthalen-2-yl *N*-methyl-*N*-
(3-methylphenyl)thiocarbamate
分子式: C₁₉H₁₇NOS
分子量: 307.41
構造式:



性状: トルナフタートは白色の粉末で、においはない。ク
ロロホルムに溶けやすく、ジエチルエーテルにやや
溶けにくく、メタノール又はエタノール(95)に溶
けにくく、水にほとんど溶けない。

【取扱い上の注意】

- (1) 火気厳禁
- (2) 直射日光を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管するこ
と。
- (3) 合成樹脂を軟化したり、塗料を溶かすことがあるので注意
すること。

【包装】

ハイアラージン外用液 2%
ポリ瓶: 30mL×25
ガラス瓶: 250mL

【主要文献】

1) 日本曹達株式会社 社内資料(薬効薬理)

****【文献請求先】**

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。
日本ジェネリック株式会社 お客さま相談室
〒100-6739 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
TEL 0120-893-170 FAX 0120-893-172

®登録商標

**販売元
JG 日本ジェネリック株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

製造販売元
chosei 長生堂製薬株式会社
徳島市市府町府中92番地