

ポリエチレンボトル

処方箋医薬品(注意-医師等の  
処方箋により使用すること)

貯法: 室温保存  
使用期限: 3年(外箱に記載)

# 日本薬局方 注射用水

J・P Water for Injection

許可番号	06A1X00002
薬価基準	収載
販売開始	1998年2月

## \*【組成・性状】

本剤は、ポリエチレン容器1管中に、日本薬局方注射用水20mLを充填した無色透明の液で、においはない。

## 【効能・効果】

注射用医薬品の溶解・希釈剤

## 【用法・用量】

適量を取り、注射用医薬品の溶解、希釈に用いる。

## 【使用上の注意】

### 適用上の注意

- (1) 調製時: 注射剤の溶解・希釈液として使用する場合は、注射用水が適切であることを確認すること。
- (2) 投与前:
  - 1) 投与に際しては、感染に対する配慮をすること(患者の皮膚や器具消毒)。
  - 2) 開封後直ちに使用し、残液は決して使用しないこと。
- (3) 投与时: 溶解・希釈した注射剤の用法・用量及び使用上の注意に留意して投与すること。

## 【取扱い上の注意】

### 安定性試験<sup>1)</sup>

注射用水は、最終包装製品を用いた長期保存試験(室温保存、3年)の結果、外観及び純度試験等は規格の範囲内であり、室温保存における3年間の安定性が確認された。

## \*\*【包装】

注射用水 20mL

ツイストルアーポリエチレンボトル: 50管  
ワイドオープンポリエチレンボトル: 50管

## 【主要文献】

- 1) 日新製薬株式会社 社内資料: 安定性に関する資料

## 【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

- \* 日新製薬株式会社 安全管理部  
〒994-0069 山形県天童市清池東二丁目3番1号  
TEL 023-655-2131 FAX 023-655-3419  
E-mail: d-info@yg-nissin.co.jp

\*\*

## ポリエチレン容器の使用方法


ツイストルアー  
ポリエチレンボトル



ワイドオープン  
ポリエチレンボトル




- ①ポリエチレン容器の結合部分をねじって切り離して下さい。



- ②頭部をねじ切って下さい。

### [ツイストルアーポリエチレンボトル]

注射筒をセットし、直接吸引することもできます。  
吸引しにくい場合は、容器を押して下さい。



製造販売元

 日新製薬株式会社

山形県天童市清池東二丁目3番1号