

貯法 ：気密容器で室温保存，遮光保存
使用期限 ：外箱等に表示の使用期限内に使用すること

承認番号	22000AMX00231000
薬価収載	2008年6月
販売開始	2008年6月

アズレン含嗽剤

アズレン含嗽用顆粒0.4%「日医工」

Sodium Azulene Sulfonate

アズレンスルホン酸ナトリウム顆粒

【組成・性状】

1. 組成

アズレン含嗽用顆粒0.4%「日医工」は1g中アズレンスルホン酸ナトリウム4mgを含有する。

添加物として、D-マンニトール、炭酸水素ナトリウム、ポビドン、ℓ-メントールを含有する。

2. 製剤の性状

本品は青色の顆粒剤である。

【効能・効果】

咽頭炎，扁桃炎，口内炎，急性歯肉炎，舌炎，口腔創傷

【用法・用量】

アズレンスルホン酸ナトリウムとして，1回4～6mgを適量（約100mL）の水又は微温湯に溶解し，1日数回含嗽する。

なお，年齢，症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
口 腔	口中のあれ，口腔・咽頭の刺激感

2. 適用上の注意

抜歯後等の口腔創傷の場合，血餅の形成が阻害されると思われる時期には，激しい洗口を避けさせること。

【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：アズレンスルホン酸ナトリウム

(Sodium Azulene Sulfonate)

化学名：Sodium 1,4-dimethyl-7-isopropylazulene-3-sulfonate semihydrate 又は monohydrate

分子式：C₁₅H₁₇NaO₃S·1/2H₂O (309.36) 又は

(分子量) C₁₅H₁₇NaO₃S·H₂O (318.36)



性状：暗青色の結晶又は結晶性の粉末で，におい及び味はない。
メタノールにやや溶けやすく，水又は酢酸(100)にやや溶けにくく，エタノール(95)に溶けにくく，無水酢酸，ジエチルエーテル又はヘキサンにほとんど溶けない。
水溶液(1→200)のpHは6.0～9.0である。
光により変化する。

【取扱い上の注意】

安定性試験

本品につき加速試験(40℃，相対湿度75%，6ヵ月)を行った結果，アズレン含嗽用顆粒0.4%「日医工」は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。¹⁾

【包 装】

アズレン含嗽用顆粒0.4%「日医工」

1.5g×1,200包

【主要文献】

1) 日医工株式会社 社内資料：安定性試験

【文献請求先】

主要文献欄に記載の文献・社内資料は下記にご請求下さい。

日医工株式会社 お客様サポートセンター

〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21

☎ (0120)517-215

Fax (076)442-8948