

**2012年6月改訂(第5版)

*2009年6月改訂

貯 法

保存条件 室温保存

容 器 気密容器

使用期限 ラベルに記載

日本標準商品分類番号
872661

承認番号 16100AMZ00074000

**薬価収載 2012年6月

販売開始 2006年1月

皮ふ軟化剤

日本薬局方

氷 酢 酸

**〈氷酢酸「NikP」〉

GLACIAL ACETIC ACID

500mL

【組成・性状】

1. 組 成

1mL中 日本薬局方 氷酢酸 1mL含有。
(酢酸(C₂H₄O₂) 99.0%以上を含有)

2. 製剤の性状

本品は無色澄明の揮発性の液又は無色若しくは白色の結晶塊で、刺激性の特異なおいがある。

本品は水、エタノール(95)又はジエチルエーテルと混和する。

沸点：約118℃

比重 d_{20}^{20} ：約1.049

凝固点：14.5℃以上

【効能・効果】 【用法・用量】

洗浄液、収れん液の調剤に用いる。

また、緩衝・矯味の目的で調剤に用いる。

【使用上の注意】

適用上の注意

- (1)そのままの液を内服しないこと。
- (2)眼に入らないよう注意すること。万一眼に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科専門医の処置を受けること。
- (3)刺激作用があるので皮膚に付着した場合には、すぐに多量の水又はぬるま湯で洗い流すこと。

製造番号

使用期限



製造販売元

日医工株式会社

富山市総曲輪1丁目6番21

(4)誤って摂取した場合、口、咽喉、腹部に激痛を与え粘膜に潰瘍を生じ、嘔吐、吐血、下痢を起し、呼吸及び体温の異常、虚脱等の症状とともに、たん白尿、尿毒症を併発する。激痛にはモルヒネ注射を行い、牛乳、卵白、水酸化マグネシウム又はカルシウムを与える。炭酸塩、炭酸水素塩の投与は避け、胃洗浄は行ってはならない。慢性中毒症状としては顔面蒼白、悪液質、歯腐食、気管支炎、胃障害等が起り、製造現場において常時蒸気に接すると結膜炎、眼瞼炎を伴う。

【包 装】500mL

【問い合わせ先】

日医工株式会社 お客様サポートセンター

〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21

☎(0120)517-215 Fax(076)442-8948

〈調剤(包装単位)用〉



〈販売包装単位用〉



GS1

第2石油類危険等級Ⅲ水溶性
火 気 厳 禁



キャップ

ガラス：ボトル