



口腔用剤

日本薬局方

複方ヨード・グリセリン

COMPOUND IODINE
GLYCERIN

複方ヨード・グリセリン「ヤクハン」

月 日 開封

月 日 期限

使用期限

製造番号

500mL



キャップ:PP
ガラス:ポトル

※2016年1月改訂(第4版)
2009年3月改訂

貯法 遮光した気密容器
使用期限 ラベルに記載

【禁忌】(次の患者には使用しないこと)
本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

1.組成

本品100mL中、下記の成分を含有する。

| | | |
|------|-----------|-------|
| 有効成分 | 日局ヨウ素 | 1.2g |
| | 日局液状フェノール | 0.5mL |
| | 日局グリセリン | 90mL |
| 添加物 | ヨウ化カリウム | 2.4g |
| | ハッカ水 | 4.5mL |

2.製剤の性状

本品は赤褐色粘稠性の液で、特異なおいがある。

【効能・効果】【用法・用量】

| 効能・効果 | 用法・用量 |
|-------------|---------------------|
| 咽喉炎、喉頭炎、扁桃炎 | 症状に応じ、適宜適量を患部に塗布する。 |

【使用上の注意】

1.相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

| | |
|-----|-------------------|
| 薬剤名 | 機序・危険因子 |
| 水銀剤 | ヨウ化水銀が発生するおそれがある。 |

2.副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)重大な副作用

他のヨード製剤において、**アナフィラキシー様症状**(呼吸困難、潮紅、蕁麻疹等)(頻度不明)があらわれることがあるとの報告があるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

(2)その他の副作用

| 種類\頻度 | 頻度不明 |
|-------------------|---|
| 過敏症 ^{※1} | 発疹、口腔粘膜び爛等 |
| 甲状腺 | 血中甲状腺ホルモン値(T ₃ 、T ₄ 等)の上昇 あるいは低下などの甲状腺機能異常 |

注)このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

3.妊婦、産婦、授乳婦等への投与

他のヨード製剤において、先天性甲状腺機能低下症の乳児の報告があるので妊娠中及び授乳中の婦人には、長期にわたる広範囲の使用はさけること。

※【文献請求先】

日医工株式会社 お客様サポートセンター
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21 ☎(0120)517-215 Fax(076)442-8948

| | |
|------------|------------------|
| 日本標準商品分類番号 | 872399 |
| 承認番号 | 16000AMZ05382000 |
| 薬価収載 | 1985年12月 |
| 販売開始 | 1985年12月 |

調剤包装単位用



(01)04987376988292

販売包装単位用



(17)000000(10)000000

(01)14987376988213



販売元
日医工株式会社
NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21

製造販売元
ヤクハン製薬株式会社
北海道北広島市北の里27番地