

エンゼトニン液 0.1

開封日

年 月 日

500mL

外用殺菌消毒剤

2015年1月改訂(第4版)

エンゼトニン液 0.1

500mL

外用殺菌消毒剤

500mL

- (2) その他
- 1) 調製方法
繊維・布(綿、ガーゼ、ウール、レーヨン等)は本剤の成分であるベンゼトニウム塩化物を吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下とならないように注意すること。
 - 2) 使用時
ア. 血清・膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。
イ. 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。
ウ. 皮膚消毒に使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液に浸すこと。
 - 3) 器具等材質
ア. 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗炭カテーテル等への使用は避けることが望ましい。
イ. 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合は、腐食を防止するためにベンゼトニウム塩化物0.1%溶液に0.5~1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。
ウ. 皮革製品の消毒に使用すると変質させることがあるので使用しないこと。

滅菌製剤 エンゼトニン液 0.1

Enzetonin Solution 0.1
日本薬局方 ベンゼトニウム塩化物液

0.1%

500mL

日本標準商品分類番号
872616

承認番号 21000AMZ00395000
薬価収載 1998年 3月
販売開始 1998年 4月
再評価結果 1982年 8月

貯法: 避光、室温保存
使用期限: ラベルに記載

調剤 販売



(C01)04987288205012



(C01)14987288205255

製造番号
使用期限



ヨシダ製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951



キャップ: PP
ボトル: PP
ラベル: PS

ゴム: ゴム栓

【組成・性状】

1. 組成
ベンゼトニウム塩化物0.1%v/v
添加物としてホウ砂、エチル酸ナトリウムを含有する。
2. 製剤の性状
本剤は無色透明の液で、においはない。
本剤は振ると強く泡立つ。

【効能・効果】 【用法・用量】

| 効能・効果 | 用法・用量 |
|----------------------|--|
| 手指・皮膚の消毒 | 通常石けん等で十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、ベンゼトニウム塩化物0.05~0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗の場合には、5~10分間ブラッシングする。 |
| 手術部位(手術野)の皮膚の消毒 | 手術前局所皮膚面を、ベンゼトニウム塩化物0.1%溶液で約5分間洗い、その後ベンゼトニウム塩化物0.2%溶液を塗布する。 |
| 手術部位(手術野)の粘膜の消毒 | ベンゼトニウム塩化物0.01~0.025%溶液を用いる。 |
| 皮膚・粘膜の創傷部位の消毒 | ベンゼトニウム塩化物0.01%溶液を用いる。 |
| 感染皮膚面の消毒 | ベンゼトニウム塩化物0.01%溶液を用いる。 |
| 医療機器の消毒 | ベンゼトニウム塩化物0.1%溶液に10分間浸漬するか、または厳密に消毒する際は、器具を予め2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、その後ベンゼトニウム塩化物0.1%溶液中で15分間煮沸する。 |
| 手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒 | ベンゼトニウム塩化物0.05~0.1%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。 |
| 腔洗浄 | ベンゼトニウム塩化物0.025%溶液を用いる。 |
| 結膜囊の洗浄・消毒 | ベンゼトニウム塩化物0.02%溶液を用いる。 |

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
(1) 本剤は濃度に注意して使用すること。
(2) 炎症又は易刺激性の部位(粘膜、陰股部等)に使用する場合には、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。

滅菌製剤

エンゼトニン液 0.1

Enzetonin Solution 0.1
日本薬局方 ベンゼトニウム塩化物液

- (3) 本剤を希釈して使用する場合は、精製水を使用して調製後滅菌処理すること。

2. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

【過敏症(注)】 発疹・痒疹感等(頻度不明)

- 注) このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。
3. 臨床検査結果に及ぼす影響
本剤で消毒したカテーテルで採取した尿は、スルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陽性を示すことがある。

4. 適用上の注意
(1) 人体
1) 投与経路・経口投与しないこと。洗眼には使用しないこと。
2) 使用時
ア. 原液が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。
イ. 皮膚・粘膜の刺激症状があらわれることがあるので、注意すること。
ウ. 粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと(全身吸収による筋脱力を起こすおそれがある)。
エ. 密封包装、ギプス包装、パックに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないことが望ましい。