

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領（2013年）に準拠して作成

<p>吸入ステロイド喘息治療剤</p> <p>フルタイド ディスク ロタディスク エアゾール</p> <p>Flutide Diskus Rotadisk Aerosol</p>
--

剤形	ドライパウダーインヘラー（ディスクス、ロタディスク） 定量噴霧式エアゾール剤（エアゾール）
製剤の規制区分	処方箋医薬品 注意－医師等の処方箋により使用すること
規格・含量	50ディスクス、50ロタディスク：1プリスター中にフルチカゾンプロピオン酸エステル50μg含む 100ディスクス、100ロタディスク：1プリスター中にフルチカゾンプロピオン酸エステル100μg含む 200ディスクス、200ロタディスク：1プリスター中にフルチカゾンプロピオン酸エステル200μg含む 50μgエアゾール120吸入用：1回噴霧中にフルチカゾンプロピオン酸エステル50μg含む 100μgエアゾール60吸入用：1回噴霧中にフルチカゾンプロピオン酸エステル100μg含む
一般名	和名：フルチカゾンプロピオン酸エステル（JAN） 洋名：Fluticasone Propionate（JAN）
製造販売承認年月日 薬価基準収載・ 発売年月日	ディスクス： 製造販売承認年月日：2001年10月 2日 薬価基準収載年月日：2001年12月 7日（50、100ディスクス） 2001年12月14日（200ディスクス） 発売年月日：2002年 1月15日（100ディスクス） 2002年 1月25日（200ディスクス） 2002年 2月18日（50ディスクス） ロタディスク： 製造販売承認年月日：1998年 9月30日 薬価基準収載年月日：1998年11月27日 発売年月日：1998年11月27日 エアゾール： 製造販売承認年月日：2009年 6月10日（販売名変更による） 薬価基準収載年月日：2009年 9月25日（販売名変更による） 発売年月日：2003年 3月12日（50μgエアゾール120吸入用） 2003年12月19日（100μgエアゾール60吸入用）
開発・製造販売（輸入）・ 提携・販売会社名	製造販売元（輸入）：グラクソ・スミスクライン株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	グラクソ・スミスクライン株式会社 カスタマー・ケア・センター TEL：0120-561-007（9:00～17:45/土日祝日及び当社休業日を除く） FAX：0120-561-047（24時間受付） 医療関係者向けホームページ https://gskpro.com

本IFは2019年2月改訂のフルタイドディスクス添付文書、2019年2月改訂のフルタイドロタディスク添付文書及び2019年2月改訂のフルタイドエアゾール添付文書の記載に基づき改訂した。
最新の添付文書情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ <http://www.pmda.go.jp/> にてご確認ください。

IF 利用の手引きの概要

—日本病院薬剤師会—

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和63年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第2小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、IF と略す）の位置付け並びに IF 記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成10年9月に日病薬学術第3小委員会において IF 記載要領の改訂が行われた。

更に10年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成20年9月に日病薬医薬情報委員会において IF 記載要領 2008 が策定された。

IF 記載要領 2008 では、IF を紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF 等の電磁的データとして提供すること（e-IF）が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版の e-IF が提供されることとなった。

最新版の e-IF は、（独）医薬品医療機器総合機構の医薬品情報提供ホームページ（<http://www.pmda.go.jp/>）から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-IF を掲載する医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせて e-IF の情報を検討する組織を設置して、個々の IF が添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008年より年4回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、IF 記載要領の一部改訂を行い IF 記載要領 2013 として公表する運びとなった。

2. IF とは

IF は「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等は IF の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された IF は、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

[IF の様式]

①規格は A4 版、横書きとし、原則として 9 ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。

- ②IF 記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF 利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2 頁にまとめる。

[IF の作成]

- ①IF は原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ②IF に記載する項目及び配列は日病薬が策定した IF 記載要領に準拠する。
- ③添付文書の内容を補完するとの IF の主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」（以下、「IF 記載要領 2013」と略す）により作成された IF は、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（PDF）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

[IF の発行]

- ①「IF 記載要領 2013」は、平成 25 年 10 月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ②上記以外の医薬品については、「IF 記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合には IF が改訂される。

3. IF の利用にあたって

「IF 記載要領 2013」においては、PDF ファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体の IF については、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、IF の原点を踏まえ、医療現場に不足している情報や IF 作成時に記載し難い情報等については製薬企業の MR 等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、IF の利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IF が改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IF の使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることがあり、その取扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

IF を薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。IF は日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、IF があくまでも添付文書を補完する情報資材であり、インターネットでの公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

(2013 年 4 月改訂)

目 次

I. 概要に関する項目 1	11. 製剤中の有効成分の定量法..... 10
1. 開発の経緯..... 1	12. 力価..... 10
2. 製品の治療学的・製剤学的特性..... 1	13. 混入する可能性のある夾雑物..... 10
II. 名称に関する項目 3	14. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器 に関する情報..... 11
1. 販売名..... 3	15. 刺激性..... 11
(1) 和名..... 3	16. その他..... 11
(2) 洋名..... 3	
(3) 名称の由来..... 3	V. 治療に関する項目 12
2. 一般名..... 3	1. 効能又は効果..... 12
(1) 和名 (命名法)..... 3	2. 用法及び用量..... 12
(2) 洋名 (命名法)..... 3	3. 臨床成績..... 12
(3) ステム..... 3	(1) 臨床データパッケージ..... 12
3. 構造式又は示性式..... 4	(2) 臨床効果..... 12
4. 分子式及び分子量..... 4	(3) 臨床薬理試験..... 13
5. 化学名 (命名法)..... 4	(4) 探索的試験..... 14
6. 慣用名、別名、略号、記号番号..... 4	(5) 検証的試験..... 14
7. CAS登録番号..... 4	(6) 治療的使用..... 15
III. 有効成分に関する項目 5	VI. 薬効薬理に関する項目 18
1. 物理化学的性質..... 5	1. 薬理的に関連ある化合物 又は化合物群..... 18
(1) 外観・性状..... 5	2. 薬理作用..... 18
(2) 溶解性..... 5	(1) 作用部位・作用機序..... 18
(3) 吸湿性..... 5	(2) 薬効を裏付ける試験成績..... 18
(4) 融点 (分解点)、沸点、凝固点..... 5	(3) 作用発現時間・持続時間..... 23
(5) 酸塩基解離定数..... 5	VII. 薬物動態に関する項目 24
(6) 分配係数..... 5	1. 血中濃度の推移・測定法..... 24
(7) その他の主な示性値..... 5	(1) 治療上有効な血中濃度..... 24
2. 有効成分の各種条件下における安定性..... 6	(2) 最高血中濃度到達時間..... 24
3. 有効成分の確認試験法..... 6	(3) 臨床試験で確認された血中濃度..... 24
4. 有効成分の定量法..... 6	(4) 中毒域..... 25
IV. 製剤に関する項目 7	(5) 食事・併用薬の影響..... 25
1. 剤形..... 7	(6) 母集団 (ポピュレーション) 解析 により判明した薬物体内動態変動 要因..... 25
(1) 投与経路..... 7	2. 薬物速度論的パラメータ..... 25
(2) 剤形の区別、外観及び性状..... 7	(1) 解析方法..... 25
(3) 製剤の物性..... 8	(2) 吸収速度定数..... 25
(4) 識別コード..... 8	(3) バイオアベイラビリティ..... 25
(5) pH、浸透圧比、粘度、比重、 安定な pH 域等..... 8	(4) 消失速度定数..... 26
(6) 無菌の有無..... 8	(5) クリアランス..... 26
2. 製剤の組成..... 8	(6) 分布容積..... 26
(1) 有効成分 (活性成分) の含量..... 8	(7) 血漿蛋白結合率..... 26
(2) 添加物..... 8	3. 吸収..... 26
(3) 添付溶解液の組成及び容量..... 8	4. 分布..... 26
3. 用時溶解して使用する製剤の調製法..... 8	(1) 血液-脳関門通過性..... 26
4. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意..... 8	(2) 血液-胎盤関門通過性..... 26
5. 製剤の各種条件下における安定性..... 9	(3) 乳汁への移行性..... 27
6. 溶解後の安定性..... 10	(4) 髄液への移行性..... 27
7. 他剤との配合変化 (物理化学的変化)..... 10	(5) その他の組織への移行性..... 27
8. 溶出性..... 10	
9. 生物学的試験法..... 10	
10. 製剤中の有効成分の確認試験法..... 10	

5. 代謝	28	2. 毒性試験	46
(1) 代謝部位及び代謝経路	28	(1) 単回投与毒性試験	46
(2) 代謝に関与する酵素 (CYP450 等) の分子種	28	(2) 反復投与毒性試験	47
(3) 初回通過効果の有無及びその割合	28	(3) 生殖発生毒性試験	47
(4) 代謝物の活性の有無及び比率	28	(4) その他の特殊毒性	47
(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ	29	X. 管理的事項に関する項目	48
6. 排泄	29	1. 規制区分	48
(1) 排泄部位及び経路	29	2. 有効期間又は使用期限	48
(2) 排泄率	29	3. 貯法・保存条件	48
(3) 排泄速度	29	4. 薬剤取扱い上の注意点	48
7. トランスポーターに関する情報	29	(1) 薬局での取扱い上の留意点について	48
8. 透析等による除去率	29	(2) 薬剤交付時の取扱いについて (患者等に留意すべき必須事項等)	48
VII. 安全性 (使用上の注意等) に関する項目	30	(3) 調剤時の留意点について	49
1. 警告内容とその理由	30	5. 承認条件等	49
2. 禁忌内容とその理由 (原則禁忌を含む)	30	6. 包装	49
3. 効能又は効果に関連する使用上の注意 とその理由	31	7. 容器の材質	49
4. 用法及び用量に関連する使用上の注意 とその理由	31	8. 同一成分・同効薬	49
5. 慎重投与内容とその理由	31	9. 国際誕生年月日	50
6. 重要な基本的注意とその理由及び処置 方法	31	10. 製造販売承認年月日及び承認番号	50
7. 相互作用	34	11. 薬価基準収載年月日	50
(1) 併用禁忌とその理由	34	12. 効能又は効果追加、用法及び用量 変更追加等の年月日及びその内容	50
(2) 併用注意とその理由	35	13. 再審査結果、再評価結果公表年月日 及びその内容	50
8. 副作用	35	14. 再審査期間	51
(1) 副作用の概要	35	15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	51
(2) 重大な副作用と初期症状	36	16. 各種コード	51
(3) その他の副作用	36	17. 保険給付上の注意	51
(4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値 異常一覧	36	XI. 文献	52
(5) 基礎疾患、合併症、重症度及び 手術の有無等背景別の副作用発現 頻度	40	1. 引用文献	52
(6) 薬物アレルギーに対する注意及び 試験法	42	2. その他の参考文献	52
9. 高齢者への投与	43	XII. 参考資料	53
10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	43	1. 主な外国での発売状況	53
11. 小児等への投与	44	2. 海外における臨床支援情報	54
12. 臨床検査結果に及ぼす影響	44	(1) 妊婦に関する海外情報	54
13. 過量投与	44	(2) 小児等に関する記載	55
14. 適用上の注意	45	XIII. 備考	57
15. その他の注意	45	その他の関連資料	57
16. その他	45		
IX. 非臨床試験に関する項目	46		
1. 薬理試験	46		
(1) 薬効薬理試験	46		
(2) 副次的薬理試験	46		
(3) 安全性薬理試験	46		
(4) その他の薬理試験	46		

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

フルタイドディスカス・ロタディスク・エアゾールは、英国グラクソ・スミスクライン社で開発された合成副腎皮質ステロイドであるフルチカゾンプロピオン酸エステルを含有する、喘息治療用の吸入剤である。フルチカゾンプロピオン酸エステルは鼻過敏症の治療薬であるフルナーゼ点鼻液にも使用されている。

フルチカゾンプロピオン酸エステルは既存のものより強い局所抗炎症作用を示し、全身への影響が少ない合成副腎皮質ステロイドとして見出された。フルチカゾンプロピオン酸エステルの海外における臨床第 I 相試験はエアゾール剤 (MDI) が 1985 年に、ドライパウダーインヘラー (DPI) が 1987 年に開始され、その後、成人、小児における臨床試験により有用性が確認されたので、英国では 1992 年に製造承認申請を行い、DPI は 1993 年 2 月に、MDI は同年 6 月に承認された。

我が国では、1990 年より DPI (成人) における臨床第 I 相試験に着手した。

その後、用量設定試験、ベクロメタゾンプロピオン酸エステルエアゾール (ベコタイド 50 インヘラー) との比較試験、長期投与試験等により本剤の有用性が確認されたため、1994 年 1 月に輸入承認申請を行い、1998 年 9 月に承認された (ロタディスク)。さらに 2001 年 10 月には小児の用法・用量、ディスカスが追加承認され、2002 年 10 月にはエアゾール剤が追加承認された。なお、医療事故防止対策に基づき、2009 年 6 月に販売名をフルタイド 50・100 エアアからフルタイド 50 μ g・100 μ g エアゾールに変更した。また、市販後の調査に基づき、2004 年 12 月に再審査申請を行った結果、2009 年 3 月に薬事法第 14 条第 2 項各号のいずれにも該当しないとの再審査結果を得た。

2. 製品の治療学的・製剤学的特性

- (1) 小児から成人までの気管支喘息に対して 1 日 2 回投与で、肺機能や喘息症状を改善しコントロールを良好に保つ。
(「V. 治療に関する項目 3. 臨床成績」の項参照)
- (2) フルチカゾンプロピオン酸エステルはベクロメタゾンプロピオン酸エステルの約 2 倍強力な抗炎症作用を有する。
(「VI. 薬効薬理に関する項目 2. 薬理作用」の項参照)
- (3) フルチカゾンプロピオン酸エステルのヒトでの経口バイオアベイラビリティは 1% 以下である (海外データ)。また、消化管から吸収された場合、肝で速やかに代謝を受け不活性化される (ラット)。
(「VII. 薬物動態に関する項目 2. 薬物速度論的パラメータ」及び「VII. 薬物動態に関する項目 5. 代謝」の項参照)
- (4) フルタイドには DPI (ドライパウダーインヘラー) と pMDI (加圧式定量噴霧式吸入器) の 2 種類の吸入剤形があるほか、50 μ g、100 μ g、200 μ g の 3 種類の容量があり、患者の年齢や重症度に応じたフレキシブルな処方が可能である。
*小児の気管支喘息に対してはフルタイド 50 ディスカス、100 ディスカス、50 ロタディスク、100 ロタディスク、50 μ g エアゾール 120 吸入用、100 μ g エアゾール 60 吸入用が適応となる。
(「IV. 製剤に関する項目 1. 剤形」の項参照)
- (5) ディスカス及びロタディスクにはカウンターがついているので薬剤の残量が確認できる。
(「XIII. 備考 その他の関連資料」の項参照)
- (6) 成人 5736 例、小児 1637 例 (総症例 7373 例) 中、成人 252 例 (4.4%)、小児 43 例 (2.6%) に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。

成人：承認時までの調査症例 457 例中、31 例 (6.8%) に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。その主なものは咽喉頭症状 (不快感、むせ、疼痛、刺激感、異和感) 10 例 (2.2%)、口腔内カンジダ症 3 例 (0.7%)、嘔声 3 例 (0.7%)、口内乾燥 3 例 (0.7%) であった (承認時)。

市販後における調査症例 5279 例中、221 例 (4.2%) に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。その主なものは口腔及び咽喉頭症状 (不快感、むせ、疼痛、刺激感、異和感) 63 例 (1.2%)、嘔声 56 例 (1.1%)、悪心 13 例 (0.2%) であった (再審査終了時)。

I. 概要に関する項目

小児：承認時までの調査症例 112 例中、29 例（25.9%）に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。その主なものは胸痛 2 例（1.8%）、口腔内カンジダ症 1 例（0.9%）、嘔声 1 例（0.9%）であった（承認時）。

市販後における調査症例 1525 例中、14 例（0.9%）に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。その主なものは血中コルチゾール減少 2 例（0.1%）、口腔カンジダ症、副鼻腔炎、むせ、嘔声等、各 1 例（0.1%）であった（再審査終了時）。

重大な副作用として、アナフィラキシーがあらわれることがある。

（「VIII. 安全性（使用上の注意等）」に関する項目 8. 副作用」の項参照）

Ⅱ. 名称に関する項目

1. 販売名

(1) 和名

フルタイド 50 ディスカス
フルタイド 100 ディスカス
フルタイド 200 ディスカス

フルタイド 50 ロタディスク
フルタイド 100 ロタディスク
フルタイド 200 ロタディスク

フルタイド 50 μ g エアゾール 120 吸入用
フルタイド 100 μ g エアゾール 60 吸入用

(2) 洋名

Flutide 50 Diskus
Flutide 100 Diskus
Flutide 200 Diskus

Flutide 50 Rotadisk
Flutide 100 Rotadisk
Flutide 200 Rotadisk

Flutide 50 μ g Aerosol 120puffs
Flutide 100 μ g Aerosol 60puffs

(3) 名称の由来

- ・フルタイド
一般名である Fluticasone Propionate と、呼吸を表わす tidal より「フルタイド (Flutide)」とした。
- ・ディスクス
円盤状のものを意味する disk と、古代ギリシャから伝わる円盤競技である discus より「ディスクス (Diskus)」とした。
- ・ロタディスク
回転を意味する rotary と、円盤状のものを意味する disk より「ロタディスク (Rotadisk)」とした。

2. 一般名

(1) 和名 (命名法)

フルチカゾンプロピオン酸エステル (JAN)


(2) 洋名 (命名法)

Fluticasone Propionate (JAN)、Fluticasone (INN)

(3) ステム

該当しない (プレドニゾン及びプレドニゾロン誘導体: pred)

3. 構造式又は示性式



4. 分子式及び分子量

分子式：C₂₅H₃₁F₃O₅S

分子量：500.57

5. 化学名（命名法）

(和名)：S-フルオロメチル 6 α ,9 α -ジフルオロ-11 β -ヒドロキシ-16 α -メチル-3-オキソ-17 α -プロピオニルオキシ
アンドロスト-1,4-ジエン-17 β -カルボチオエート

(洋名)：S-Fluoromethyl 6 α ,9 α -difluoro-11 β -hydroxy-16 α -methyl-3-oxo-17 α -propionyloxyandrost-1,4-diene-17 β -
carbothioate (IUPAC)

6. 慣用名、別名、略号、記号番号

記号番号：SN411MD（日本）（ディスクス製剤治験記号）

SN411D（日本）（ロタディスクス製剤治験記号）

SN411A（日本）（エアゾール製剤治験記号）

CCI18781（英国）（化合物記号）

7. CAS 登録番号

90566-53-3 (Fluticasone)

80474-14-2 (Fluticasone Propionate)

Ⅲ. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

フルチカゾンプロピオン酸エステルは、白色の微細な粉末で、におい及び味はない。

(2) 溶解性

測定温度：21℃

溶 媒	溶解度 (w/v%)	日本薬局方の溶解度表記
ジメチルホルムアミド	33.4	溶けやすい
ジメチルスルホキシド	31.8	溶けやすい
アセトン	4.3	やや溶けやすい
ジクロロメタン	2.9	やや溶けにくい
クロロホルム	1.7	やや溶けにくい
アセトニトリル	1.6	やや溶けにくい
酢酸エチル	1.1	やや溶けにくい
メタノール	0.44	溶けにくい
エタノール (99.5)	0.33	溶けにくい
2-プロパノール	0.096	極めて溶けにくい
ジエチルエーテル	0.069	極めて溶けにくい
ヘキサン	0.00001	ほとんど溶けない
水	<0.00001	ほとんど溶けない

(3) 吸湿性

25℃、51～93%RH で吸湿性は認められなかった。

(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点

分解点：約 273℃

本剤は「日局 12」融点測定法 第 1 法により融点を測定した結果、昇温により融解せずに徐々に着色後、収縮発泡を伴い分解した。

(5) 酸塩基解離定数

該当資料なし（本剤は水にほとんど溶けない）

(6) 分配係数（logP）

本剤の分配係数（n-オクタノール/水）は 15,100 で、水層にはほとんど分配されなかった。

(7) その他の主な示性値

比旋光度 $[\alpha]_D^{20}$ ：約 +50～+56°（アセトン及び水分を換算したもの 0.25g、ジクロロメタン 50mL、測定管 100mm）

Ⅲ. 有効成分に関する項目

2. 有効成分の各種条件下における安定性

試験区分	保存条件	保存形態	保存期間	結果	
長期保存試験	25°C/75%RH (暗所)	褐色ガラス瓶 (密栓)	36 ヶ月	変化なし	
苛酷試験	光	25°C/蛍光灯下 (1000lux)	無色ガラス瓶 (開栓)	1 ヶ月	変化なし
	温度	65°C (暗所)	褐色ガラス瓶 (密栓)	3 ヶ月	変化なし
	温度 湿度	40°C/75%RH (暗所)	褐色ガラス瓶 (開栓)	6 ヶ月	変化なし
			褐色ガラス瓶 (密栓)	6 ヶ月	変化なし

3. 有効成分の確認試験法

- ・ 呈色反応
ヒドロキサム酸鉄錯塩を生成させ、その色 (暗赤色) で確認する。
- ・ 沈殿反応
難溶性物質 (PbS) を生成させ、その沈殿 (黒色) で確認する。
- ・ 赤外吸収
赤外吸収スペクトル測定法 (ペースト法)

4. 有効成分の定量法

液体クロマトグラフィーにより定量する。

IV. 製剤に関する項目



1. 剤形

(1) 投与経路

吸入


(2) 剤形の区別、外観及び性状

・ ディスカス、ロタディスク

販売名	フルタイド 50 ディスカス、フルタイド 100 ディスカス、フルタイド 200 ディスカス フルタイド 50 ロタディスク、フルタイド 100 ロタディスク、フルタイド 200 ロタディスク	
剤形の区別	ドライパウダーインヘラー	
規格・含量	フルタイド 50 ディスカス、50 ロタディスク：1 ブリスター中に FP 50 μ g を含有する。 フルタイド 100 ディスカス、100 ロタディスク：1 ブリスター中に FP 100 μ g を含有する。 フルタイド 200 ディスカス、200 ロタディスク：1 ブリスター中に FP 200 μ g を含有する。	
性状	ディスクス：定量式吸入粉末剤で、ブリスターの内容物は白色の粉末である。 ロタディスク：4 つのブリスターのある円形のホイールパックであり、その内容物は白色の流動性のある粉末である。	
外観	<p>ディスクス</p> 	<p>ロタディスク</p> 

FP：フルチカゾンプロピオン酸エステル

・ エアゾール

販売名	フルタイド 50 μ g エアゾール 120 吸入用、フルタイド 100 μ g エアゾール 60 吸入用
剤形の区別	定量噴霧式エアゾール剤
規格・含量	フルタイド 50 μ g エアゾール 120 吸入用：1 回噴霧中に FP 50 μ g を含有する（1 缶中に FP 8.83mg を含有）。 フルタイド 100 μ g エアゾール 60 吸入用：1 回噴霧中に FP 100 μ g を含有する（1 缶中に FP 11.67mg を含有）。
1 缶中の重量	フルタイド 50 μ g エアゾール 120 吸入用：10.6g フルタイド 100 μ g エアゾール 60 吸入用：7.0g
性状	用時作動により一定量の薬液が噴霧される吸入エアゾール剤である。
外観	

FP：フルチカゾンプロピオン酸エステル

IV. 製剤に関する項目

(3) 製剤の物性

ディスクス、ロタディスク：ブリスターの内容物は白色の粉末である。

エアゾール：密封容器の中に懸濁液が充填されており、噴霧時に微細な霧状となる。

(4) 識別コード

フルチカゾンプロピオン酸エステルの含量により以下が異なる。

・ディスクス：中心ラベル上半分の色

(50 ディスクス：紫色、100 ディスクス：橙色、200 ディスクス：青色)

・ロタディスク：裏面の色

(50 ロタディスク：淡橙色、100 ロタディスク：橙色、200 ロタディスク：濃橙色)

・エアゾール：ボンベの製品名の横にある帯の色

(50 μ g：灰色、100 μ g：淡紫色)

(5) pH、浸透圧比、粘度、比重、安定な pH 域等

該当資料なし

(6) 無菌の有無

本剤は無菌製剤ではない。

2. 製剤の組成

(1) 有効成分（活性成分）の含量

販売名	1 ブリスター（1 回噴霧）中のフルチカゾンプロピオン酸エステル含量
フルタイド 50 ディスクス	50 μ g
フルタイド 100 ディスクス	100 μ g
フルタイド 200 ディスクス	200 μ g
フルタイド 50 ロタディスク	50 μ g
フルタイド 100 ロタディスク	100 μ g
フルタイド 200 ロタディスク	200 μ g
フルタイド 50 μ g エアゾール 120 吸入用	50 μ g
フルタイド 100 μ g エアゾール 60 吸入用	100 μ g

(2) 添加物

・ディスクス、ロタディスク：賦形剤 乳糖水和物（注：夾雑物として乳蛋白を含む）

・エアゾール：噴射剤 1,1,1,2-テトラフルオロエタン

(3) 添付溶解液の組成及び容量

該当しない

3. 用時溶解して使用する製剤の調製法

該当しない

4. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意

該当しない

5. 製剤の各種条件下における安定性

50、100、250*ディスク

(*250 μ g 製剤は申請剤形ではない。200 μ g 製剤の安定性は100 μ g 製剤と250 μ g 製剤の安定性より推定された。)

	保存条件	保存形態	保存期間	結果
加速試験	40°C/75%RH	オーバーラップ包装 ^{注1)}	6 ヶ月	変化なし
苛酷試験	40°C/75%RH	オーバーラップ包装なし	6 ヶ月	・微粒子量の低下 ・その他の試験項目は変化なし
長期保存試験	30°C/50%RH	オーバーラップ包装 ^{注1)}	24 ヶ月	変化なし
苛酷試験 ^{注2)}	30°C/65%RH	吸入器(オーバーラップ包装なし)	12 ヶ月	変化なし

測定項目：含量、性状、類縁物質、微粒子量、微生物限度（長期保存試験で実施）

注1) 本剤をアルミニウム箔でオーバーラップ包装したもの。

注2) 50 μ g 製剤、100 μ g 製剤、200 μ g 製剤で実施

50、100 ロタディスク

		保存条件	保存形態	保存期間	結果
苛酷試験	加温	37°C/50%RH	両面アルミニウム製 ホイルパック	12 ヶ月	変化なし
		45°C/50%RH		6 ヶ月	変化なし
	加湿	25°C/75%RH		6 ヶ月	変化なし
長期保存試験		4°C		36 ヶ月	変化なし
		25°C/50%RH		36 ヶ月	変化なし
		30°C/50%RH		36 ヶ月	変化なし

測定項目：含量、性状、類縁物質、水分、微粒子量

200 ロタディスク

	保存条件	保存形態	保存期間	結果
加速試験	40°C/75%RH	両面アルミニウム製 ホイルパック	6 ヶ月	変化なし

測定項目：含量、性状、類縁物質、水分、微粒子量

50 μ g エアゾール 120 吸入用

	保存条件		保存形態	保存期間	結果
加速試験	30°C/60%RH	倒立	アルミニウム缶	12 ヶ月	変化なし
		正立			
	40°C/75%RH	倒立		6 ヶ月	
		正立			
長期保存試験	25°C/60%RH	倒立		24 ヶ月	
		正立			

測定項目：含量、性状、類縁物質、微粒子量、漏出率

IV. 製剤に関する項目

100 μ g エアゾール 60 吸入用（アルミニウム缶に充填）

	保存条件		保存形態	保存期間	結果
加速試験	30°C/60%RH	倒立	アルミニウム缶	12 ヶ月	変化なし
		正立			
	40°C/75%RH	倒立			
		正立			
長期保存試験	25°C/60%RH	倒立		24 ヶ月	
		正立			

測定項目：含量、性状、類縁物質、微粒子量、漏出率

6. 溶解後の安定性

該当しない

7. 他剤との配合変化（物理化学的变化）

該当しない

8. 溶出性

該当しない

9. 生物学的試験法

該当しない

10. 製剤中の有効成分の確認試験法

ディスクス：紫外吸収スペクトル法

ロタディスク：紫外吸収スペクトル法、薄層クロマトグラフィー

エアゾール：赤外吸収スペクトル測定法（ペースト法）

11. 製剤中の有効成分の定量法

液体クロマトグラフィーにより定量する。

12. 力価

該当しない

13. 混入する可能性のある夾雑物

フルチカゾンプロピオン酸エステル製造工程における中間体、副生成物又は分解物の混在が予想される。

14. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報

「XIII. 備考 その他の関連資料」の項参照

15. 刺激性

ラットにフルチカゾンプロピオン酸エステル散剤（フルチカゾンプロピオン酸エステル 125mg 及び乳糖水和物 875mg の混合物）を 14 日間吸入投与したが、局所（呼吸気道）への刺激性はみられなかった。本投与量は、臨床吸入量（100 μ g \times 2 回/50kg/日）の約 163 倍に相当する。

16. その他

該当資料なし

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

気管支喘息

2. 用法及び用量

成人には、フルチカゾンプロピオン酸エステルとして通常1回100 μ gを1日2回吸入投与する。

小児には、フルチカゾンプロピオン酸エステルとして通常1回50 μ gを1日2回吸入投与する。

なお、症状により適宜増減するが、1日の最大投与量は成人では800 μ g、小児では200 μ gを限度とする。

用法・用量に関連する使用上の注意

症状の緩解がみられた場合は、治療上必要最小限の用量で投与すること。

(解説)

本剤の継続投与により、患者の喘息症状の緩解がみられた場合は、治療上必要最小限の用量への減量、つまり本剤をより低用量製剤へ変更することを考慮する必要がある。低用量製剤に変更した際は、病態の悪化による喘息症状の悪化に注意すること。

3. 臨床成績

(1) 臨床データパッケージ

該当しない(2009年3月以前承認品目)

(2) 臨床効果

1) 成人の成績^{1)~10)}

比較試験を含む成人気管支喘息患者370例に対するフルタイドロタディスクの有効率(中等度改善以上)は79.7%(295/370)である。また、成人気管支喘息患者(軽・中等症)を対象とする比較試験において、フルタイドロタディスク1回100 μ g1日2回又はベクロメタゾンプロピオン酸エステルエアゾール1回100 μ g1日4回を4週間投与した結果、フルタイドロタディスクは最終全般改善度、概括安全度及び有用度とも有意に優れた成績が得られた。

注) **最終全般改善度**：臨床症状、聴診ラ音、肺機能検査所見、併用薬の使用状況及び患者の印象を総合的に判断し、担当医師が以下7段階で判定

1.著明改善 2.中等度改善 3.軽度改善 4.不変 5.やや悪化 6.悪化 7.著明悪化

概括安全度：副作用、血圧・脈拍及び臨床検査成績に基づき、担当医師が以下4段階で判定

1.安全である 2.ほぼ安全である 3.やや安全性に問題あり 4.安全性に問題あり

有用度：最終全般改善度及び概括安全度を総合的に判断し、担当医師が以下の7段階で判定

1.きわめて有用 2.有用 3.やや有用 4.有用でない 5.やや好ましくない 6.好ましくない 7.きわめて好ましくない

1) 宮本昭正ほか：臨床医薬. 1997；13(6)：1587.

2) 宮本昭正ほか：臨床医薬. 1997；13(6)：1609.

3) 大道光秀ほか：臨床医薬. 1997；13(6)：1635.

4) 山岸雅彦ほか：臨床医薬. 1997；13(8)：2097.

5) 田村 弦ほか：臨床医薬. 1997；13(10)：2741.

6) 工藤宏一郎ほか：臨床医薬. 1994；10(3)：689.

7) 鈴木俊介ほか：臨床医薬. 1997；13(11)：2993.

- 8) 足立 満ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (11) : 3011.
 9) 佐野靖之ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (13) : 3527.
 10) 木原令夫ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (13) : 3545.

2) 小児の成績^{11) 12)}

小児気管支喘息患者 108 例に対するフルタイドディスクの有効率（中等度改善以上）は 82.4%（89/108）である。

また、用量検討試験¹¹⁾の年齢層毎の有効率は以下の表のとおりである。

	5 歳	6～8 歳	9～11 歳	12～15 歳
100µg/日	0% (0/1)	76.9% (10/13)	65.2% (15/23)	42.9% (3/7)
200µg/日	40.0% (2/5)	87.5% (14/16)	70.0% (14/20)	76.9% (10/13)

注) 最終全般改善度：臨床症状、聴診ラ音、肺機能検査所見、併用薬の使用状況及び患者の印象を総合的に判断し、担当医師が以下の 6 段階で判定

1. 著明改善 2. 中等度改善 3. 軽度改善 4. 不変 5. 悪化 6. 判定不能

11) 飯倉洋治ほか：アレルギー・免疫. 2000 ; 7 (5) : 653.

12) 飯倉洋治ほか：アレルギー・免疫. 2000 ; 7 (5) : 671.

3) 小児の市販後調査（対象症例 15 歳未満）^{注 1)}

使用成績調査：安全性解析対象症例 723 例における副作用発現率は 0.97%（7/723）であり、有効性解析対象症例 692 例における有効率は 97.98%（678/692）であった。

長期使用に関する特別調査（特定使用成績調査）：安全性解析対象症例 519 例における副作用発現率は 1.35%（7/519）であり、有効性解析対象症例 409 例^{注 2)}における有効率は 99.76%（408/409）であった。

注 1) ドライパウダー剤とエアゾール剤の合算である。

注 2) ドライパウダー剤を対象とした調査は投与後 12 ヶ月時点の有効性解析対象症例数

(3) 臨床薬理試験

1) 単回投与試験

健康成人 15 名に対してフルタイドロタディスクを 100、200、400µg を単回投与した結果、自覚症状、他覚所見及び副腎機能検査等の諸検査においてフルタイドロタディスクに起因すると思われる異常所見、検査値異常は認められなかった¹³⁾。

注) 本剤の承認されている用法・用量は、成人には、フルチカゾンプロピオン酸エステルとして通常 1 回 100µg を 1 日 2 回吸入投与であり、1 日の最大投与量は成人では 800µg である。

13) 足立 満ほか：臨床医薬. 1994 ; 10 (1) : 17.

2) 反復投与試験

健康成人 13 名に対してフルタイドロタディスクを 200、400µg/日、又はプラセボを 1 日 2 回、14 日間連続で投与した結果、単回投与と同様の結果を得た¹³⁾。

また、健康成人 8 名に対してフルタイドロタディスク 800µg/日、又はプラセボを 1 日 2 回、14 日間連続投与した結果、尿中 17-OHCS 量が投与終了時に低下したが、プラセボ群でもほぼ同程度の低下を示しており、他の副腎皮質機能検査では異常が認められなかったため、フルタイドロタディスクの副腎皮質機能に与える影響はほとんどないものと考えられた。その他の結果は単回投与と同様の結果であった¹⁴⁾。

13) 足立 満ほか：臨床医薬. 1994 ; 10 (1) : 17.

14) 足立 満ほか：臨床医薬. 1994 ; 10 (1) : 31.

(4) 探索的試験

成人気管支喘息患者 193 名を対象に、フルタイドロタディスク 100、200、400 μ g/日のいずれかを、1 日 2 回、4 週間投与した（二重盲検・群間比較試験）。結果、最終全般改善度における「中等度以上」の改善率、有用度における「有用以上」の有用率、PEF の推移等において、用量に相関した改善が認められ、また 200 μ g/日と 400 μ g/日で「著明改善率」がほぼ同等であったことから、200 μ g/日を通常投与量に設定した¹⁾。

1) 宮本昭正ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (6) : 1587.

(5) 検証的試験

1) 無作為化並行用量反応試験

該当資料なし

2) 比較試験

成人気管支喘息患者 207 名を対象に、フルタイドロタディスク 200 μ g/日（1 日 2 回）又はベクロメタゾンプロピオン酸エステル 400 μ g/日（1 日 4 回）4 週間投与し、両剤を比較検討したところ（オープン群間比較試験）、フルタイドロタディスクはベクロメタゾンプロピオン酸エステルの半量で改善度、安全度ともに有意に優れた成績を得た²⁾。

2) 宮本昭正ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (6) : 1609.

3) 安全性試験

a) 長期投与試験

成人気管支喘息患者 41 名を対象に、フルタイドロタディスク 200、400 μ g/日のいずれかを 1 日 2 回、3 ヶ月以上（最長 28 週間）投与した（オープン試験）。結果、フルタイドロタディスクは長期投与においても、安全性に問題なく優れた臨床効果が得られることが確認された^{3) 4)}。

3) 大道光秀ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (6) : 1635.

4) 山岸雅彦ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (8) : 2097.

b) 高用量投与試験

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 800 μ g/日以上でも十分な効果の得られない成人気管支喘息患者 74 名を対象に、フルタイドロタディスクを 400 μ g/日（1 日 2 回）又は 800 μ g/日（1 日 2 回）に増量し、4 週間以上（最長 28 週間）投与した（オープン試験）。結果、これらの患者においてもフルタイドロタディスクは優れた効果、安全性を示した^{5) ~8)}。

5) 田村 弦ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (10) : 2741.

6) 工藤宏一郎ほか：臨床医薬. 1994 ; 10 (3) : 689.

7) 鈴木俊介ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (11) : 2993.

8) 足立 満ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (11) : 3011.

4) 患者・病態別試験

a) 経口ステロイド剤減量・離脱試験

経口ステロイド剤を連用している成人気管支喘息患者 57 名を対象に、フルタイドロタディスク 800 μ g/日（1 日 2 回）、12 週間以上（最長 25 週間）投与した（オープン試験）。結果、フルタイドロタディスクは経口ステロイド剤の減量・離脱に効果が認められ、また安全性に問題は認められなかった^{9) 10)}。

9) 佐野靖之ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (13) : 3527.

10) 木原令夫ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (13) : 3545.

b) 小児用量検討試験

5～15歳の小児気管支喘息患者120名を対象に、フルタイドディスクスを100 μ g/日（1日2回）又は200 μ g/日（1日2回）のいずれかを4週間投与した（オープン試験）。結果、小児気管支喘息に対するフルタイドディスクスの有効性、安全性が確認され、また通常用量については小児への安全性を考慮して、喘息のコントロールが可能であった低用量の100 μ g/日が適切であると考えられた¹¹⁾。

11) 飯倉洋治ほか：アレルギー・免疫. 2000；7（5）：653.

c) 小児長期投与試験

5～15歳の小児気管支喘息患者97名を対象に、フルタイドディスクスを100 μ g/日（1日2回）又は200 μ g/日（1日2回）のいずれかを8～24週間投与した（オープン試験）。結果、高用量である200 μ g/日においても忍容性は高く、また低用量である100 μ g/日においても喘息症状のコントロールが可能であることが確認され、小児気管支喘息の長期管理薬としての有用性が期待された^{11) 12)}。

11) 飯倉洋治ほか：アレルギー・免疫. 2000；7（5）：653.

12) 飯倉洋治ほか：アレルギー・免疫. 2000；7（5）：671.

d) 高齢者

高齢者のみを対象とした試験は行っていないが、国内で行われた臨床試験^{1)～10)}に65歳以上76歳以下の症例が含まれた。フルタイドロタディスク100～400 μ g、1日2回、4～38週間投与した場合の有効性は73.0%（54/74）、副作用発現頻度は4.3%（4/92）であり、成人全体の結果との差は認められなかった。

1) 宮本昭正ほか：臨床医薬. 1997；13（6）：1587.

2) 宮本昭正ほか：臨床医薬. 1997；13（6）：1609.

3) 大道光秀ほか：臨床医薬. 1997；13（6）：1635.

4) 山岸雅彦ほか：臨床医薬. 1997；13（8）：2097.

5) 田村 弦ほか：臨床医薬. 1997；13（10）：2741.

6) 工藤宏一郎ほか：臨床医薬. 1994；10（3）：689.

7) 鈴木俊介ほか：臨床医薬. 1997；13（11）：2993.

8) 足立 満ほか：臨床医薬. 1997；13（11）：3011.

9) 佐野靖之ほか：臨床医薬. 1997；13（13）：3527.

10) 木原令夫ほか：臨床医薬. 1997；13（13）：3545.

(6) 治療的使用

1) 使用成績調査・特定使用成績調査（特別調査）・製造販売後臨床試験（市販後臨床試験）

フルタイドの再審査期間中（成人：1998年9月30日～2004年9月29日、小児：2001年10月2日～2005年10月1日）に実施された使用成績調査、特別調査（特定使用成績調査）、市販後臨床試験（製造販売後臨床試験）の結果は次の通りであった。

V. 治療に関する項目

成人を対象とした調査：

項目：観察期間	調査票回収症例数	結果
使用成績調査：4週間	3,429例	安全性：副作用発現症例率は3.79%（120/3,164例）で、承認時までの試験における副作用発現症例率（6.78%）よりも低かった。 有効性：有効率は96.58%（2,849/2,950例）であった。 ※安全性解析対象症例3,164例中57例の小児使用例が収集された。これら症例において副作用はみられなかった。また、有効率は98.21%（55/56例）であった。
特別調査	ドライパウダーの長期使用に関する調査（ロタディスク・ディスクス）：1年間	839例 安全性：副作用発現症例率は6.93%（57/822例）で、その多くは投与3ヵ月未満で発現しており、投与期間と副作用発現頻度に相関はみられなかった。 有効性：有効率は99.33%（739/744例）、また、本剤が1年以上投与された392例の有効率は100%であり、長期投与においても高い有効率を示した。 ※安全性解析対象症例822例中7例の小児使用例が収集された。これら症例において副作用はみられなかった。また、有効率は100%（6/6例）であった。
	エアゾールの長期使用に関する調査（エアゾール）：6ヵ月以上	99例 安全性：副作用発現症例率は4.12%（4/97例）で、いずれも非重篤かつ既知の内容であり、投与期間と副作用発現頻度に相関はみられなかった。 有効性：有効率は96.55%（84/87例）、また、本剤が6ヵ月以上投与された70例の有効率は95.71%（67/70例）であり、長期投与においても高い有効率を示した。
	喘息エピソードに関する調査：6ヵ月間	1,389例 安全性：副作用発現症例率は1.97%（26/1,320例）であった。 有効性：何らかの喘息エピソード（入院、救急治療室受診、予定外受診、休み）が1回以上経験「有」の症例率は、「投与前」62.92%（565/898例）から「投与後」24.94%（224/898例）に有意に減少した（ $p < 0.001$ ）。 また、各エピソード別についても同様に検討した結果、いずれも本剤投与前に比して本剤投与後のエピソード経験率は有意に減少した（ $p < 0.001$ ）。 ※安全性解析対象症例1,320例中219例の小児使用例が収集された。これら症例において副作用はみられなかった。また、いずれかの喘息エピソードが1回以上経験「有」の症例率は、「投与前」81.55%（137/168例）から「投与後」37.50%（63/168例）に有意に減少した（ $p < 0.001$ ）。

小児を対象とした調査：

項目：観察期間	調査票回収症例数	結果
使用成績調査：4週間	785例	安全性：副作用発現症例率は0.97%（7/723例）で、承認時までの試験における副作用発現症例率（25.89%）より低かった。 有効性：有効率は97.98%（678/692例）であった。
特別調査	長期使用に関する調査（ロタディスク・ディスクス）：1年間	415例 安全性：副作用発現症例率は1.25%（5/400例）であり、いずれも非重篤な事象で、長期使用による特記すべき傾向はなかった。 有効性：6ヵ月時点での有効率は99.47%（375/377例）、12ヵ月時点の有効率は99.66%（294/295例）で、長期投与においても高い有効率を示した。
	長期使用に関する調査（エアゾール）：6ヵ月以上	121例 安全性：副作用発現症例率は1.68%（2/119例）であり、いずれも非重篤な事象であった。 有効性：有効率は100%（114/114例）であった。

市販後臨床試験（製造販売後臨床試験）：

a) フルタイドエアゾールの気管支喘息に対する臨床評価

成人気管支喘息患者 115 名を対象として、フルタイドエアゾール 100 μ g（1 日 2 回）とフルタイドディスクラス 100 μ g（1 日 2 回）の同等性を無作為化二重盲検クロスオーバー比較試験（2 剤 2 期：1 期 4 週間）で同等性を検証した。

その結果、PD₂₀FEV_{1,0} 値（補正幾何平均）はエアゾール群 0.8416mg、ディスクラス群 0.9270mg であり、両群間の同等性が検証された。

副作用はエアゾール群及びディスクラス群でそれぞれ、4.92%（3/61 例）及び 6.56%（4/61 例）であった。いずれの群も重篤な有害事象を発現した症例はなかった。

b) 気管支喘息患者に対するフルタイド追加投与による有効性・安全性の検討¹⁵⁾

徐放性テオフィリン薬、経口/貼付用 β_2 刺激薬又は抗アレルギー薬を長期管理薬として使用しているにもかかわらず軽症持続型（Step2）の症状を示す、吸入ステロイド薬未使用の気管支喘息患者 192 名を対象に、フルタイド（ロタディスク）1 回 100 μ g を 1 日 2 回の上乗せ効果を既存治療薬継続群と比較した。投与期間は 6 週間とし（投与期間 1）、また、フルタイド追加投与群で投与期間 1 の終了時に症状が安定した症例は 6 週間フルタイド単独治療を行った（投与期間 2）。

結果：主要評価項目である投与期間 1 の終了前 7 日間（もしくは中止前 7 日間）の朝のピークフロー（PEF）平均値に対するベースライン（割付け前 7 日間の平均値）からの変化量は、既存治療群で 8.4L/min であったのに対し、フルタイド追加投与群では 48.0L/min の改善が見られ、既存治療群に比し有意（ $p < 0.0001$ ）な改善が認められた。

また、投与期間 1 終了時に症状が安定し、投与期間 2（フルタイド単独治療）へ移行した症例は 48 例であった。これらの症例のうち 70.83%（34/48 例）が投与期間 2 を終了し、投与期間 1 終了時の値とほぼ同様の値を維持しつづけた。

フルタイド追加投与群 98 例のうち、投与期間 1 及び 2 における副作用の発現率はそれぞれ 7.14%（7/98 例）、2.08%（1/48 例）であった。投与期間 1 で報告された副作用は 7 例 9 件（口腔カンジダ症、味覚異常各 2 件、口渇、嘔声、乗物酔い、AST 増加、ALT 増加各 1 件）であった。また、投与期間 2 で認められた副作用は 1 例 1 件（ざ瘡）であり、投与期間 1 における味覚異常・嘔声と同一症例であった。なお、重篤な有害事象は認められなかった。

15) 沖 和彦ほか：アレルギー・免疫．2004；11（7）：960．

2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要

フルタイドエアゾール：長期投与時の安全性を確認するための市販後調査

「1) 使用成績調査・特定使用成績調査（特別調査）・製造販売後臨床試験（市販後臨床試験）」の項参照

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群

ヒドロコルチゾン、プレドニゾン、クロベタゾン、デキサメタゾン、トリアムシノロン、ベタメタゾン、クロベタゾール、ベクロメタゾン、ブデソニド、シクレソニド等のグルココルチコイド

2. 薬理作用

(1) 作用部位・作用機序

肺・気道局所

気道の炎症は気管支喘息の主な病態として認知されている。グルココルチコイドは喘息治療に非常に有効であるが、これはグルココルチコイドの抗炎症作用が大きく関与していると考えられている。本剤はグルココルチコイド受容体の特異的な agonist であり、その強い抗炎症作用が気道局所において発揮されるものと考えられる。


グルココルチコイドの抗炎症作用は強力でしかも広範囲に及ぶため、そのメカニズムは完全には明らかになっていないが、炎症に関与する各種ケミカルメディエーターやサイトカインの産生を遺伝子レベルで抑制すること等が知られている。

(2) 薬効を裏付ける試験成績

1) 抗炎症作用


a) ヒト血管収縮作用

フルチカゾンプロピオン酸エステルは McKenzie らの方法による健康成人皮膚における血管収縮試験（皮膚蒼白度を指標）においてベクロメタゾンプロピオン酸エステルの約 1.9 倍、ベタメタゾン吉草酸エステルの約 2.6 倍、フルオシノロンアセトニドの約 9.5 倍の局所抗炎症作用を示した¹⁶⁾。



b) カラゲニン足蹠浮腫抑制作用（ラット、局所投与）¹⁷⁾

起炎物質カラゲニンにより惹起させたラット足蹠浮腫に対する抑制作用を測定した結果、フルチカゾンプロピオン酸エステルは用量依存的に抑制作用を示し、その強さはフルチカゾンプロピオン酸エステル>ベタメタゾン吉草酸エステル=ベクロメタゾンプロピオン酸エステルの順であった。




* $\mu\text{g/paw}$: 一足に対する用量

n=10

c) 肉芽腫増殖抑制作用（ラット、局所投与）¹⁷⁾

ラットを用いた肉芽腫増殖抑制作用は cotton pellet 法^{*1}による局所投与ではフルチカゾンプロピオン酸エステル>ベタメタゾン吉草酸エステル>ベクロメタゾンプロピオン酸エステルの順であった。また、croton oil 法^{*2}による局所投与ではフルチカゾンプロピオン酸エステル>ベタメタゾン吉草酸エステル=ベクロメタゾンプロピオン酸エステルの順であった。



n=8

n=10

*¹ cotton pellet 法

被験薬物を cotton pellet (綿球) 中に浸み込ませて背部皮下に植え込み、7日後に摘出した。綿球を取り巻いて増殖した肉芽腫を綿球と共に摘出し、60°C、24時間乾燥後の重量を測定し、綿球重量を差し引いた値を肉芽腫重量とした。

*² croton oil 法

背部皮下に窒素ガスを注入し、その囊内に croton oil に被験薬物を溶解して注入した。10日目に肉芽腫を皮下部より剥離し、その重量を測定した。

VI. 薬効薬理に関する項目

d) 血管透過性亢進に対する作用（ラット、皮下投与）¹⁷⁾


ヒスタミンによる血管透過性亢進に対する抑制効果をラット背部皮膚への漏出色素量より測定した結果、フルチカゾンプロピオン酸エステルは用量依存的に抑制効果を示したが、ベクロメタゾンプロピオン酸エステル、ベタメタゾン吉草酸エステルはほとんど抑制作用を示さなかった。

薬剤名	投与量 (mg/kg)	抑制率 (%)					
		0	10	20	30	40	50
フルチカゾン プロピオン酸エステル	0.01			20.8			
	0.1				36.1		
	1					54.3	
ベタメタゾン 吉草酸エステル	0.1		2.4				
	1		-0.6				
	10		1.5				
ベクロメタゾン プロピオン酸エステル	0.1		5.8				
	1			18.0			
	10			9.2			

n=10

e) アジュバント関節炎抑制作用（ラット、皮下投与）¹⁷⁾


結核菌によるアジュバント関節炎の抑制効果を足容積より測定した結果、フルチカゾンプロピオン酸エステルは用量依存的に抑制作用を示し、その強さはベクロメタゾンプロピオン酸エステル、ベタメタゾン吉草酸エステルより強かった。



2) 抗アレルギー作用

a) PCA 反応に対する作用（ラット、皮下投与）¹⁷⁾


マウス IgE 抗卵白アルブミン血清による PCA 反応に対する抗アレルギー作用を皮膚漏出色素量より測定した結果、フルチカゾンプロピオン酸エステルは用量依存的に抑制作用を示し、その強さはフルチカゾンプロピオン酸エステル>ベタメタゾン吉草酸エステル>クロモグリク酸ナトリウムの順であった。ベクロメタゾンプロピオン酸エステルは抑制効果を示さなかった。



n=10

b) 遅延型アレルギーに対する作用（マウス、皮下投与）¹⁷⁾

フルチカゾンプロピオン酸エステルは、マウスにおける picryl chloride ethanol 誘発耳浮腫法による遅延型アレルギー反応に対し、皮下投与で用量依存的に抑制した。抑制作用の強さは、ED₅₀ の比較においてフルチカゾンプロピオン酸エステル=ベクロメタゾンプロピオン酸エステル>ベタメタゾン吉草酸エステルの順であった。クロモグリク酸ナトリウムでは効果を示さなかった。




n=10

VI. 薬効薬理に関する項目

3) アレルギー性喘息に対する作用（ラット、皮下投与）


アレルギー性喘息モデルを用いて呼吸量減少に対する抑制効果を検討した。結果、抗原（卵白アルブミン）投与による喘息惹起後の呼吸量減少をフルチカゾンプロピオン酸エステルは用量依存的に抑制し、その抑制作用はベクロメタゾンプロピオン酸エステルより強力であった。



n=10

4) 胸腺への影響（マウス、経口投与）¹⁷⁾


全身性影響の指標である胸腺退縮作用の強さは、マウスの経口投与において、ベクロメタゾンプロピオン酸エステル>ベタメタゾン吉草酸エステル>フルチカゾンプロピオン酸エステルの順であった。



n=10

5) 作用持続性（ラット、皮下投与）

フルチカゾンプロピオン酸エステルは、カラゲニン投与 4～16 時間前の投与（背部皮下投与）において、カラゲニンによる浮腫に対し強い抑制作用を示し、その持続時間の長さはフルチカゾンプロピオン酸エステル>ベタメタゾン吉草酸エステル=ベクロメタゾンプロピオン酸エステルの順であった。



(3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法

(1) 治療上有効な血中濃度

該当しない


(2) 最高血中濃度到達時間

投与後約 30 分～1 時間^{13) 14)}

(3) 臨床試験で確認された血中濃度


1) 単回投与

健康成人 5 例にフルチカゾンプロピオン酸エステルを 400 μ g 単回吸入投与した結果、投与後 30 分～1 時間で最高血中濃度に達し、その後漸減し、8 時間後にはほぼ検出限界 (0.05ng/mL) 以下であった¹³⁾。



2) 連続投与

健康成人 5 例にフルチカゾンプロピオン酸エステルを 200 μ g/日 (100 μ g \times 2 回)、400 μ g/日 (200 μ g \times 2 回)、800 μ g/日 (400 μ g \times 2 回) 14 日間連続投与した結果、各投与群ともいずれの検査日でも投与後 30 分で最高血中濃度となり、その後速やかに減少した^{13) 14)}。



また、健康成人に対し行った連続吸入投与試験で、薬物動態パラメータを観察した結果を次表に示す。

薬物動態パラメータ（健康成人5名平均）

投与量		Tmax (hr)	Cmax (pg/mL)	AUC _{0→3} (pg·hr/mL)	AUC _{0→8} (pg·hr/mL)
200μg/日 (50μg×2 1日2回)	平均	0.6	122.3	213.7	294.3
	標準偏差	0.2	47.8	99.3	213.3
400μg/日 (100μg×2 1日2回)	平均	0.8	209.9	484.0	922.4
	標準偏差	0.3	33.5	102.9	248.2

注) 本剤の通常投与量は 200μg/日、1日2回である。

(4) 中毒域

該当資料なし

(5) 食事・併用薬の影響

該当資料なし

(6) 母集団（ポピュレーション）解析により判明した薬物体内動態変動要因

該当資料なし

2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

(3) バイオアベイラビリティ

1) 経口投与時（外国人データ）¹⁸⁾

1%以下

経口バイオアベイラビリティ（健康成人男性、4日間）

投与量 (mg/日)	例数	経口バイオアベイラビリティ (%)
0.2	4	検出限界以下
2	7	検出限界以下
20	10	0.91

(検出限界：0.025ng/mL)

2) 吸入投与時（外国人データ）¹⁹⁾

健康成人（男性）12名に 1,000μg を単回吸入投与したときのフルチカゾンプロピオン酸エステルバイオアベイラビリティは、ディスクス製剤で 16.6%、ロタディスク製剤で 11.9%であった。

注) 本剤の承認されている用法・用量は、成人には、フルチカゾンプロピオン酸エステルとして通常 1回 100μg を 1日2回吸入投与であり、1日の最大投与量は成人では 800μg である。

(4) 消失速度定数

該当資料なし

(5) クリアランス

(外国人データ)

健康成人 6 例に 2mg 単回静脈内投与時の全身血漿クリアランス及び腎クリアランスを求めたところ、各々平均 874mL/min、0.1mL/min であった²²⁾。

注) 本剤の承認されている用法・用量は、成人には、フルチカゾンプロピオン酸エステルとして通常 1 回 100 μ g を 1 日 2 回吸入投与であり、1 日の最大投与量は成人では 800 μ g である。

(6) 分布容積

(外国人データ)

健康成人 6 例に 2mg 単回静脈内投与時の分布容積を求めたところ、平均 258L であった²⁰⁾。

注) 本剤の承認されている用法・用量は、成人には、フルチカゾンプロピオン酸エステルとして通常 1 回 100 μ g を 1 日 2 回吸入投与であり、1 日の最大投与量は成人では 800 μ g である。

(7) 血漿蛋白結合率

ヒトの血漿に ³H-フルチカゾンプロピオン酸エステルを 0.1~50ng/mL 濃度範囲で添加した時の *in vitro* における血漿蛋白結合率は 81~95% であった²¹⁾。

3. 吸収

吸収部位：気道粘膜

一般的に吸入剤では吸入後に口腔内、咽頭部位及び肺内に付着し、咽頭部位及び口腔内に付着した薬剤は嚥下され消化管より吸収されることが考えられる。しかし、本剤の経口バイオアベイラビリティは 1%以下と低く (外国人データ)¹⁸⁾、消化管から吸収されるフルチカゾンプロピオン酸エステル未変化体量はほとんど無視できる。また、咽頭粘膜からの吸収の可能性については、鼻腔内投与用フルチカゾンプロピオン酸エステルエアゾール剤と点鼻液を 400 μ g 単回投与した際の血漿中フルチカゾンプロピオン酸エステル濃度が検出限界 (0.05ng/mL) 以下であったこと^{22) 23)} から、咽頭粘膜からの吸収も無視できると考えられる。

以上のことから、本剤吸入後に血中に検出されるフルチカゾンプロピオン酸エステルのほとんどすべてが、肺組織を通過して全身に取り込まれた薬物沈着量の指標となり得るものと考えられる。

吸収率：ヒト該当資料なし

<参考>

雄性ラットに ³H-フルチカゾンプロピオン酸エステルを 10 μ g/kg 皮下投与後の尿及び糞への排泄率から吸収率は 94%以上であった。経口投与後の放射能の吸収率は静脈内投与後の AUC_{0- ∞} との比較より 29~38%であった。気管内投与された ³H-フルチカゾンプロピオン酸エステルの大部分は嚥下され、気管及び肺からの吸収は少ないものと考えられた。吸収率は算出できなかったものの、経口投与時より低いと考えられた^{21) 24) 25)}。

4. 分布

(1) 血液-脳関門通過性

該当資料なし

(2) 血液-胎盤関門通過性

ヒト該当資料なし

<参考>

妊娠 12 日目ラットに ^3H -フルチカゾンプロピオン酸エステルを $100\mu\text{g}/\text{kg}$ 皮下投与した際の全身オートラジオグラムにおいて、投与後 1 時間では胎盤、子宮及び乳腺に母体血液より低い放射能が認められ、胎児及び羊水の放射能は痕跡程度であった。投与後 24 時間では胎盤、子宮及び乳腺の放射能は痕跡程度であり、胎児には放射能は認められなかった。

妊娠 18 日目ラットに ^3H -フルチカゾンプロピオン酸エステルを $10\mu\text{g}/\text{kg}$ 皮下投与した際の母体の各組織内放射能濃度は投与後 1 時間では卵巣及び胎盤は母体血漿の 5.1 倍及び 2.3 倍で、子宮はほぼ同程度、胎児(全身)及び羊水は $1/2$ 及び $1/20$ であった。胎児の各組織内濃度は肝臓が母体血漿の 1.4 倍、その他は同程度又は母体血漿より低かった。投与後 48 時間では羊水が最高濃度の 25%、胎児の血液が 19%、その他の組織はすべて 8%以下に速やかに減少した²⁵⁾。

(3) 乳汁への移行性

ヒト該当資料なし

<参考>

哺育中ラットに ^3H -フルチカゾンプロピオン酸エステルを $10\mu\text{g}/\text{kg}$ 皮下投与した際、乳汁中放射能濃度は投与後 2 時間に最高濃度 4.1ng eq./mL を示し、投与後 1~8 時間まで血漿中放射能濃度の 3.3~7.6 倍で推移し、乳汁移行が認められたが、その後速やかに消失し、24 時間以降血漿中濃度の 38~52%に低下した²⁵⁾。

(4) 髄液への移行性

該当資料なし

(5) その他の組織への移行性

ヒト該当資料なし

<参考>

ラットに ^3H -フルチカゾンプロピオン酸エステル $10\mu\text{g}/\text{kg}$ を気管内投与した結果、食道、胃、咽頭、喉頭及び気管支では投与後 30 分に、気管及び肺では 24 時間後に、その他の組織については 6 時間後に最高濃度を示した。投与後 168 時間までにほとんどの組織において消失した²⁴⁾。

組 織	濃度 (ng eq./g or mL)					n=4
	30 分	6 時間	24 時間	96 時間	168 時間	
血 液	0.03±0.01	0.04±0.01	0.02±0.02	0.01±0.01	N.D.	
咽 頭	1.02±1.16	0.50±0.33	0.02±0.02	0.01±0.00	N.D.	
喉 頭	9.76±6.69	1.06±0.70	0.20±0.35	N.D.	N.D.	
気 管	4.79±9.22	0.52±0.49	7.29±14.25	N.D.	N.D.	
気管支	0.23±N.A.	0.22±0.17	N.D.	N.D.	N.D.	
肺*	0.79	1.51	15.38	0.08	N.D.	
食 道	238.86±186.66	21.05±10.97	0.13±0.09	N.D.	N.D.	
胃	117.59±45.38	57.35±25.79	1.01±0.76	0.12±0.06	0.05±0.01	
脾 臓	0.04±0.02	0.16±0.08	0.03±0.04	0.01±0.00	0.01±0.00	
腎 臓	0.12±0.06	0.37±0.09	0.13±0.04	0.05±0.01	0.02±0.00	

(肺*: 社内集計) 平均値±SD

N.D.: 未検出

N.A.: 標準偏差算出せず


5. 代謝

(1) 代謝部位及び代謝経路

代謝部位：肝臓

(外国人データ)

健康成人にフルチカゾンプロピオン酸エステルを静脈内及び経口投与後の血漿中には代謝物として 17β-カルボン酸体が、尿中には 17β-カルボン酸体及びそのグルクロン酸抱合体が認められた。また、経口投与後の糞中には未吸収による未変化体及び 17β-カルボン酸体が認められ、ヒトにおける主代謝物は 17β-カルボン酸体であった。



(2) 代謝に関与する酵素 (CYP450 等) の分子種

フルチカゾンプロピオン酸エステルは CYP3A4 によって代謝を受ける²⁶⁾。

(3) 初回通過効果の有無及びその割合

(外国人データ)

健康成人に経口投与したところ、広汎な初回通過効果をうけることが示唆された。

初回通過効果の割合：該当資料なし

(4) 代謝物の活性の有無及び比率

該当資料なし

<参考>

ラットを用いた検討で、主要代謝物である 17β-カルボン酸体は、不活性であった。

主要代謝物（17β-カルボン酸体）の効力（ラット、皮下投与）

試験項目	投与量 (mg/kg)	結果
カラゲニン足蹠浮腫抑制作用	0.01、0.1、1	作用なし
croton oil 耳浮腫抑制作用	0.01、0.1、1	作用なし
胸腺退縮作用	0.1、0.3、1	作用なし

n=8

(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ

該当しない

6. 排泄

(1) 排泄部位及び経路

(外国人データ)

健康成人 2 例に ³H-フルチカゾンプロピオン酸エステル 1mg を空腹時単回経口投与時の放射能の尿中への排泄は投与量の 5%以下であり、糞中への排泄は 97%及び 87% (0~168 時間) を占め、その大半は投与後 48 時間までに排泄された。

注) 本剤の承認されている用法・用量は、成人には、フルチカゾンプロピオン酸エステルとして通常 1 回 100μg を 1 日 2 回吸入投与であり、1 日の最大投与量は成人では 800μg である。

(2) 排泄率

「(1) 排泄部位及び経路」の項参照

(3) 排泄速度

「(1) 排泄部位及び経路」の項参照

7. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

8. 透析等による除去率

該当資料なし

Ⅷ. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由

該当しない

2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む）

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

- (1) 有効な抗菌剤の存在しない感染症、深在性真菌症の患者 [症状を増悪するおそれがある]

（解説）

(1) 感染症患者に対する投与

ステロイド剤の強力な免疫抑制作用、抗炎症作用は生体の感染防御機能を低下させ、日和見感染の誘発につながるとされている。また、ステロイド剤の抗炎症作用による解熱等見かけ上の症状改善のため、感染症の増悪が見逃されるおそれがある。本剤の使用上の注意では、感染症の種類により「禁忌」・「原則禁忌」・「慎重投与」に区別し、本剤投与に関する注意を記載した。感染症の種類別の設定根拠等に関しては、下表「感染症と本剤の投与」を参照すること。

感染症と本剤の投与

項目	感染症の種類	注意事項	設定根拠
禁忌	有効な抗菌剤の存在しない感染症* ¹ 深在性真菌症* ²	投与しないこと。	症状が増悪し致命的な転帰をたどる可能性がある。
原則禁忌	結核性疾患	投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には、抗結核剤を投与するなど適切な処置を行い、患者の状態を十分に注意し慎重に投与すること。	局所のステロイドの作用により症状が増悪する可能性がある。
慎重投与	感染症	慎重に投与すること。感染症状の発現に注意し、必要に応じて適切な処置を行うこと。	本剤は全身への影響が少ないことが予測されるが、ステロイド作用により症状が増悪する可能性がある。

*1 有効な抗菌剤の存在しない感染症

バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）感染症や多剤耐性緑膿菌（MDRP）感染症などの多種の抗菌剤に耐性を示す感染症など。

*2 深在性真菌症

最も重篤な真菌症であり、一部の比較的良性的な病型を除けば、いったん発症すると致命的な転帰をたどることが少なくない。クリプトコッカス髄膜炎、肺アスペルギルス症、カンジダ血症などがある。

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

- (2) 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

（解説）

(2) 医薬品全般に対する一般的な注意事項である。

本剤の成分：フルチカゾンプロピオン酸エステル、乳糖水和物（ロタディスク、ディスクス）（フルチカゾンプロピオン酸エステルを含む他の製剤としては、フルナーゼ点鼻薬（鼻過敏症治療剤）、アドエア（喘息治療配合剤）がある。）

【原則禁忌】（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）
結核性疾患の患者〔症状を増悪するおそれがある〕

（解説）

「2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む） 【禁忌】(1)」の項参照
これらの患者に投与した場合には、局所のステロイドの作用により症状が増悪する可能性がある。

3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由

該当しない

4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由

「V. 治療に関する項目 2. 用法及び用量」の項参照

5. 慎重投与内容とその理由

慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 感染症の患者〔症状を増悪するおそれがある〕
- (2) 糖尿病の患者〔症状を増悪するおそれがある〕

（解説）

- (1) 「2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む） 【禁忌】(1)」の項参照
- (1) (2) 本剤は全身への影響が少ないことが予測されるが、全身的なステロイドの作用により症状が増悪する可能性がある。

6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法

重要な基本的注意

- (1) 急性の発作に対しては、本剤を使用しないよう患者を指導すること。
また、本剤は喘息症状が発現しないように維持する目的で継続的に使用する薬剤なので、症状のないときでも毎日規則正しく使用するよう患者を指導する。
〔本剤は発現した発作を速やかに軽減する薬剤ではないので、発作発現時に使用する短時間作動型吸入 β_2 刺激薬（例えば吸入用サルブタモール硫酸塩）等の他の適切な薬剤を処方すること。〕

（解説）

本剤は急性発作時に投与しても速効性の効果は期待できない。逆に、症状のないときでも毎日規則正しく使用することにより、喘息の基本的な病態である慢性の気道炎症を改善し、持続性の喘息症状を良好な状態に維持する。また、急性の発作に対しては、短時間作動型吸入 β_2 刺激薬（吸入用サルブタモール硫酸塩）等の他の適切な薬剤を処方すること。

重要な基本的注意

- (2) 本剤の投与開始前には、患者の喘息症状を比較的安定な状態にしておくこと。
特に、喘息発作重積状態又は喘息の急激な悪化状態のときには原則として本剤は使用しないこと。

（解説）

本剤はすでに起きている発作を速やかに軽減させる薬剤ではないので、喘息症状が比較的良好にコントロー

Ⅷ. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

ルされ、本剤の吸入が確実に行われる状態で使用すること。特に、急性増悪期の患者には、短時間作動型吸入 β_2 刺激薬、全身性ステロイド剤、エピネフリン皮下注射の投与や、酸素吸入等の速効性が期待される処置を行い、喘息の悪化状態を改善した上で本剤を使用すること。

重要な基本的注意

- (3) 気管支粘液の分泌が著しい患者では、本剤の肺内での作用を確実にするため本剤の吸入に先立って、分泌がある程度減少するまで他剤を使用するとよい。

（解説）

本剤は肺へ到達することにより臨床効果を示す。気管支粘液の分泌の著しい患者では本剤の肺内への到達が困難となり、臨床効果が不十分となる可能性がある。これらの患者では、気道粘液調整剤や抗コリン薬等の薬剤を使用し、分泌がある程度減少してから本剤を使用すること。

重要な基本的注意

- (4) 本剤の投与期間中に発現する**急性の発作**に対しては、**発作発現時に短時間作動型吸入 β_2 刺激薬**等の他の適切な薬剤を使用するよう患者を指導すること。
また、その薬剤の**使用量が増加**したり、**効果が十分でなくなってきた**と感じられたら、喘息の管理が十分でないことが考えられるので、**可及的速やかに医療機関を受診し治療を求め**るように患者を指導すること。
このような状態は喘息の管理が不十分になっていることを示唆し、突然患者の生命が脅かされる可能性があるため、**本剤の増量**やあるいは**気管支拡張剤・全身性ステロイド剤**を短期間併用し、症状の軽減に合わせて併用薬剤を徐々に減量すること。

（解説）

本剤はすでに起きている発作を速やかに軽減させる薬剤ではないので、長期管理薬である本剤使用下においても発現する「**急性の発作に対しては、短時間作動型吸入 β_2 刺激薬（吸入用サルブタモール硫酸塩）等の発作治療薬を使用する**」ように患者へ注意を与えること。しかし、発作治療薬の使用量が増加したり、患者が発作治療薬の効果を不十分と感じるようになった時は、喘息の基本的な病態である気道の炎症が十分に改善されていないことが予測される。したがって、「**短時間作動型吸入 β_2 刺激薬の使用量が増加したり、効果が十分でなくなってきたと感じられたら、可及的速やかに医療機関を受診する**」ように患者へ注意を与えること。また、この際に適切な処置が行われなかった場合、喘息が重症化し生命を脅かす危険性があるので、本剤の増量や**気管支拡張剤、全身性ステロイド剤等**の投与を短期間行い、喘息の悪化状態を改善させる必要がある。症状が改善されたら、症状や肺機能を観察しながら、徐々に併用薬を減量すること。

重要な基本的注意

- (5) 感染を伴う喘息症状の増悪がみられた場合には、ステロイド療法の強化と感染症の治療を考慮すること。

（解説）

感染を伴う喘息症状の増悪がみられた場合には、ステロイド療法の強化（本剤のより高用量製剤への変更等）と感染症の治療（**抗生剤の投与等**）を考慮すること。

重要な基本的注意

- (6) 本剤の投与を**突然中止**すると**喘息の急激な悪化**を起こすことがあるので、投与を中止する場合には**患者の喘息症状を観察しながら徐々に減量**していくこと。

（解説）

本剤を突然中止した場合には、気道炎症の再燃により喘息の状態が急激に悪化することがある。本剤を中止する場合には、患者の喘息症状や肺機能について観察しながら、徐々に減量すること。

重要な基本的注意

(7) 全身性ステロイド剤と比較し可能性は低いが、吸入ステロイド剤の投与により**全身性の作用**（クッシング症候群、クッシング様症状、副腎皮質機能抑制、小児の成長遅延、骨密度の低下、白内障、緑内障、中心性漿液性網脈絡膜症を含む）が発現する可能性があるため、吸入ステロイド剤の投与量は患者毎に喘息をコントロールできる**最少用量**に調節すること。特に**長期間、大量投与の場合には定期的に検査**を行い、全身性の作用が認められた場合には患者の**喘息症状を観察しながら徐々に減量**するなど適切な処置を行うこと。

（解説）

一般に、ステロイド剤の作用として、クッシング症候群、副腎皮質機能抑制、小児の成長遅延、骨密度の低下、白内障、緑内障、中心性漿液性網脈絡膜症等が発現することが知られているが、吸入ステロイド剤の投与量は全身性ステロイド剤に比べ投与量のはるかに少量であり、また特に本剤は、初回通過効果により速やかに代謝されて不活性化されるためバイオアベイラビリティが低いことなどから、全身性の作用が発現する可能性は低いと考えられる。しかし、特に、大量の吸入ステロイド剤を長期間投与する場合に全身性の作用が発現する可能性を示唆する報告がある。また、中心性漿液性網脈絡膜症は、公表文献のデータを検討した結果、局所副腎皮質ステロイド投与との因果関係が否定できないと判断した。したがって、吸入ステロイド剤を長期間投与する場合、喘息症状をコントロールできる必要最少量に調節すること。特に大量の吸入ステロイド剤を長期間投与する場合、コルチゾール値測定等の適切な検査を定期的に行い、全身性の作用がみられた場合には、患者の喘息症状を観察しながら徐々に減量するなど適切な処置を行うこと。

重要な基本的注意

(8) **全身性ステロイド剤の減量**は本剤の吸入開始後症状の安定をみて徐々にを行う。減量にあたっては一般のステロイド剤の減量法に準ずる。

（解説）

本剤の投与にあたり全身性ステロイド剤を急激に減量、中止すると、喘息症状の再燃を引き起こす場合があるので、全身性ステロイド剤は症状や肺機能を観察しながら、徐々に減量すること。

重要な基本的注意

(9) **長期又は大量の全身性ステロイド療法**を受けている患者では**副腎皮質機能不全**が考えられるので、全身性ステロイド剤の減量中並びに離脱後も**副腎皮質機能検査**を行い、外傷、手術、重症感染症等の侵襲には十分に注意を払うこと。また、必要があれば一時的に全身性ステロイド剤の増量を行うこと。

（解説）

長期又は大量の全身性ステロイド療法を受けている患者では、**副腎皮質機能が抑制されていることが予測される**。このような患者において全身性ステロイド剤の減量・離脱を急激に行うと、必要なコルチゾールが不足し重篤な転帰をたどる危険性がある。特に外傷、手術、重症感染症等のストレスが加わると、体内のコルチゾールの需要が急増するため、そのような状況下では特に注意が必要である。したがって、**長期又は大量の全身性ステロイド療法**を受けている患者において全身性ステロイド剤の減量・離脱を行う際には、減量中ならびに離脱後の副腎皮質機能検査を行い、特に外傷、手術、重症感染症等の侵襲時には注意を払う必要がある。また、急性副腎不全の傾向がみられた場合には、一時的に全身性ステロイド剤の増量を行うなど適切な処置を行うこと。

重要な基本的注意

(10) 本剤を含む吸入ステロイド剤投与後に、潜在していた基礎疾患である好酸球性多発血管炎性肉芽腫症にみられる好酸球増多症がまれにあらわれることがある。この症状は通常、**全身性ステロイド剤の減量並びに離脱**に伴って発現しており、本剤との直接的な因果関係は確立されていない。本剤の投与期間中は、好酸球数の推移や、他の好酸球性多発血管炎性肉芽腫症症状（しびれ、発熱、関節痛、肺の浸潤等の血管炎症状等）に注意すること。

（解説）

吸入ステロイドの投与中に、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症*で認められる好酸球増多症の臨床症状が発現したという症例が報告されている。本事象は通常、吸入ステロイド剤導入に伴った経口ステロイド剤の減量や離脱後に発現しており、これら好酸球性多発血管炎性肉芽腫症と吸入ステロイド剤との因果関係は確立していない。本剤の投与期間中は、好酸球数の推移や、他の好酸球性多発血管炎性肉芽腫症症状に注意すること。

***好酸球性多発血管炎性肉芽腫症**

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（Churg-Strauss 症候群、アレルギー性肉芽腫性血管炎）は、気管支喘息の既往、末梢血と組織中の好酸球の増加、壊死性血管炎に基づくと考えられる多臓器症状を特徴とする疾患。なお、Chapel Hill Consensus Conference 2012 における変更、厚生労働省医薬・生活衛生局通知等に伴い、本剤添付文書「使用上の注意」における疾病の呼称を好酸球性多発血管炎性肉芽腫症とした。

重要な基本的注意

(11) **全身性ステロイド剤の減量並びに離脱**に伴って、鼻炎、湿疹、蕁麻疹、眩暈、動悸、倦怠感、顔のほてり、結膜炎等の症状が発現・増悪することがある（このような症状があらわれた場合には適切な処置を行うこと）。

（解説）

全身性ステロイド剤の減量あるいは離脱により、鼻炎、湿疹、蕁麻疹、眩暈、動悸、倦怠感、顔のほてり、結膜炎等の症状が発現あるいは増悪することがある。

このような症状があらわれた場合には、発現あるいは増悪した症状に応じて、適切な治療を行うこと。

重要な基本的注意

(12) リトナビルとの併用により全身性のステロイド作用（クッシング症候群、副腎皮質機能抑制等）が発現したとの報告があるので、併用する場合には注意すること（「相互作用」の項参照）。

（解説）

「7. 相互作用」の項参照

7. 相互作用

本剤は、主として肝チトクローム P-450 3A4（CYP3A4）で代謝される。

(1) 併用禁忌とその理由

該当しない

(2) 併用注意とその理由

併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
CYP3A4 阻害作用を有する薬剤 リトナビル等	副腎皮質ステロイド剤を全身投与した場合と同様の症状があらわれる可能性がある。 特に、リトナビルとフルチカゾンプロピオン酸エステル製剤の併用により、クッシング症候群、副腎皮質機能抑制等が報告されているので、リトナビルとの併用は治療上の有益性がこれらの症状発現の危険性を上回ると判断される場合に限ること。	CYP3A4 による代謝が阻害されることにより、本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。 リトナビルは強い CYP3A4 阻害作用を有し、リトナビルとフルチカゾンプロピオン酸エステル製剤を併用した臨床薬理試験において、血中フルチカゾンプロピオン酸エステル濃度の大幅な上昇、また血中コルチゾール値の著しい低下が認められている。

（解説）

本剤は、主として肝チトクローム P-450 分子種 3A4（CYP3A4）で代謝される²⁶⁾。

リトナビルなどの CYP3A4 阻害作用を有する薬剤との併用時において、フルチカゾンプロピオン酸エステル（FP）の血中濃度が上昇する可能性が考えられたため、リトナビルを含む CYP3A4 阻害作用を有する薬剤と FP 点鼻液との臨床薬理（薬物相互作用）試験が行われた。その結果、リトナビルとの併用時において血中 FP 濃度の大幅な上昇、また血中コルチゾール値の著しい低下がみられた。また、海外においてリトナビルと FP 製剤の併用時に全身性のステロイド作用が発現したとの報告がある^{27) ~30)}。

したがって、本剤とリトナビルの併用は、治療上の有益性が、全身性のステロイド作用が発現する危険性を上回ると判断された場合にのみ投与する。また、リトナビルと本剤を併用する際には、全身性のステロイド作用の発現に注意しながら、患者の状態を十分に観察すること。

8. 副作用

(1) 副作用の概要

成人 5736 例、小児 1637 例（総症例 7373 例）中、成人 252 例（4.4%）、小児 43 例（2.6%）に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。

成人：承認時までの調査症例 457 例中、31 例（6.8%）に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。その主なものは咽喉頭症状（不快感、むせ、疼痛、刺激感、異和感）10 例（2.2%）、口腔内カンジダ症 3 例（0.7%）、嘔声 3 例（0.7%）、口内乾燥 3 例（0.7%）であった（承認時）。

市販後における調査症例 5279 例中、221 例（4.2%）に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。その主なものは口腔及び咽喉頭症状（不快感、むせ、疼痛、刺激感、異和感）63 例（1.2%）、嘔声 56 例（1.1%）、悪心 13 例（0.2%）であった（再審査終了時）。

小児：承認時までの調査症例 112 例中、29 例（25.9%）に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。その主なものは胸痛 2 例（1.8%）、口腔内カンジダ症 1 例（0.9%）、嘔声 1 例（0.9%）であった（承認時）。

市販後における調査症例 1525 例中、14 例（0.9%）に臨床検査値異常を含む副作用が報告された。その主なものは血中コルチゾール減少 2 例（0.1%）、口腔カンジダ症、副鼻腔炎、むせ、嘔声等、各 1 例（0.1%）であった（再審査終了時）。

Ⅷ. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

(2) 重大な副作用と初期症状

重大な副作用

アナフィラキシー：アナフィラキシー（呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等）があらわれることがある（頻度不明^{注1)}）ので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。

注1) 自発報告又は海外のみで認められている副作用については頻度不明とした。

(解説)

国内において、フルチカゾンプロピオン酸エステル製剤によるアナフィラキシー及び、アナフィラキシーと類似の発現経過を示した症例の報告がある。不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、耳鳴、発汗、蕁麻疹等の前駆症状がみられた場合には投与を中止し適切な処置を行うこと。

(3) その他の副作用

その他の副作用

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

	0.5%～2%未満	0.5%未満	頻度不明 ^{注1)}
過敏症 ^{注2)}		発疹、蕁麻疹、顔面浮腫	
口腔並びに呼吸器	口腔及び咽喉頭症状（不快感、むせ、疼痛、刺激感、異和感）、嘔声	口腔及び呼吸器カンジダ症、味覚異常、咳、口内乾燥、感染症	
消化器		悪心、腹痛、食道カンジダ症	
精神神経系			睡眠障害、不安、易刺激性、攻撃性
その他		鼻炎、胸痛、浮腫、気管支攣縮 ^{注3)} 、高血糖	皮膚挫傷（皮下出血等）

注1) 自発報告又は海外のみで認められている副作用については頻度不明とした。

注2) このような場合には投与を中止すること。

注3) 短時間作用発現型気管支拡張剤を投与するなどの適切な処置を行うこと。

(4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

1) 成人における副作用（臨床検査値異常を含む）

副作用発現状況一覧：フルタイド（成人）

時 期	承認時までの状況	市販後調査			
		使用成績調査	長期特別調査	市販後臨床試験	累計
調査施設数	130	469	660	80	1,209
調査症例数	457	3,107	2,013	159	5,279
副作用等の発現症例数	31	120	87	14	221
副作用等の発現件数	43	157	117	19	293
副作用等の発現症例率 (%)	6.78%	3.86%	4.32%	8.81%	4.19%

副作用等の種類	副作用等の種類別発現症例（件数）率 (%)				
	承認時までの状況	市販後調査			
		使用成績調査	長期特別調査	市販後臨床試験	累計
血液およびリンパ系障害		2 (0.06)	3 (0.15)		5 (0.09)
貧血		1 (0.03)	2 (0.10)		3 (0.06)
白血球増加症			1 (0.05)		1 (0.02)
単球増加症		1 (0.03)			1 (0.02)
耳および迷路障害				1 (0.63)	1 (0.02)
乗物酔い				1 (0.63)	1 (0.02)

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

副作用等の種類	副作用等の種類別発現症例（件数）率（％）				
	承認時までの 状況	市販後調査			
		使用成績調査	長期特別調査	市販後臨床試験	累計
内分泌障害	1 (0.22)		1 (0.05)		1 (0.02)
副腎機能不全	1 (0.22)				
甲状腺機能亢進症			1 (0.05)		1 (0.02)
眼障害		1 (0.03)			1 (0.02)
眼の異常感		1 (0.03)			1 (0.02)
胃腸障害	5 (1.09)	22 (0.70)	15 (0.75)	2 (1.26)	39 (0.74)
腹部膨満		2 (0.06)			2 (0.04)
上腹部痛	1 (0.22)				
アフタ性口内炎			1 (0.05)		1 (0.02)
口内乾燥	3 (0.66)	1 (0.03)	2 (0.10)		3 (0.06)
消化不良		1 (0.03)	1 (0.05)		2 (0.04)
胃食道逆流性疾患			1 (0.05)		1 (0.02)
胃十二指腸潰瘍			1 (0.05)		1 (0.02)
歯肉炎			1 (0.05)		1 (0.02)
舌炎		1 (0.03)	1 (0.05)		2 (0.04)
悪心	1 (0.22)	10 (0.32)	2 (0.10)	1 (0.63)	13 (0.25)
食道炎		1 (0.03)			1 (0.02)
口腔内不快感		2 (0.06)	3 (0.15)		5 (0.09)
膵臓障害		1 (0.03)			1 (0.02)
口内炎		4 (0.13)	4 (0.20)	2 (1.26)	10 (0.19)
舌障害		1 (0.03)			1 (0.02)
嘔吐		1 (0.03)			1 (0.02)
口の感覚鈍麻		1 (0.03)	1 (0.05)		2 (0.04)
全身障害および投与局所様態	1 (0.22)	6 (0.19)	4 (0.20)	2 (1.26)	12 (0.23)
胸部不快感				1 (0.63)	1 (0.02)
胸痛	1 (0.22)	2 (0.06)			2 (0.04)
不快感			1 (0.05)		1 (0.02)
異常感		2 (0.06)			2 (0.04)
倦怠感		1 (0.03)	1 (0.05)		2 (0.04)
口渇		1 (0.03)		1 (0.63)	2 (0.04)
異物感			2 (0.10)		2 (0.04)
肝胆道系障害		1 (0.03)	2 (0.10)		3 (0.06)
肝機能異常		1 (0.03)	1 (0.05)		2 (0.04)
肝細胞障害			1 (0.05)		1 (0.02)
感染症および寄生虫症	4 (0.88)	9 (0.29)	17 (0.84)	2 (1.26)	28 (0.53)
気管支炎			2 (0.10)		2 (0.04)
急性気管支炎		1 (0.03)	2 (0.10)		3 (0.06)
毛包炎			1 (0.05)		1 (0.02)
胃腸炎		1 (0.03)			1 (0.02)
食道カンジダ症		1 (0.03)			1 (0.02)
口腔カンジダ症	3 (0.66)	2 (0.06)	9 (0.45)	2 (1.26)	13 (0.25)
咽頭炎			1 (0.05)		1 (0.02)
肺炎		1 (0.03)	3 (0.15)		4 (0.08)
鼻炎	1 (0.22)		1 (0.05)		1 (0.02)
白癬			1 (0.05)		1 (0.02)
咽頭カンジダ症		1 (0.03)	1 (0.05)		2 (0.04)
気管支感染		1 (0.03)			1 (0.02)
細菌性肺炎			1 (0.05)		1 (0.02)
気道感染		1 (0.03)			1 (0.02)
臨床検査	13 (2.84)	5 (0.16)	2 (0.10)	2 (1.26)	9 (0.17)
アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2 (0.44)	1 (0.03)		1 (0.63)	2 (0.04)
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3 (0.66)			1 (0.63)	1 (0.02)
血中ビリルビン増加	1 (0.22)				
血中コルチゾール減少	2 (0.44)				
血中ブドウ糖増加	1 (0.22)				
血中カリウム増加		1 (0.03)		1 (0.63)	2 (0.04)

Ⅷ. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

副作用等の種類	副作用等の種類別発現症例（件数）率（％）				
	承認時までの 状況	市販後調査			
		使用成績調査	長期特別調査	市販後臨床試験	累計
尿中ブドウ糖陽性	1 (0.22)				
好中球数増加	1 (0.22)		2 (0.10)		2 (0.04)
総蛋白減少	1 (0.22)				
赤血球数減少	1 (0.22)				
白血球数増加	1 (0.22)	1 (0.03)	2 (0.10)		3 (0.06)
血小板数増加			1 (0.05)		1 (0.02)
真菌喀痰検査陽性	2 (0.44)				
血中アルカリホスファターゼ増加	2 (0.44)	1 (0.03)			1 (0.02)
肺機能検査値低下		1 (0.03)			1 (0.02)
代謝および栄養障害		3 (0.10)	1 (0.05)		4 (0.08)
糖尿病		1 (0.03)			1 (0.02)
高カリウム血症			1 (0.05)		1 (0.02)
食欲減退		1 (0.03)			1 (0.02)
高脂血症		1 (0.03)			1 (0.02)
筋骨格系および結合組織障害		1 (0.03)	1 (0.05)		2 (0.04)
筋緊張			1 (0.05)		1 (0.02)
筋骨格不快感		1 (0.03)			1 (0.02)
神経系障害		9 (0.29)	4 (0.20)	2 (1.26)	15 (0.28)
注意力障害			1 (0.05)		1 (0.02)
浮動性めまい			1 (0.05)		1 (0.02)
味覚異常		1 (0.03)	2 (0.10)	2 (1.26)	5 (0.09)
頭痛		5 (0.16)			5 (0.09)
口の錯感覚		3 (0.10)			3 (0.06)
腎および尿路障害		1 (0.03)	1 (0.05)		2 (0.04)
血尿		1 (0.03)			1 (0.02)
蛋白尿			1 (0.05)		1 (0.02)
呼吸器、胸郭および縦隔障害	12 (2.63)	66 (2.12)	46 (2.29)	4 (2.52)	116 (2.20)
喘息		1 (0.03)			1 (0.02)
息詰まり感	2 (0.44)	7 (0.23)	2 (0.10)		9 (0.17)
咳嗽	1 (0.22)	6 (0.19)	3 (0.15)		9 (0.17)
咽喉乾燥		1 (0.03)	1 (0.05)		2 (0.04)
嗄声	3 (0.66)	27 (0.87)	26 (1.29)	4 (2.52)	57 (1.08)
咽喉頭疼痛	2 (0.44)	14 (0.45)	2 (0.10)		16 (0.30)
咽頭不快感	5 (1.09)	17 (0.55)	11 (0.55)		28 (0.53)
気胸		1 (0.03)			1 (0.02)
湿性咳嗽		2 (0.06)	1 (0.05)		3 (0.06)
くしゃみ		1 (0.03)			1 (0.02)
咽喉刺激感	1 (0.22)	3 (0.10)	3 (0.15)		6 (0.11)
上気道の炎症		1 (0.03)	3 (0.15)		4 (0.08)
痰貯留		1 (0.03)	1 (0.05)		2 (0.04)
皮膚および皮下組織障害		10 (0.32)	2 (0.10)	2 (1.26)	14 (0.27)
ざ瘡		1 (0.03)		1 (0.63)	2 (0.04)
薬疹		1 (0.03)			1 (0.02)
発疹		2 (0.06)	1 (0.05)	1 (0.63)	4 (0.08)
顔面浮腫		1 (0.03)			1 (0.02)
そう痒症		3 (0.10)			3 (0.06)
丘疹		1 (0.03)			1 (0.02)
蕁麻疹		2 (0.06)	1 (0.05)		3 (0.06)

[MedDRA ver.7.1 にて集計]

2) 小児における副作用（臨床検査値異常を含む）

副作用発現状況一覧：フルタイド（小児）

時 期	承認時までの状況	市販後調査等		
		使用成績調査	特定使用成績調査	累計
調査施設数	21	118	75	177
調査症例数	112	780	745	1,525
副作用等の発現症例数	29	7	7	14
副作用等の発現件数	45	7	9	16
副作用等の発現症例率（%）	25.89%	0.90%	0.94%	0.92%

副作用等の種類	副作用等の種類別発現症例（件数）率（%）			
	承認時までの状況	市販後調査等		
		使用成績調査	特定使用成績調査	累計
眼障害	1 (0.89)			
結膜炎	1 (0.89)			
胃腸障害	1 (0.89)	1 (0.13)		1 (0.07)
悪心	1 (0.89)			
口腔内不快感		1 (0.13)		1 (0.07)
全身障害および投与局所様態	2 (1.79)	1 (0.13)		1 (0.07)
胸部不快感	1 (0.89)			
胸痛	1 (0.89)			
発熱		1 (0.13)		1 (0.07)
感染症および寄生虫症	2 (1.79)		2 (0.27)	2 (0.13)
帯状疱疹	1 (0.89)			
口腔カンジダ症	1 (0.89)		2 (0.27)	2 (0.13)
副鼻腔炎			1 (0.13)	1 (0.07)
傷害、中毒および処置合併症	1 (0.89)			
鎖骨骨折	1 (0.89)			
臨床検査	25 (22.32)	1 (0.13)	3 (0.40)	4 (0.26)
アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2 (1.79)	1 (0.13)		1 (0.07)
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2 (1.79)			
血中コルチゾール減少	11 (9.82)		2 (0.27)	2 (0.13)
血中ブドウ糖減少	1 (0.89)			
血中ブドウ糖増加	2 (1.79)			
血中カリウム増加	1 (0.89)			
血中ナトリウム減少	1 (0.89)			
好中球数増加			1 (0.13)	1 (0.07)
尿中血陽性	1 (0.89)			
血小板数減少	1 (0.89)			
体重増加	1 (0.89)			
尿中ビリルビン増加	1 (0.89)			
尿中白血球エステラーゼ陽性	1 (0.89)			
尿中蛋白陽性	4 (3.57)			
尿中ケトン体陽性	1 (0.89)			
グルココルチコイド減少	5 (4.46)			
神経系障害		2 (0.26)	1 (0.13)	3 (0.20)
浮動性めまい		1 (0.13)		1 (0.07)
頭痛		1 (0.13)		1 (0.07)
意識消失			1 (0.13)	1 (0.07)
腎および尿路障害			1 (0.13)	1 (0.07)
腎障害			1 (0.13)	1 (0.07)
呼吸器、胸郭および縦隔障害	1 (0.89)	1 (0.13)	1 (0.13)	2 (0.13)
息詰まり感			1 (0.13)	1 (0.07)

Ⅷ. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

発声傷害	1 (0.89)	1 (0.13)		1 (0.07)
皮膚および皮下組織障害	1 (0.89)	1 (0.13)		1 (0.07)
アトピー性皮膚炎		1 (0.13)		1 (0.07)
紅斑	1 (0.89)			
皮膚剥脱	1 (0.89)			

[MedDRA ver.8.1にて集計]

(5) 基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度

成人を対象とした使用成績調査において、安全性に影響を及ぼすと考えられる要因について検討した結果、副作用発現症例率が高かったのは、「高齢者」群、「合併症を有する患者」群、「併用薬剤が無い患者」群、「平均1日投与量が高い患者」群であったが、いずれの場合も副作用の種類に特定の傾向はみられず、特段の問題はないと考えられた。

なお、検定は未実施であるが、「総投与量別」、「総投与日数別」の副作用発現状況について検討を行ったところ、副作用発現症例率及び副作用の種類などに特定の傾向はみられなかった。

患者背景別副作用発現状況一覧表

検討要因		調査症例数	副作用発現症例数	副作用発現件数	副作用発現症例率 (%)	χ ² 検定
安全性解析対象		3,164	120	157	3.79	—
性別	男	1,422	46	60	3.23	NS
	女	1,742	74	97	4.25	
年齢	<15歳 (小児)	57	0	0	0.00	p=0.0309
	15≦～<65歳 (成人)	2,306	79	105	3.43	
	65歳≦ (高齢者)	801	41	52	5.12	
入院外来区分	入院	90	5	6	5.56	NS
	外来	2,907	107	141	3.68	
	入院・外来	167	8	10	4.79	
使用理由	気管支喘息	3,141	118	155	3.76	NS
	その他	23	2	2	8.70	
本剤投与前の喘息重症度	軽症	1,112	42	57	3.78	NS
	中等症	1,753	63	79	3.59	
	重症	298	15	21	5.03	
	不明	1	0	0	0.00	
全身性ステロイド使用歴	無	1,726	64	85	3.71	NS
	時に使用	1,238	47	60	3.80	
	依存性あり	196	8	11	4.08	
	不明	4	1	1	25.00	
合併症	無	2,187	72	88	3.29	p=0.0267
	有	975	48	69	4.92	
	不明	2	0	0	0.00	
併用薬剤	無	152	11	13	7.24	p=0.0228
	有	3,011	109	144	3.62	
	不明	1	0	0	0.00	
併用療法	無	3,101	118	155	3.81	NS
	有	62	1	1	1.61	
	不明	1	1	1	100.00	

検討要因		調査 症例数	副作用発現 症例数	副作用 発現件数	副作用発現 症例率 (%)	χ^2 検定
本剤の 総投与量 (累積)	$\leq 1,400\mu\text{g}$	3,163	40	—	1.26	検定せず (副作用発 現症例数は 初発の副作 用が発現す るまでの投 与量)
	$1,400 < \sim \leq 2,800\mu\text{g}$	3,108	10	—	0.32	
	$2,800 < \sim \leq 4,200\mu\text{g}$	3,022	10	—	0.33	
	$4,200 < \sim \leq 5,600\mu\text{g}$	2,898	9	—	0.31	
	$5,600 < \sim \leq 8,400\mu\text{g}$	2,761	13	—	0.47	
	$8,400 < \sim \leq 16,800\mu\text{g}$	2,131	26	—	1.22	
	$16,800\mu\text{g} <$	787	8	—	1.02	
	不明 ¹⁾	1	1	—	100.00	
不明 ²⁾	0	3	—	—		
本剤の 総投与日数 (累積)	≤ 7 日	3,163	51	—	1.61	検定せず (副作用発 現症例数は 初発の副作 用が発現す るまでの投 与日数)
	$7 < \sim \leq 14$ 日	3,075	16	—	0.52	
	$14 < \sim \leq 21$ 日	2,930	19	—	0.65	
	$21 < \sim \leq 28$ 日	2,779	12	—	0.43	
	$28 < \sim \leq 42$ 日	2,536	11	—	0.43	
	$42 < \sim \leq 84$ 日	787	4	—	0.51	
	84 日 $<$	249	3	—	1.20	
	不明 ¹⁾	1	1	—	100.00	
不明 ²⁾	0	3	—	—		
本剤の 平均 1 日	$\leq 200\mu\text{g}$	1,057	24	25	2.27	p=0.0003
	$200 < \sim \leq 400\mu\text{g}$	1,705	67	96	3.93	
	$400 < \sim \leq 800\mu\text{g}$	397	28	35	7.05	
	$800\mu\text{g} <$	4	0	0	0.00	
	不明	1	1	1	100.00	

1) : 投与終了日が不明で総投与量、総投与日数の算出が出来ない症例

2) : 副作用の発現日が不明な症例

NS : Not Significant

小児を対象とした使用成績調査において、安全性に影響を及ぼすと考えられる要因について検討した結果、「合併症を有する患者」群において副作用発現症例率が高かったが、副作用の種類に特定の傾向はみられず、特段の問題はないと考えられた。

なお、検定は未実施であるが、「総投与量別」、「総投与日数別」の副作用発現状況について検討を行ったところ、副作用発現症例率及び副作用の種類などに特定の傾向はみられなかった。

背景別副作用発現状況一覧表

検討要因		調査 症例数	副作用発現 症例数	副作用 発現件数	副作用発現 症例 (%)	検定 (Fisher or χ^2)
安全性解析対象		723	7	7	0.97	—
性別	男	433	3	3	0.69	NS
	女	290	4	4	1.38	
年齢	$\sim < 5$ 歳	115	0	0	0.00	NS
	$5 \leq \sim \leq 10$ 歳	460	5	5	1.09	
	$10 < \sim < 15$ 歳	148	2	2	1.35	
入院外来区分	入院	12	0	0	0.00	NS
	外来	685	7	7	1.02	
	入院・外来	26	0	0	0.00	
使用理由	気管支喘息	723	7	7	0.97	—
	その他	0	0	0	0.00	
投与前の 喘息重症度	軽症	227	3	3	1.32	NS
	中等症	459	4	4	0.87	
	重症	37	0	0	0.00	

Ⅷ. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

検討要因		調査 症例数	副作用発現 症例数	副作用 発現件数	副作用発現 症例 (%)	検定 (Fisher or χ^2)
全身性 ステロイド 使用歴	無	566	6	6	1.06	NS
	時に使用	156	1	1	0.64	
	依存性あり	1	0	0	0.00	
合併症	無	587	2	2	0.34	**
	有	136	5	5	3.68	
併用薬剤	無	22	0	0	0.00	NS
	有	701	7	7	1.00	
併用療法	無	720	7	7	0.97	NS
	有	3	0	0	0.00	
総投与量 (累積)	$\leq 700\mu\text{g}$	722	4	4	0.56	検定せず (副作用発 現症例数は 初発の副作 用が発現す るまでの投 与量)
	$700 < \sim \leq 1,400\mu\text{g}$	711	1	1	0.14	
	$1,400 < \sim \leq 2,100\mu\text{g}$	690	0	0	0.00	
	$2,100 < \sim \leq 2,800\mu\text{g}$	675	0	0	0.00	
	$2,800 < \sim \leq 4,200\mu\text{g}$	537	0	0	0.00	
	$4,200 < \sim \leq 5,600\mu\text{g}$	381	0	0	0.00	
	$5,600 < \sim \leq 8,400\mu\text{g}$	253	1	1	0.40	
	$8,400\mu\text{g} <$ 不明※	85 1	0 1	0 1	0.00 100.00	
総投与日数 (累積)	≤ 7 日	722	5	5	0.69	検定せず (副作用発 現症例数は 初発の副作 用が発現す るまでの投 与日数)
	$7 < \sim \leq 14$ 日	705	0	0	0.00	
	$14 < \sim \leq 21$ 日	682	0	0	0.00	
	$21 < \sim \leq 28$ 日	664	0	0	0.00	
	$28 < \sim \leq 42$ 日	432	1	1	0.23	
	$42 < \sim \leq 56$ 日	128	0	0	0.00	
	$56 < \sim \leq 84$ 日	67	0	0	0.00	
	$84 < \sim \leq 168$ 日	26	0	0	0.00	
	168 日 < 不明※	4 1	0 1	0 1	0.00 100.00	
平均 1 日 投与量	$< 50\mu\text{g}$	0	0	0	0.00	NS
	$50\mu\text{g}$	7	0	0	0.00	
	$50 < \sim < 100\mu\text{g}$	1	0	0	0.00	
	$100\mu\text{g}$	371	4	4	1.08	
	$100 < \sim < 150\mu\text{g}$	5	0	0	0.00	
	$150\mu\text{g}$	7	0	0	0.00	
	$150 < \sim < 200\mu\text{g}$	8	0	0	0.00	
	$200\mu\text{g}$ $200\mu\text{g} <$	300 24	3 0	3 0	1.00 0.00	

NS : Not Significant, ** : $p < 0.01$

※ : 副作用発現日が不明な症例

(6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法

【禁忌】 (次の患者には投与しないこと)

(2) 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

(解説)

「2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む） 【禁忌】 (2)」の項参照

重大な副作用

アナフィラキシー：アナフィラキシー（呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等）があらわれることがある（頻度不明^{注1)}）ので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。

注1) 自発報告又は海外のみで認められている副作用については頻度不明とした。

（解説）

「(2) 重大な副作用と初期症状」の項参照

9. 高齢者への投与**高齢者への投与**

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

（解説）

一般的に、高齢者は生理機能が低下していることが多いため、副作用の発現頻度が増加したり、副作用の症状が重症化する傾向がある。したがって、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与**妊婦、産婦、授乳婦等への投与**

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること〔本薬は皮下投与による動物実験（ラット³¹⁾、ウサギ³²⁾）で副腎皮質ステロイド剤に共通した奇形発生、胎児の発育抑制がみられ、これらの所見はウサギにおいて低い用量で出現することが報告されている〕。

（解説）

動物（ラット、ウサギ）への皮下投与実験で、奇形発生、胎児の発育抑制が報告されている。特にウサギの胎児に対する無毒性量（0.08 μ g/kg）は、ラット（10 μ g/kg）と比べ低い用量となっている。これらラット³¹⁾とウサギ³²⁾の無毒性量の差は他の合成糖質コルチコイドにもみられ、本剤に特異的なものではない。吸入剤である本剤は循環血液中への吸収が少なく、吸収された場合でも肝で速やかに代謝されるため、胎盤・胎児への移行は少ないと考えられる。しかしながら、妊婦への安全性は確立されていないため、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ本剤を投与すること。

妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (2) 授乳中の婦人に対しては、本剤の使用経験が少ないので、患者に対する本剤の重要性を考慮した上で授乳の中止あるいは本剤の投与を中止すること〔フルチカゾンプロピオン酸エステル 10 μ g/kg をラットに皮下投与したときに乳汁中への移行が報告されている〕。

（解説）

動物実験（ラット）において、フルチカゾンプロピオン酸エステル 10 μ g/kg を皮下投与した際に乳汁中への移行が報告されている²⁵⁾。ヒトにおいて、乳汁中への移行や乳児への影響などに関する報告はない。授乳婦における本剤の使用経験は少ないため、授乳婦においては、母体に対する有益性と乳児への危険性を十分に考慮し、授乳の中止あるいは本剤の投与を中止すること。

11. 小児等への投与

小児等への投与

- (1) 全身性ステロイド剤と比較し可能性は低いが、吸入ステロイド剤を特に長期間、大量に投与する場合に成長遅延をきたすおそれがある。長期間投与する場合には投与量は患者毎に喘息をコントロールできる最少用量に調節することとし、身長等の経過の観察を十分行うこと。また使用にあたっては、使用法を正しく指導すること。

（解説）

一般に、ステロイド剤が小児の成長に影響を及ぼすことは知られているが、吸入ステロイド剤については、成長速度が低下したとする報告と成長速度に影響はみられなかったとする報告があり、一定の見解は得られていない。しかしながら、より臨床的に重要である最終身長（成人時の身長）への影響について、検討された報告は少なく結論は得られていないものの、海外の大規模な調査結果からは、影響が認められたとしても、一時的な成長速度の低下（成長遅延）であり、吸入ステロイド剤の長期投与は最終身長に影響を及ぼさないことが示唆されている。さらに、重度の喘息自体が成長に影響を及ぼすことが報告されており、喘息の重症度、その他成長に影響を及ぼすことが考えられる要因（喘息による運動制限、全身性ステロイド剤の併用等）が複雑に絡み合い、試験成績の評価を困難にしている。

このように、吸入ステロイド剤が成長に及ぼす影響は明確になっていないが、大量の吸入ステロイド剤を長期間投与する場合に成長遅延が発現する可能性を示唆する報告もあり、吸入ステロイド剤が小児の成長に影響を及ぼす可能性は否定できない。

従って、その危険性を最小限に留めるため、吸入ステロイド剤を長期間投与する場合、投与量は患者毎に喘息症状をコントロールできる必要最少用量に調節するようにすること。特に、長期間かつ大量に吸入ステロイド剤を投与する場合には、患児の成長が遅延する可能性があることに留意し、身長等の検査を定期的に行うこと。

小児等への投与

- (2) 低出生体重児、新生児又は乳児に対する安全性は確立していないので、観察を十分に行いながら投与すること（使用経験が少ない）（「臨床成績」の項参照）。

（解説）

本剤は低出生体重児、新生児又は乳児への使用経験がないため、これらの患者に対する安全性は確立していない。

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

該当しない

13. 過量投与

過量投与

過量投与（通常の用法・用量を超えた量等）により、副腎皮質機能抑制等の全身性の作用がみられることがある。本剤を過量かつ長期間吸入した小児において、低血糖、及びそれに伴う意識低下、痙攣を主な所見とする急性副腎皮質機能不全の発現が報告されている。

副腎皮質機能が抑制されている患者においては、外傷、手術、感染、本剤の急速な減量時等に急性副腎皮質機能不全が発現する可能性がある。過量投与後に本剤を減量する際は、患者の管理を十分に行いながら徐々に行うこと。

（解説）

用法・用量を超えて本剤を過量に投与した場合、全身性ステロイド剤を投与した場合と同様に全身性の作用が発現する可能性がある。

本剤が過量投与された場合には、副腎皮質機能抑制などの全身性の作用の発現に注意し、患者の状態を確認しながら徐々に減量するなど適切な処置を行うこと。

14. 適用上の注意

フルタイドディスクス

適用上の注意

- (1) 本剤は口腔内への吸入投与にのみ使用すること（内服しても効果はみられない）。
- (2) **吸入後**：本剤吸入後に、うがいを実施するよう患者を指導すること（口腔内カンジダ症又は嘔声の予防のため）。ただし、うがいが困難な患者には、うがいではなく、口腔内をすすぐよう指導すること。
- (3) フルタイド 200 ディスクスは成人用である（小児の用法・用量は承認されていない）。

フルタイドロタディスク

適用上の注意

- (1) 本剤は専用の吸入器を用いて、口腔内への吸入投与にのみ使用すること（内服しても効果はみられない）。
- (2) **吸入後**：本剤吸入後に、うがいを実施するよう患者を指導すること（口腔内カンジダ症又は嘔声の予防のため）。ただし、うがいが困難な患者には、うがいではなく、口腔内をすすぐよう指導すること。
- (3) フルタイド 200 ロタディスクは成人用である（小児の用法・用量は承認されていない）。

フルタイドエアゾール

適用上の注意

- (1) 本剤は口腔内への吸入投与にのみ使用すること（内服しても効果はみられない）。
- (2) **吸入後**：本剤吸入後に、うがいを実施するよう患者を指導すること（口腔内カンジダ症又は嘔声の予防のため）。ただし、うがいが困難な患者には、うがいではなく、口腔内をすすぐよう指導すること。

（解説）

- (1) 内服した場合、効果を発現する前に本剤の大部分は肝臓で不活性物質（17 β -カルボン酸体）に代謝される。
- (2) うがいを行うことにより口腔内や咽喉頭に付着した余分なステロイドを取り除き、口腔内カンジダ症や嘔声の発現率が減少することが期待できる。
- (3) フルタイド 50 ディスクス、50 ロタディスク、50 μ g エアゾール 120 吸入用、100 ディスクス、100 ロタディスク、100 μ g エアゾール 60 吸入用のみ小児の用法・用量の承認を取得している。

15. その他の注意

該当しない

16. その他

なし

Ⅸ. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験

(1) 薬効薬理試験（「Ⅵ. 薬効薬理に関する項目」参照）

(2) 副次的薬理試験

該当資料なし

(3) 安全性薬理試験

フルチカゾンプロピオン酸エステルは一般症状及び行動観察において、皮下投与ではマウス及びラットの体重減少ならびにラットの運動性の増加を示し、経口投与ではマウス及びラットの運動性の増加を認めた。また、高濃度で摘出非妊娠子宮 K^+ 収縮の弛緩作用及び摘出気管ヒスタミン収縮の軽度な抑制を示し、胃液分泌においては高用量で酸排出量を減少させた。さらに、フルチカゾンプロピオン酸エステルは利尿作用を示した。その他の一般薬理試験項目では影響は認められなかった³³⁾。

試験項目	動物種 (n)	投与経路	投与量	試験成績
一般症状及び行動	マウス (5)	皮下	10、30、100mg/kg	体重減少
		経口	10、30、100mg/kg	30mg/kg 以上で運動性の増加
	ラット (5)	皮下	10、30、100mg/kg	体重減少、100mg/kg で運動性の増加
		経口	10、30、100mg/kg	体重増加の軽度抑制、30mg/kg 以上で運動性の軽度増加
摘出妊娠・非妊娠子宮 (K^+ 収縮)	ラット (5)	in vitro	10^{-7} 、 10^{-6} 、 10^{-5} g/mL	非妊娠子宮では 10^{-5} g/mL で軽度の弛緩作用 妊娠子宮では影響なし
摘出気管 (ヒスタミン収縮)	モルモット (5)	in vitro	10^{-7} 、 10^{-6} 、 10^{-5} g/mL	10^{-5} g/mL で収縮高の軽度抑制
胃液分泌	ラット (8)	皮下	3、10、30mg/kg	30mg/kg で酸排出量の減少
水及び電解質代謝	ラット (8)	皮下	0.03~30mg/kg	0.1mg/kg 以上で尿量、 Na^+ 、 K^+ 、及び Cl^- 排泄量増加
		経口	3、10、30、100mg/kg	30mg/kg 以上で尿量、 Na^+ 及び K^+ 排泄量増加、100mg/kg で Cl^- 排泄量増加

(4) その他の薬理試験

該当資料なし

2. 毒性試験

(1) 単回投与毒性試験

急性毒性

ラットにおける経口、皮下及び吸入投与、イヌにおける吸入投与試験では、 LD_{50} 値はいずれも投与可能最大量以上であった。ラットの皮下投与試験では、体重減少あるいは増加抑制（500mg/kg 以上の経口投与群と皮下投与の全投与群）、脱毛、副腎皮質・リンパ系組織の萎縮等（皮下投与の全投与群）が認められた。イヌの吸入投与試験では、血漿中コルチゾール基礎分泌量の減少及び Synacthen 刺激によるコルチゾール濃度の上昇抑制が認められた^{34) 35)}。

動物種	投与経路	投与量 (mg/kg)	LD ₅₀ 値 (mg/kg)
ラット	経口	250~2000	>2000
	皮下	125~1000	>1000
	吸入	1.66	>1.66
イヌ	吸入	0.82	>0.82

(2) 反復投与毒性試験

亜急性及び慢性毒性

フルチカゾンプロピオン酸エステルをラットに 26 及び 78 週間吸入投与、イヌに 26 週間及び 12 ヶ月間吸入投与した結果、低用量以上の群にリンパ球数の減少等、中用量以上の群に脱毛、体重増加抑制、赤血球数の増加、血中総蛋白量及びコレステロール量の増加、GOT (AST)、GPT (ALT) 活性の上昇、副腎皮質・リンパ系組織の萎縮等が認められた。低用量群に認められた変化はごく軽度あるいは一時的なものであった^{36) 37)}。

動物種	投与経路、投与期間	投与量 µg/kg/日	無影響量 µg/kg/日
ラット	吸入、26 週間	3、14、61	3.0
イヌ	吸入、26 週間	6.4、14.9、42.5	6.4
ラット	吸入、78 週間	3.8、14.1、57.0	3.8
イヌ	吸入、12 ヶ月間	7.5、18.0、50.7	7.5

(3) 生殖発生毒性試験

生殖に及ぼす影響

フルチカゾンプロピオン酸エステルをラットあるいはウサギの妊娠前から離乳までの各時期に皮下投与した結果、親動物では体重増加抑制、副腎・リンパ系組織の萎縮等がみられたが、生殖能には影響はみられなかった。次世代では主として高用量群に、発育抑制、口蓋裂、臍帯ヘルニア等がみられた。いずれも、ステロイドに共通して見られる諸変化であった^{31) 32) 38) 39)}。

動物種	投与経路、投与期間	投与量 µg/kg/日	無影響量 µg/kg/日
ラット	皮下：妊娠前・妊娠初期 20 日間	5、15、50	5
	皮下：胎児器官形成期 10 日前	10、30、100	10
	皮下：周産期・授乳期 5 日間	5、15、50	50
ウサギ	皮下：胎児器官形成期 12 日間	0.08、0.57、4	0.08

(4) その他の特殊毒性

1) 抗原性⁴⁰⁾

モルモット及びウサギを免疫し、フルチカゾンプロピオン酸エステルの抗原性を検討したが、いずれも陰性で抗原性は認められなかった。

2) 変異原性

微生物を用いた遺伝子突然変異試験、ヒト末梢リンパ球を用いた染色体異常試験、さらに、マウス骨髄を用いた小核試験を実施したが、いずれも陰性で、変異原性は有しないと判断された。

3) がん原性

マウスに 78 週間経口投与、ラットに 104 週間吸入投与した結果、脱毛、体重増加抑制、リンパ球数の減少等がみられたが、腫瘍の発生率に影響は認められず、がん原性はないものと判断された。

4) 局所刺激性

ラットにフルチカゾンプロピオン酸エステル粉末製剤を 125mg (臨床吸入量 100µg×2 回/日の約 163 倍) を 14 日間吸入投与した結果、局所刺激性は認められなかった。

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

製 剤：処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

有効成分：毒薬

2. 有効期間又は使用期限

使用期限：ディスクス 3年

 ロタディスク 3年

 エアゾール 2年

ディスクス：アルミ包装開封後は12ヵ月以内にご使用ください。ただし使用期限を超えて使用しないでください。

3. 貯法・保存条件

室温保存

4. 薬剤取扱い上の注意点

(1) 薬局での取扱い上の留意点について

該当しない

(2) 薬剤交付時の取扱いについて（患者等に留意すべき必須事項等）

取扱い上の注意

・ディスクス

1. 患者には使用説明書を渡し、使用方法を指導すること。
2. 本剤は防湿のためアルミ包装されているので、本剤の交付時に、使用開始直前にアルミ包装を開封するよう指導すること。

・ロタディスク

1. 患者には専用吸入器及び使用説明書を渡し、使用方法を指導すること。
2. ブリスターは吸入の直前に穴をあけること。

・エアゾール

1. 患者には使用説明書を渡し、使用方法を指導すること。なお、エアゾール剤の噴霧と吸入の同調が難しいと考えられる患者にはスパーサー（吸入用補助器）を使用させることが望ましい。
2. 用時振盪
3. 保管上の注意
 - (1) アダプターは噴霧を良好に保つため、少なくとも週1回以上流水か温湯でよく洗い、十分に乾燥し清潔に保管すること（洗浄・乾燥が不十分だと噴霧不良の原因となる）。
 - (2) ボンベは絶対に濡らさないこと（噴射口がつまる原因となる）。
 - (3) 30℃以上の場所に保管しないこと。
 - (4) ボンベは火中に投入しないこと。
 - (5) 地方自治体により定められたボンベの廃棄処理法に従うこと。
 - (6) ボンベに穴を開けるときは空にしてから開けること。

「XIII 備考 その他の関連資料」の項参照
くすりのしおり：有り

(3) 調剤時の留意点について
該当しない

5. 承認条件等

フルタイド 50 μ g エアゾール 120 吸入用、100 μ g エアゾール 60 吸入用
長期投与時の安全性を確認するための市販後調査を実施すること。

6. 包装

フルタイド 50 ディスカス : 60 ブリスター×1
フルタイド 100 ディスカス : 60 ブリスター×1
フルタイド 200 ディスカス : 60 ブリスター×1
フルタイド 50 ロタディスク : (4 ブリスター×14) ×2
フルタイド 100 ロタディスク : (4 ブリスター×14) ×2
フルタイド 200 ロタディスク : (4 ブリスター×14) ×2
フルタイド 50 μ g エアゾール 120 吸入用 : 10.6g×1 (専用アダプター付)
フルタイド 100 μ g エアゾール 60 吸入用 : 7.0g×1 (専用アダプター付)

7. 容器の材質

	材 質
ディスクス	ポリアミド (ナイロン) アルミニウム ポリ塩化ビニル アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン (ABS) ポリプロピレン ポリカーボネート ポリアセタール
ロタディスク	ポリアミド (ナイロン) アルミニウム ポリ塩化ビニル ポリウレタン ポリブチルメタクリレート
ディスクヘラー (ロタディスク専用吸入器)	ポリプロピレン ポリアセタール
エアゾール	アクチュエーター、キャップ：ポリプロピレン ポンベ：アルミニウム

8. 同一成分・同効薬

同一成分薬：フルナーゼ点鼻液（鼻過敏症治療剤）
同 効 薬：フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ベクロメタゾンプロピオン酸エステル、
ブデソニド、シクレソニド、モメタゾンフランカルボン酸エステル

X. 管理的事項に関する項目

9. 国際誕生年月日

1990年3月8日（イギリス）

10. 製造販売承認年月日及び承認番号

製品名	製造販売承認年月日	承認番号
フルタイド 50 ディスカス	2001年10月2日	21300AMY00450
フルタイド 100 ディスカス		21300AMY00451
フルタイド 200 ディスカス		21300AMY00452
フルタイド 50 ロタディスク	1998年9月30日	21000AMY00239
フルタイド 100 ロタディスク		21000AMY00240
フルタイド 200 ロタディスク		21000AMY00241
フルタイド 50 μ g エアゾール 120 吸入用	2009年6月10日 (販売名変更による ^{注)})	22100AMX00871
フルタイド 100 μ g エアゾール 60 吸入用		22100AMX00872

注) 旧販売名：フルタイド 50 エアー 製造販売承認年月日：2002年10月4日

旧販売名：フルタイド 100 エアー 製造販売承認年月日：2002年10月4日

11. 薬価基準収載年月日

製品名	薬価基準収載年月日
フルタイド 50,100,200 ロタディスク	1998年11月27日
フルタイド 50,100 ディスカス	2001年12月7日
フルタイド 200 ディスカス	2001年12月14日
フルタイド 50 μ g エアゾール 120 吸入用 (新販売名)	2009年9月25日
フルタイド 100 μ g エアゾール 60 吸入用 (新販売名)	2009年9月25日

注) フルタイド 50 エアー (旧販売名)：2002年12月13日 経過措置期間終了：2010年6月30日

フルタイド 100 エアー (旧販売名)：2003年12月19日 経過措置期間終了：2010年6月30日

12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

2001年10月2日：小児適応追加、剤形（ディスカス）追加

2002年10月4日：剤形（エアー）追加

2009年6月10日：販売名変更（50 エアゾール 120 吸入用、100 エアゾール 60 吸入用）

13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

薬事法第14条第2項各号（承認拒否事由）のいずれにも該当しない。

[再審査結果通知年月日：2009年3月30日]

14. 再審査期間

成人：6年（1998年9月30日～2004年9月29日満了）

小児：4年（2001年10月2日～2005年10月1日満了）

15. 投薬期間制限医薬品に関する情報

本剤は、投薬（あるいは投与）期間に関する制限は定められていない。

16. 各種コード

販売名	HOT 番号 (9桁)	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	レセプト電算コード
フルタイド 50 ディスカス	11455880	2290700G4025	660451012
フルタイド 100 ディスカス	11455950	2290700G5021	660451013
フルタイド 200 ディスカス	11457930	2290700G6028	660451016
フルタイド 50 ロタディスク	10416370	2290700G1026	660421112
フルタイド 100 ロタディスク	10416440	2290700G2022	660421113
フルタイド 200 ロタディスク	10416510	2290700G3029	660421114
フルタイド 50 μ g エアゾール 120 吸入用	11512680	2290700G7032	621512601
フルタイド 100 μ g エアゾール 60 吸入用	11572220	2290700G8039	621572201

17. 保険給付上の注意

該当しない

XI. 文献

1. 引用文献

- 1) 宮本昭正ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (6) : 1587.
- 2) 宮本昭正ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (6) : 1609.
- 3) 大道光秀ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (6) : 1635.
- 4) 山岸雅彦ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (8) : 2097.
- 5) 田村 弦ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (10) : 2741.
- 6) 工藤宏一郎ほか：臨床医薬. 1994 ; 10 (3) : 689.
- 7) 鈴木俊介ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (11) : 2993.
- 8) 足立 満ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (11) : 3011.
- 9) 佐野靖之ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (13) : 3527.
- 10) 木原令夫ほか：臨床医薬. 1997 ; 13 (13) : 3545.
- 11) 飯倉洋治ほか：アレルギー・免疫. 2000 ; 7 (5) : 653.
- 12) 飯倉洋治ほか：アレルギー・免疫. 2000 ; 7 (5) : 671.
- 13) 足立 満ほか：臨床医薬. 1994 ; 10 (1) : 17.
- 14) 足立 満ほか：臨床医薬. 1994 ; 10 (1) : 31.
- 15) 沖 和彦ほか：アレルギー・免疫. 2004 ; 11 (7) : 960.
- 16) Phillipps GH : *Respir Med.* 1990 ; 84 (Suppl A) : 19.
- 17) 藤原 肇ほか：基礎と臨床. 1992 ; 26 (4) : 1271.
- 18) Falcoz C, et al. : *Br J Clin Pharmacol.* 1996 ; 41 : 459P.
- 19) Mackie AE, et al. : *Br J Clin Pharmacol.* 1997 ; 43 : 540P.
- 20) Harding SM : *Respir Med.* 1990 ; 84 (Suppl A) : 25.
- 21) Daniel MJ, et al. : 基礎と臨床. 1992 ; 26 (6) : 2011.
- 22) 奥田 稔ほか：耳鼻と臨床. 1992 ; 38 (補1) : 299.
- 23) 奥田 稔ほか：耳鼻と臨床. 1992 ; 38 (補1) : 420.
- 24) Daniel MJ, et al. : 基礎と臨床. 1992 ; 26 (6) : 1987.
- 25) 江角凱夫ほか：基礎と臨床. 1992 ; 26 (6) : 2047.
- 26) Meibohm B, et al. : *Rev Contemp Pharmacother.* 1998 ; 9 : 535.
- 27) Hillebrand-Haverkort ME, et al. : *AIDS.* 1999 ; 13 : 1803.
- 28) Chen F, et al. : *Sex Transm Infect.* 1999 ; 75 : 274.
- 29) Soldatos G, et al. : *Intern Med J.* 2005 ; 35 (1) : 67.
- 30) Clevenbergh P, et al. : *J Infect.* 2002 ; 44 (3) : 194.
- 31) 新保幸太郎ほか：薬理と治療. 1992 ; 20 (5) : 1597.
- 32) 江崎洋志ほか：薬理と治療. 1992 ; 20 (5) : 1643.
- 33) 森野久弥ほか：基礎と臨床. 1992 ; 26 (4) : 1235.
- 34) 江崎洋志ほか：薬理と治療. 1992 ; 20 (5) : 1493.
- 35) Hickson M, et al. : 薬理と治療. 1992 ; 20 (5) : 1501.
- 36) Clark GC, et al. : 薬理と治療. 1992 ; 20 (5) : 1509.
- 37) Alexander DJ, et al. : 薬理と治療. 1992 ; 20 (5) : 1543.
- 38) 新保幸太郎ほか：薬理と治療. 1992 ; 20 (5) : 1573.
- 39) Rawlings SJ, et al. : 薬理と治療. 1992 ; 20 (5) : 1633.
- 40) 武田憲三ほか：薬理と治療. 1992 ; 20 (5) : 1657.

2. その他の参考文献

なし

X II . 参考資料

1. 主な外国での発売状況

米国、英国の承認状況は以下の通りであり、本邦で承認されている内容とは異なる。

【本邦における承認内容】

効能・効果

気管支喘息

用法・用量

成人には、フルチカゾンプロピオン酸エステルとして通常1回100 μ gを1日2回吸入投与する。

小児には、フルチカゾンプロピオン酸エステルとして通常1回50 μ gを1日2回吸入投与する。

なお、症状により適宜増減するが、1日の最大投与量は成人では800 μ g、小児では200 μ gを限度とする。

英国：(Accuhaler) 2018年12月12日改訂、(Evohaler) 2018年12月12日改訂、
(Nebules) 2018年12月12日改訂

国	販売名	承認年月	剤形・含量	効能・効果 用法・用量
英国	Flixotide Accuhaler	1995年4月	ディスクス 50, 100, 250, 500 μ g /ブリスター	効能・効果 気管支喘息 用法・用量
	Flixotide Evohaler	2000年3月	エアゾール (代替フロン製剤) 50, 125, 250 μ g /puff	・成人及び16歳以上の小児 100~1,000 μ gを1日2回 ・4~15歳の小児 50~200 μ gを1日2回
	Flixotide Nebules	1998年8月	ネブライザー用 0.5mg/2mL 2mg/2mL	効能・効果 重症気管支喘息 用法・用量 ・成人及び16歳以上の小児 500~2,000 μ gを1日2回 ・4~15歳の小児 1,000 μ gを1日2回

米国：(DISKUS) 2019年1月改訂、(HFA) 2019年1月改訂

国	販売名	承認年月	剤形・含量	効能・効果 用法・用量
米国	FLOVENT DISKUS	1994年	ディスクス 50, 100, 250 μ g /ブリスター	効能・効果 気管支喘息 用法・用量 ・成人及び12歳以上の小児 100~1000 μ gを1日2回 ・4~11歳の小児 50~100 μ gを1日2回
	FLOVENT HFA	1994年	エアゾール (代替フロン製剤) 44, 110, 220 μ g /puff	効能・効果 気管支喘息 用法・用量 ・成人及び12歳以上の小児 88~880 μ gを1日2回 ・4~11歳の小児 88 μ gを1日2回

2. 海外における臨床支援情報

(1) 妊婦に関する海外情報

本邦における使用上の注意「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項の記載は以下の通りであり、米国添付文書及びオーストラリアの分類とは異なる。

【使用上の注意】「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること [本薬は皮下投与による動物実験 (ラット³¹⁾、ウサギ³²⁾) で副腎皮質ステロイド剤に共通した奇形発生、胎児の発育抑制がみられ、これらの所見はウサギにおいて低い用量で出現することが報告されている]。
- (2) 授乳中の婦人に対しては、本剤の使用経験が少ないので、患者に対する本剤の重要性を考慮した上で授乳の中止あるいは本剤の投与を中止すること [フルチカゾンプロピオン酸エステル 10µg/kg をラットに皮下投与したときに乳汁中への移行が報告されている]。

出典	分類
米国の添付文書 (2019年1月)	<p>Pregnancy Risk Summary There are insufficient data on the use of FLOVENT DISKUS in pregnant women. There are clinical considerations with the use of FLOVENT DISKUS in pregnant women. In animals, teratogenicity characteristic of corticosteroids, decreased fetal body weight, and/or skeletal variations in rats, mice, and rabbits were observed with subcutaneously administered maternal toxic doses of fluticasone propionate less than the maximum recommended human daily inhaled dose (MRHDID) on a mcg/m² basis. However, fluticasone propionate administered via inhalation to rats decreased fetal body weight, but did not induce teratogenicity at a maternal toxic dose less than the MRHDID on a mcg/m² basis. Experience with oral corticosteroids suggests that rodents are more prone to teratogenic effects from corticosteroids than humans. The estimated risk of major birth defects and miscarriage for the indicated population is unknown. In the U.S. general population, the estimated risk of major birth defects and miscarriage in clinically recognized pregnancies is 2% to 4% and 15% to 20%, respectively.</p> <p>Lactation Risk Summary There are no available data on the presence of fluticasone propionate in human milk, the effects on the breastfed child, or the effects on milk production. Other corticosteroids have been detected in human milk. However, fluticasone propionate concentrations in plasma after inhaled therapeutic doses are low and therefore concentrations in human breast milk are likely to be correspondingly low. The developmental and health benefits of breastfeeding should be considered along with the mother's clinical need for FLOVENT DISKUS and any potential adverse effects on the breastfed child from FLOVENT DISKUS or from the underlying maternal condition.</p>
オーストラリアの分類 : An Australian categorisation of risk of drug use in pregnancy (2018年12月)	<p>Category: B3 Drugs which have been taken by only a limited number of pregnant women and women of childbearing age, without an increase in the frequency of malformation or other direct or indirect harmful effects on the human fetus having been observed.</p> <p>Studies in animals have shown evidence of an increased occurrence of fetal damage, the significance of which is considered uncertain in humans.</p>

(2) 小児等に関する記載

本邦における使用上の注意「小児等への投与」の項の記載は以下の通りであり、米国の添付文書及び英国の SPC とは異なる。

【使用上の注意】「小児等への投与」

- (1) 全身性ステロイド剤と比較し可能性は低いですが、吸入ステロイド剤を特に長期間、大量に投与する場合に成長遅延をきたすおそれがある。長期間投与する場合には投与量は患者毎に喘息をコントロールできる最少用量に調節することとし、身長等の経過の観察を十分行うこと。また使用にあたっては、使用法を正しく指導すること。
- (2) 低出生体重児、新生児又は乳児に対する安全性は確立していないので、観察を十分に行いながら投与すること（使用経験が少ない）（「臨床成績」の項参照）。

出典	記載内容
米国の添付文書 (2019年1月)	<p>Pediatric Use The safety and effectiveness of FLOVENT HFA in children aged 4 years and older have been established. The safety and effectiveness of FLOVENT HFA in children younger than 4 years have not been established.</p> <p>Use of FLOVENT HFA in patients aged 4 to 11 years is supported by evidence from adequate and well-controlled trials in adults and adolescents aged 12 years and older, pharmacokinetic trials in patients aged 4 to 11 years, established efficacy of fluticasone propionate formulated as FLOVENT DISKUS (fluticasone propionate inhalation powder) and FLOVENT ROTADISK (fluticasone propionate inhalation powder) in patients aged 4 to 11 years, and supportive findings with FLOVENT HFA in a trial conducted in subjects aged 4 to 11 years.</p> <p>Effects on Growth: Orally inhaled corticosteroids may cause a reduction in growth velocity when administered to pediatric patients. A reduction of growth velocity in children or teenagers may occur as a result of poorly controlled asthma or from use of corticosteroids including ICS. The effects of long-term treatment of children and adolescents with ICS, including fluticasone propionate, on final adult height are not known. Controlled clinical trials have shown that ICS may cause a reduction in growth in pediatric patients. In these trials, the mean reduction in growth velocity was approximately 1 cm/year (range: 0.3 to 1.8 cm/year) and appeared to depend upon dose and duration of exposure. This effect was observed in the absence of laboratory evidence of HPA axis suppression, suggesting that growth velocity is a more sensitive indicator of systemic corticosteroid exposure in pediatric patients than some commonly used tests of HPA axis function. The long-term effects of this reduction in growth velocity associated with orally inhaled corticosteroids, including the impact on final adult height, are unknown. The potential for “catch-up” growth following discontinuation of treatment with orally inhaled corticosteroids has not been adequately studied. The effects on growth velocity of treatment with orally inhaled corticosteroids for over 1 year, including the impact on final adult height, are unknown. The growth of children and adolescents receiving orally inhaled corticosteroids, including FLOVENT HFA, should be monitored routinely (e.g., via stadiometry). The potential growth effects of prolonged treatment should be weighed against the clinical benefits obtained and the risks associated with alternative therapies. To minimize the systemic effects of orally inhaled corticosteroids, including FLOVENT HFA, each patient should be titrated to the lowest dose that effectively controls his/her symptoms.</p> <p>Since a cross trial comparison in adult and adolescent subjects (aged 12 years and older) indicated that systemic exposure of inhaled fluticasone propionate from FLOVENT HFA would be higher than exposure from FLOVENT ROTADISK, results from a trial to assess the potential growth effects of FLOVENT ROTADISK in pediatric subjects (aged 4 to 11 years) are provided.</p> <p>A 52-week placebo-controlled trial to assess the potential growth effects of fluticasone propionate inhalation powder (FLOVENT ROTADISK) at 50 and 100 mcg twice daily was</p>

出典	記載内容
	<p>conducted in the U.S. in 325 prepubescent children (244 males and 81 females) aged 4 to 11 years. The mean growth velocities at 52 weeks observed in the intent-to-treat population were 6.32 cm/year in the placebo group (n = 76), 6.07 cm/year in the 50-mcg group (n = 98), and 5.66 cm/year in the 100-mcg group (n = 89). An imbalance in the proportion of children entering puberty between groups and a higher dropout rate in the placebo group due to poorly controlled asthma may be confounding factors in interpreting these data. A separate subset analysis of children who remained prepubertal during the trial revealed growth rates at 52 weeks of 6.10 cm/year in the placebo group (n = 57), 5.91 cm/year in the 50-mcg group (n = 74), and 5.67 cm/year in the 100-mcg group (n = 79). In children aged 8.5 years, the mean age of children in this trial, the range for expected growth velocity is: boys – 3rd percentile = 3.8 cm/year, 50th percentile = 5.4 cm/year, and 97th percentile = 7.0 cm/year; girls – 3rd percentile = 4.2 cm/year, 50th percentile = 5.7 cm/year, and 97th percentile = 7.3 cm/year. The clinical relevance of these growth data is not certain.</p>
<p>英国の SPC (2018 年 12 月)</p>	<p>4.4 Special warnings and precautions for use Systemic effects of inhaled corticosteroids may occur, particularly at high doses prescribed for prolonged periods. These effects are much less likely to occur than with oral corticosteroids. Possible systemic effects include Cushing's syndrome, Cushingoid features, adrenal suppression, growth retardation in children and adolescents, decrease in bone mineral density and more rarely, a range of psychological or behavioural effects including psychomotor hyperactivity, sleep disorders, anxiety, depression or aggression (particularly in children). It is important therefore that the dose of inhaled corticosteroid is reviewed regularly and reduced to the lowest dose at which effective control of asthma is maintained. Prolonged treatment with high doses of inhaled corticosteroids may result in adrenal suppression and acute adrenal crisis. Children aged < 16 years taking higher than licensed doses of fluticasone (typically ≥ 1000mcg/day) may be at particular risk. Situations, which could potentially trigger acute adrenal crisis, include trauma, surgery, infection or any rapid reduction in dosage. Presenting symptoms are typically vague and may include anorexia, abdominal pain, weight loss, tiredness, headache, nausea, vomiting, decreased level of consciousness, hypoglycaemia, and seizures. Additional systemic corticosteroid cover should be considered during periods of stress or elective surgery. It is recommended that the height of children receiving prolonged treatment with inhaled corticosteroids is regularly monitored. If growth is slowed, therapy should be reviewed with the aim of reducing the dose of inhaled corticosteroid, if possible, to the lowest dose at which effective control of asthma is maintained. In addition, consideration should be given to referring the patient to a paediatric respiratory specialist.</p>

XIII. 備考

その他の関連資料


ディスクヘラー患者用使用説明書

ディスクヘラー[®]の吸入方法



吸入器の掃除

注)掃除の際は、ディスク(薬)ははずしてください。



- 1) 吸入器本体からトレーをはずします。
- 2) 吸入口に付着した汚れはガーゼ等で拭きとります。
- 3) トレーとカバーを元に戻します。

装着方法

- 1** カバーをはずします。

フタ側を上にしてカバーをはずします。
- 2** トレーを引き出します。

トレーの側面を持って、動かなくなるところまで静かに引き出します。
- 3** トレーを取りはずします。

トレー側面のグリップ(ギザギザの部分)を両側から親指と人差し指でつまみながら(内側に押しながら)、本体からトレーを取りはずします。
- 4** ディスク(薬)をのせます。

トレーの4つの穴にディスクの凸部分を合わせてのせます。
- 5** トレーを戻します。

ディスクをのせたトレーを本体にカチッと音がするまでしっかりと最後まで押し戻します。

吸入方法

- 1** カバーをはずします。

フタ側を上にしてカバーをはずし、吸入口が汚れていないことを確かめます。
- 2** ディスク(薬)に穴をあけます。

吸入器をたいらに保ち、①フタを垂直になるまで立て、②再びフタを閉じます。この操作によりディスクの上面から下面まで針が貫通し、薬を吸入できる状態になります。
- 3** 息を吹き出します。

吸入器をたいらに保ち、無理をしない程度に息を吹き出します。
⚠ 薬がこぼれないように、吸入器をたいらに保ってください。また、吸入器に向けて息を吐かないでください。
- 4** 薬を吸い込みます。

たいらに保ったまま吸入口を軽くくわえます。その際、側面にある空気孔をふさがないようにしてください。強く深く「スーッ」と口から息を吸い込みます。その後、吸入器を口から離し、そのまま3～4秒程度息を止め、その後ゆっくりと静かに息を吹き、元の呼吸に戻してください。

※薬が吸入されるとわずかな甘みや粉の感覚を口の中に感じます。しかし、薬の量がごくわずかであるため、甘みを感じない(吸入感を得られない)場合もあります。また、体調などによって、甘みを感じない場合もあります。薬が吸入器に残るようであれば、1～2回繰り返して薬を吸い込んでください。
- 5** ディスク(薬)を回転させます。

吸入が終わったら、トレーを動かなくなるところまで引き出し、再び押し戻します。これによりディスクが回転し、次の吸入が可能になります。吸入後は、のどや口の中に残っている薬を洗い流すために必ずうがいをしてください。

グラクソ・スミスクライン 株式会社

ディスクヘラー®をご使用になる方へ

ディスク(薬)



プリスター
[この中にお薬が入っています。]

フルタイム®



セレベント®



薬は、この吸入器用に作られた円盤状のアルミシート(ディスク)に包装されています。ディスクには4つの凸部分(プリスター)があり、各プリスターに粉状の薬が入っています。薬を吸入するためには、吸入器にディスク(薬)を装着します。

用法・用量

主治医から指示された用法・用量に従ってください。

1回 吸入 / 1日 回
[朝(吸入)・就寝前(吸入)]

ディスクヘラーの保管

- 1) ディスク(薬)は吸入の直前に穴をあけてください。また、変形しないように保管してください。
- 2) 吸入器(ディスクヘラー)は使い捨てではありません。繰り返しご使用ください。
- 3) 高温多湿のところを避けて室温で保管してください。
- 4) 吸入器(ディスクヘラー)の汚れがひどい場合は、流水か温湯で十分洗浄し、水分を切ってよく乾燥させてください。

よくあるQ&A

Q 吸入した感覚はどのような感じでしょうか？

A 薬が吸入されるとわずかな甘みや粉の感覚を口の中に感じます。しかし、薬の量がごくわずかであるため、甘みを感じない(吸入感を得られない)場合もあります。また、体調などによっても、甘みを感じない場合もあります。
うまく吸入できているか不安な場合は、カバーを閉じずにそのまま追加で1~2回吸入を繰り返してください。

パソコン、携帯電話から動画による吸入法などもご覧いただけます。

▶ <http://kusurigsk.jp/pc/index.html>

2次元コードが読み取れない場合は、インターネットに上記アドレスを直接ご入力ください。



ディスクヘラーの使い方のお問い合わせは

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0120-562-306



(9:00~17:45 / 土日祝日および当社休業日を除く)

グラクソ・スミスクライン 株式会社

FTDX00056-P1709N
改訂年月2016年9月(MKT)
(増刷年月2018年7月)


ディスクス患者用使用説明書

ディスクスの吸入方法



カバーを「カチリ」と音がするまで開けます。

片手でカバーを持ち、もう片方の手の親指をグリップにあて、グリップが止まるまで回してください(カチリと音がします)。



レバーを「カチリ」と音がするまで押します。

マウスピース(吸入口)を自分に向けて持ち、レバーをグリップのところまで押し付けてください(カチリと音がします)。

⚠ 薬を吸入するとき以外はレバーを操作しないでください。



息をはき出してから、マウスピース(吸入口)をくわえ強く深く「スーッ」と息を吸い込みます。

無理をしない程度に息をはき出してください。吸入器をたいらに持ち、マウスピース(吸入口)を口にくわえ、強く深く「スーッ」と息を吸い込みます。

口からマウスピース(吸入口)を離し、そのまま3~4秒程度息を止め、その後ゆっくりと静かに息をはき、元の呼吸に戻してください。

⚠ マウスピース(吸入口)に息を吹き込まないでください。

<カバーの閉じ方>

グリップに親指をあて、カチリと音がするところまで、回し戻してカバーを閉じてください(レバーもいっしょに元の位置に戻ります)。



吸入後は、のどや口の中に残っている薬を洗い流すために必ずうがいをしてください。

- マウスピース(吸入口)を拭く際は、乾いたティッシュペーパーなどを用い、カバーを閉じる前に行ってください。
- カバーは、しっかりと閉じてください。


グラクソ・スミスクライン株式会社

ディスクス®をご使用になる方へ


アドエア®



フルタイド®



セレベント®



用法・用量

主治医から指示された用法・用量に従ってください。

1回 吸入 / 1日 回
[朝 (吸入) ・ 就寝前 (吸入)]
この薬剤は (28 ・ 60) 回分充填されています。

ディスクスの保管

- 1) アルミ包装は使用開始直前に開封してください。
- 2) 吸入時以外はカバーを閉じてください。
- 3) 高温多湿のところを避けて室温で保管してください。
- 4) マウスピース(吸入口)が汚れた場合は、乾いたティッシュペーパー等で拭いてください(水で洗ったり、湿ったものでマウスピースを拭いたりしないこと)。

よくあるQ&A

- Q** 吸入した感覚はどのような感じでしょうか？
- A** 薬が吸入されるとわずかな甘みや粉の感覚を口の中に感じます。しかし、薬の量のごくわずかであるため、甘みを感じない(吸入感を得られない)場合もあります。また、体調などによっても、甘みを感じない場合もあります。うまく吸入できているか不安な場合は、カバーを閉じずにそのまま追加で1~2回吸入を繰り返してください。
- Q** 吸入できたかを確認する方法はありますか？
- A** 1回分吸入した後、カバーを閉じる前に、吸入口の先をテーブルに置いた紙(できれば黒い紙)にトントンと叩いて、お薬が出てこなければ正しく吸入できています。
- Q** お薬がきちんとセットされているかを確認する方法はありますか？
- A** カバーを開けた後レバーを押し、吸入せずにテーブルに置いた紙(できれば黒い紙)にトントンと叩くと、お薬が出てくることを確認できます。1回分のお薬が無駄になることをご理解の上、この確認作業をしてください。確認作業終了後、出てきたお薬は破棄してください。

パソコン、携帯電話から動画による吸入法などもご覧いただけます。

▶ <http://kusurigsj.jp/pc/index.html>

2次元コードが読み取れない場合は、インターネットに上記アドレスを直接ご入力ください。



ディスクスの使い方のお問い合わせは

カスタマー・ケア・センター


TEL: 0120-562-306

(9:00~17:45/土日祝日および当社休業日を除く)

グラクソ・スミスクライン株式会社


AAAS00064-P1709N
改訂年月2016年9月(MKT)
(増刷年月2018年9月)

フルタイム®エアゾールの吸入方法




1

アダプターについているキャップの両端をつまみではずします。ポンベの中の薬が均一にまじりあうようによく振ってください。



2

無理をしない程度に息をはき出した後、舌を下げ、のどを広げた状態にしてください。



3

図㊸または図㊹のように息をゆっくり吸い込みながらポンベの底を強く1回押して吸入してください。

図㊸ 吸入口をくわえないで口より約4cm離して吸入します。

図㊹ 吸入口を唇で軽くくわえて吸入します。または、歯で軽くくわえて吸入します。


㊸または㊹のいずれの方法で吸入するかは先生の指示に従ってください。また、うまく吸入できない場合は先生に相談してください。

4



口から吸入口を離し、そのまま3～4秒程度息を止め、その後ゆっくりと静かに息をはき、元の呼吸に戻してください。

5



使用後は、アダプターにキャップをつけてください。医師の指示によりフルタイム®エアゾールをもう1回吸入する場合は、1～4の操作を繰り返してください。

6




吸入後は、のどや口の中に残っている薬を洗い流すために必ずうがいをしてください。

■ 吸入用補助器具（スパーサー）を使用する場合は、吸入用補助器具に添付されている使用説明書をご参照ください。

グラクソ・スミスクライン 株式会社

フルタイム®エアゾールをご使用になる方へ

<横から見た図>



- 薬剤の吸入は裏面の使用説明書をよく読んでから行ってください。
- フルタイム100 μ gエアゾールは60回、フルタイム50 μ gエアゾールは120回の定量噴霧が可能です。

用法・用量

主治医から指示された用法・用量に従ってください。

1回 吸入 / 1日 回
 [朝 (吸入) ・ 就寝前 (吸入)]

エアゾールの保管

- 1) アダプターは時々流水か温湯で十分に洗浄し、清潔に保管してください。
- 2) 30℃以上の場所に保管しないでください。
- 3) ボンベは火中に投入しないでください。
- 4) 使用後は、地方自治体により定められたボンベの廃棄処理法に従ってください。
- 5) ボンベに穴を開けるときは空にしてから開けてください。


アダプターの洗浄・乾燥

1 アダプターは噴霧を良好に保つため、少なくとも週1回以上流水か温湯でよく洗い、十分に乾燥させてください。(洗浄・乾燥が不十分だと噴霧不良の原因になります)。


2 洗浄直後に使用する必要が生じた場合、アダプターを振るなどして水分をよく切ってからボンベを装着し、空気中に数回空噴霧して噴霧を確認した後、使用してください。使用后、再度洗浄、乾燥してください。



アダプターからキャップとボンベを取りはずします。



アダプターを流水または温湯でよく洗ってください。ボンベは絶対に濡らさないでください。



振るなどして水分をよく切ってアダプターの内側と外側をよく拭き、十分に乾燥させてください。

パソコン、携帯電話から動画による吸入法などもご覧いただけます。

▶ <http://kusurigsk.jp/FTA/>

2次元コードが読み取れない場合は、インターネットに上記アドレスを直接ご入力ください。



フルタイム エアゾールの使い方のお問い合わせは
カスタマー・ケア・センター

TEL: 0120-562-306

(9:00~17:45 / 土日祝日および当社休業日を除く)

グラクソ・スミスクライン 株式会社

FTAL0001-P1709N
 改訂年月2016年9月(MKT)
 (増刷年月2018年7月)

グラクソ・スミスクライン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-8-1