

日本標準商品分類番号	87 3319
承認番号	16000AMZ00565
薬価収載	1990年7月
販売開始	1990年10月
再評価結果	1978年3月

日本薬局方 リンゲル液

リンゲル液「オーツカ」

貯法：室温保存

使用期限：容器に表示の使用期限内に使用すること。

使用時及び保管：取扱上の注意の項参照

※注）注意－医師等の処方箋により使用すること

Ringer's Solution OTSUKA

※※【組成・性状】

1. 組成

本剤は1容器中に次の成分を含有する注射液である。

成分	500mL中
塩化ナトリウム	4.3 g
塩化カリウム	0.15 g
塩化カルシウム水和物	0.165g

電解質濃度 mEq/L			
Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Cl ⁻
147	4	4.5	155.5

2. 製剤の性状

本剤は無色澄明の注射液である。

pH 5.0～7.5 (規格値)

浸透圧比 約1 (生理食塩液に対する比)

【効能・効果】

循環血液量及び組織間液の減少時における細胞外液の補給・補正

【用法・用量】

通常成人、1回500～1000mLを点滴静注する。

投与速度は、通常成人1時間あたり300～500mLとする。

なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 腎不全のある患者 [水分、電解質の過剰投与に陥りやすく、症状が悪化するおそれがある。]
- (2) 心不全のある患者 [循環血液量を増すことから心臓に負担をかけ、症状が悪化するおそれがある。]
- (3) 高張性脱水症の患者 [本剤では水分補給が必要であり、電解質を含む本剤の投与により症状が悪化するおそれがある。]
- (4) 閉塞性尿路疾患により尿量が減少している患者 [水分、電解質の過負荷となり、症状が悪化するおそれがある。]

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

副作用が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

大量・急速投与：大量を急速投与すると、肺水腫、脳浮腫、末梢の浮腫、アシドーシスがあらわれることがある（第一次再評価結果その14、1978年）。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、投与速度を緩徐にし、減量するなど注意すること。

4. 適用上の注意

- (1) 調製時：
①本剤はカルシウム塩を含有するため、クエン酸加血液と混合すると凝血を起こすおそれがあるので注意すること。
②リン酸イオン及び炭酸イオンと沈殿を生じるので、リン酸塩又は炭酸塩を含む製剤と配合しないこと。
- (2) 投与前：
①投与に際しては、感染に対する配慮をすること（患者の皮膚や器具消毒）。
②寒冷期には体温程度に温めて使用すること。
③開封後直ちに使用し、残液は決して使用しないこと。
- (3) 投与时：ゆっくり静脈内に投与すること。

【取扱い上の注意】

- (1) 注射針はゴム栓の○印にまっすぐ刺すこと。斜めに刺すと注射針が容器頸部を貫通し、液漏れの原因となることがある。
- (2) ソフトバッグ製品は、原則として連結管を用いたタンデム方式による投与はできない。
- (3) 包装内に水滴が認められるものや内容液が着色又は混濁しているものは使用しないこと。
- (4) 容器の液目盛りはおおよその目安として使用すること。

【包装】

リンゲル液「オーツカ」 500mL 20袋 ソフトバッグ入り