

骨吸収抑制剤

 劇薬・処方箋医薬品[※]

日本標準商品分類番号

873999

貯法
室温保存

使用期限
外箱に表示（3年）

パミドロン酸二Na点滴静注用15mg[F]

パミドロン酸二Na点滴静注用30mg[F]

PAMIDRONATE DISODIUM intravenous for drip use

注射用パミドロン酸二ナトリウム水和物

	15mg	30mg
承認番号	21900AMX00605	21900AMX00604
薬価収載	2007年7月	2007年7月
販売開始	2007年7月	2007年7月
※ 効能追加	2014年9月	2014年9月

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

本剤の成分又は他のビスホスホン酸塩に対し、過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

販売名	パミドロン酸二Na 点滴静注用15mg[F]	パミドロン酸二Na 点滴静注用30mg[F]
有効成分	パミドロン酸二ナトリウム水和物	
含量 (1バイアル中)	無水物として15mg	無水物として30mg
添加物 (1バイアル中)	D-マンニトール リン酸(pH調整剤) 水酸化ナトリウム (pH調整剤)	235mg 適量 適量
pH	6.0~7.0 [本品1個を注射用水5mLに溶かした液]	
浸透圧比 (生理食塩液に対する比)	約1 [本品1個を注射用 水5mLに溶かした液]	約2 [本品1個を注射用 水5mLに溶かした液]
色調・性状	白色の塊（凍結乾燥製剤）	
剤形	注射剤（バイアル）	

【効能・効果】

- 悪性腫瘍による高カルシウム血症
- 乳癌の溶骨性骨転移（化学療法、内分泌療法、あるいは放射線療法と併用すること）

※ 3. 骨形成不全症

※ 《効能・効果に関連する使用上の注意》

骨形成不全症に対しては、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に本剤の投与が適切と判断される患者に投与すること。

【用法・用量】
1. 悪性腫瘍による高カルシウム血症

通常、成人にはパミドロン酸二ナトリウム（無水物）として30~45mgを4時間以上かけて、単回点滴静脈内投与する。なお、再投与が必要な場合には、初回投与による反応を確認するために少なくとも1週間の投与間隔を置くこと。

2. 乳癌の溶骨性骨転移

通常、成人にはパミドロン酸二ナトリウム（無水物）として90mgを4時間以上かけて、4週間間隔で点滴静脈内投与する。

※ 3. 骨形成不全症

通常、パミドロン酸二ナトリウム（無水物）として下記の用量を1日1回4時間以上かけて3日間連続点滴静脈内投与し、下記の投与間隔にて投与を繰り返す。ただし、1日の用量は60mgを超えないこと。

年齢	1回投与量	投与間隔
2歳未満	0.5mg/kg	2ヵ月
2歳以上3歳未満	0.75mg/kg	3ヵ月
3歳以上	1.0mg/kg	4ヵ月

〈点滴液の調製法〉

※ 悪性腫瘍による高カルシウム血症及び乳癌の溶骨性骨転移の場合：1バイアルに日局「注射用水」、日局「生理食塩液」又は日局「ブドウ糖注射液（5%）」5mLを加えて溶解後、総量として500mL以上の日局「生理食塩液」又は日局「ブドウ糖注射液（5%）」に希釈する。

※ 骨形成不全症の場合：1バイアルに日局「注射用水」、日局「生理食塩液」又は日局「ブドウ糖注射液（5%）」5mLを加えて溶解後、0.1mg/mL以下の濃度となるよう日局「生理食塩液」又は日局「ブドウ糖注射液（5%）」に希釈する。

《用法・用量に関連する使用上の注意》

- 乳癌の溶骨性骨転移
本剤の用量は90mgを超えないこと。[腎機能が悪化するおそれがある。]
- 骨形成不全症
呼吸機能が低下している患者や2歳未満の患者等では初回投与時は半量とすることを考慮し、投与後は呼吸状態等を注意深く観察すること。[投与後の急性期反応により呼吸状態が悪化するおそれがある。]

【使用上の注意】
1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- 重篤な腎障害のある患者 [腎機能が悪化するおそれがある。]
- 全身状態が極めて不良である患者 [急激な血圧低下をきたした症例が報告されている。]
- 心疾患のある患者（特に高齢者） [生理食塩液の過量負荷により左室不全・うっ血性心不全を起こすおそれがある。また、本剤投与後通常1~2日にみられる発熱も心疾患の悪化に関与するおそれがある。]（「5. 高齢者への投与」の項参照）

2. 重要な基本的注意
※【共通】

- 本剤投与後は定期的に腎機能検査（血清クレアチニン、BUN等）を行うこと。
- 本剤投与後は、血清カルシウム、リン、マグネシウム、カリウム等の電解質の変動に注意すること。本剤投与により**低カルシウム血症が投与後4~10日目頃に低用量においても出現することがある**ので、血清カルシウムの変動については特に注意すること。
- 臨床症状（テタニー、手指のしびれ等）を伴う低カルシウム血症**があらわれた場合にはカルシウム剤の点滴投与が有効である。
- 本剤投与後は、血小板減少等の末梢血球数の変動に注意すること。なお、貧血、白血球減少、血小板減少のある患者に本剤を投与する場合、投与開始後2週間は末梢血球数の変動に特に注意すること。
- ※※ (5) ビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨壊死・顎骨骨髓炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等の顎骨に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リスク因子としては、悪性腫瘍、化学療法、血管新生阻害薬、コルチコステロイド治療、放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既往等が知られている。

本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指導すること。本剤投与中に歯科処置が必要になった場合には、できる限り非侵襲的な歯科処置を受けるよう指導すること。

また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯科受診時に本剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避けることなどを患者に十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口腔外科を受診するように指導すること。

※※(6) ビスホスホネート系薬剤を使用している患者において、外耳道骨壊死が発現したとの報告がある。これらの報告では、耳の感染や外傷に関連して発現した症例も認められることから、外耳炎、耳漏、耳痛等の症状が続く場合には、耳鼻咽喉科を受診するよう指導すること。

(7) ビスホスホネート系薬剤を長期使用している患者において、非外傷性の大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折が発現したとの報告がある。これらの報告では、完全骨折が起こる数週間から数ヵ月前に大腿部や鼠径部等において前駆痛が認められている報告もあることから、このような症状が認められた場合には、X線検査等を行い、適切な処置を行うこと。また、両側性の骨折が生じる可能性があることから、片側で非定型骨折が起きた場合には、反対側の大腿骨の症状等を確認し、X線検査を行うなど、慎重に観察すること。X線検査時には骨皮質の肥厚等、特徴的な画像所見がみられており、そのような場合には適切な処置を行うこと。

(8) 甲状腺手術を受けた患者では、副甲状腺機能低下症による低カルシウム血症があらわれる場合があるので、血清カルシウムについては特に注意すること。

(9) 眠気、めまい、注意力の低下等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。

※[悪性腫瘍による高カルシウム血症の場合]

(1) 緊急時に適正な対応が可能な医療施設において、癌治療に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ使用すること。

(2) 悪性腫瘍による高カルシウム血症の患者に投与する場合は、高カルシウム血症の再発に応じて再投与できるが、初回投与による反応を確認するために少なくとも1週間の投与間隔を置くこと。

(3) 悪性腫瘍以外の原因による高カルシウム血症（副甲状腺機能亢進症等）治療における本剤の有用性は確立していない。

※[乳癌の溶骨性骨転移の場合]

(1) 緊急時に適正な対応が可能な医療施設において、癌治療に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ使用すること。

(2) 腎機能が悪化することがあるので、本剤投与前に腎機能障害のある患者では血清クレアチニン値が投与前値から1.0mg/dL以上、腎機能が正常な患者では血清クレアチニン値が投与前値から0.5mg/dL以上上昇した場合には、本剤の投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

※(3) 必要に応じてカルシウム及びビタミンDの補給を検討すること。（「2. 重要な基本的注意 [共通] (2)」の項参照）

※[骨形成不全症の場合]

※(1) 投与にあたっては、骨折の治癒が遅延するおそれがあるため、臨床症状及びX線検査等で未治癒の骨折がないことを確認し、未治癒の骨折が認められた場合には、投与中止を考慮すること。

※(2) 必要に応じてカルシウム及びビタミンDの補給を検討すること。（「2. 重要な基本的注意 [共通] (2)」の項参照）

3. 相互作用
併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カルシトニン製剤 カルシトニン 等	血清カルシウムが急速に低下するおそれがある。 ^{※1)}	相互に作用を増強する。
シナカルセト	血清カルシウムが低下するおそれがある。 ^{※1)}	相互に作用を増強する。

注1) 「2. 重要な基本的注意」の項参照

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用（頻度不明）

※※1) ショック、アナフィラキシー：ショック、アナフィラキシー（気管支けいれん、呼吸困難、喘鳴等）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2) 急性腎不全、ネフローゼ症候群（巣状分節性糸球体硬化症等による）、間質性腎炎：急性腎不全、ネフローゼ症候群（巣状分節性糸球体硬化症等による）、間質性腎炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。（「2. 重要な基本的注意」の項参照）

3) 臨床症状を伴う低カルシウム血症：テタニー、手指のしびれ等を伴う低カルシウム血症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。（「2. 重要な基本的注意」の項参照）

4) 間質性肺炎：間質性肺炎があらわれることがあるので、咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常（捻髪音）等が認められた場合には、速やかに胸部X線、胸部CT、血清マーカー等の検査を実施すること。間質性肺炎が疑われた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

5) 顎骨壊死・顎骨髄炎：顎骨壊死・顎骨髄炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。（「2. 重要な基本的注意」の項参照）

※※6) 外耳道骨壊死：外耳道骨壊死があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。（「2. 重要な基本的注意」の項参照）

7) 大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折：大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折を生じることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。（「2. 重要な基本的注意」の項参照）

(2) その他の副作用

	頻度不明
循環器	不整脈、血圧低下、輸液過量負荷によるうっ血性心不全（浮腫）・左室不全（呼吸困難、肺水腫）、血圧上昇
腎臓	BUN上昇、クレアチニン上昇、蛋白尿、血尿
血液	貧血、血小板減少、白血球減少、リンパ球減少
肝臓	AST(GOT)、ALT(GPT)、LDH、ALP、γ-GTP上昇、ビリルビン上昇
電解質代謝異常	低リン血症、低カリウム血症、高カリウム血症、低カルシウム血症、高ナトリウム血症、低マグネシウム血症

	頻度不明
消化器	嘔吐、腹痛、便秘、下痢、消化不良、胃炎、食欲不振、嘔気、歯周病（歯肉炎、歯周炎等）
精神・神経系	顔面のしびれ、頭痛、めまい、激越、幻覚、錯乱、不眠、嗜眠、けいれん発作
過敏症	発疹、そう痒感、血管神経性浮腫
眼	結膜下出血、ぶどう膜炎（虹彩炎・虹彩毛様体炎）、強膜炎、上強膜炎、黄視症、結膜炎、眼窩の炎症（眼窩浮腫、眼窩蜂巣炎等）
※筋・骨格系	全身痛 ^① 、筋痙直、骨痛 ^① （一過性）、関節痛 ^① 、筋痛 ^①
局所反応	適用部位の疼痛、発赤、腫脹、硬結、静脈炎、血栓性静脈炎
※その他	発熱 ^① 、血糖上昇、風邪様症状 ^① （発熱、けん怠、疲労、悪寒、ほてりを伴う）、単純疱疹・帯状疱疹の再発

※注）急性期反応（通常は本剤投与後3日以内に発現し、数日以内に回復する）に該当する副作用を含む。

5. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、低用量を用いるなど慎重に投与すること。[乳癌の溶骨性骨転移に対して減量して使用した場合の有効性は確立されていない。]（「1. 慎重投与」の項参照）

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。なお、動物実験（ラット）で本剤を器官形成期又は器官形成期以降の母体に静脈内投与した場合、妊娠末期に血中カルシウム低下に起因すると考えられる母体の死亡が報告されている。]
- ビスホスホネート系薬剤は骨基質に取り込まれた後に全身循環へ徐々に放出されるので、妊娠する可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回る場合のみ投与すること。[全身循環への放出量はビスホスホネート系薬剤の投与量・期間に相関する。ビスホスホネート系薬剤の中止から妊娠までの期間と危険性との関連は明らかではない。]
- 本剤投与中は授乳を避けさせること。[動物実験（ラット）で母乳中へ移行することが報告されている。]

※7. 小児等への投与

骨形成不全症以外の場合

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。[骨成長に影響を与える可能性がある。]

8. 過量投与

本剤の過量投与により著明な低カルシウム血症を起こす可能性がある。このような症状があらわれた場合には、カルシウム剤を投与するなど、適切な処置を行うこと。

9. 適用上の注意


- 投与方法：**本剤は点滴静注にのみ使用し、4時間以上かけてゆっくり投与すること。
- 調製方法：**
 - ※1）悪性腫瘍による高カルシウム血症及び乳癌の溶骨性骨転移の場合：1バイアルに日局「注射用水」、日局「生理食塩液」又は日局「ブドウ糖注射液（5%）」5mLを加えて溶解後、総量として500mL以上の日局「生理食塩液」又は日局「ブドウ糖注射液（5%）」に希釈すること。骨形成不全症の場合：1バイアルに日局「注射用水」、日局「生理食塩液」又は日局「ブドウ糖注射液（5%）」5mLを加えて溶解後、0.1mg/mL以下の濃度となるよう日局「生理食塩液」又は日局「ブドウ糖注射液（5%）」に希釈すること。
 - 2）カルシウム及びマグネシウムを含有する点滴用液と混合しないこと。
 - 3）溶解後は24時間以内に使用すること。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：パミドロン酸二ナトリウム水和物（Pamidronate Disodium Hydrate）

化学名：Disodium 3-amino-1-hydroxypropylidene - 1,1-bisphosphonate pentahydrate

構造式：



分子式：C₃H₉NO₇P₂Na₂ · 5H₂O

分子量：369.11

性状：白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはない。水にやや溶けにくく、エタノール(95)又はジェチルエーテルにほとんど溶けない。

【取扱い上の注意】

安定性試験

最終包装製品を用いた長期保存試験（室温、なりゆき湿度、3年）の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「F」及びパミドロン酸二Na点滴静注用30mg「F」は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。¹⁾

【包装】

パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「F」：1バイアル

パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「F」：1バイアル

【主要文献】

- 1) 富士製薬工業株式会社 社内資料（安定性試験）

【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。
富士製薬工業株式会社 富山工場 学術情報課
〒939-3515 富山県富山市水橋辻ヶ堂1515番地
(TEL) 076-478-0032
(FAX) 076-478-0336

