

【禁忌】(次の部位には使用しないこと)  
重度又は広範囲の熱傷(酸化亜鉛が創傷部位に  
付着し、組織修復を遅延させることがある)

【使用上の注意】

1. 副作用  
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確と  
なる調査を実施していない。

種類	頻度	頻度不明
過敏症	注) 過敏症状	
皮膚	注) 発疹、刺激感等	

注) このような症状があらわれた場合には使  
用を中止すること。

2. 適用上の注意  
眼には使用しないこと



容器本体 PP  
キャップ PP  
外袋フィルム PVC



ラベル

外用局所収れん剤

# 亜鉛華(10%)単軟膏 「ヤマゼン」

10% Zinc Oxide Simple Oint. "Yamazén"



500g

製造販売元



山善製薬株式会社  
大阪市中央区道修町2丁目2番4号

2008年3月改訂

日本標準品分類番号 872649  
承認番号 16000AMZ04075000  
薬価収載 1985年 8月  
販売開始 1985年 8月  
再評価結果 1979年 2月

【組成】 性状  
本品100g中、日局 酸化亜鉛10gを含む。  
添加物としてサラシミツロウ ジブチルヒドロキ  
シトルエン ダイオキシン油を含む。  
本品は白色～淡黄色の軟膏である

【効能・効果】

下記皮膚疾患の収れん、消炎、保護、緩和な防腐  
外傷、熱傷、凍傷、湿疹、皮膚炎、肛門腫瘍症、  
白癬、面皰、癬、よう  
その他の皮膚疾患によるびらん、潰瘍、湿潤面

【用法・用量】

通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦又は貼布する。

製造番号

使用期限

3.08.03

4987296201150



GSI-FSS

14987296201150