

〔禁忌〕（次の部位には使用しないこと）
損傷皮膚及び粘膜〔損傷皮膚及び粘膜への
使用により、刺激作用を有する。〕

〔組成・性状〕

本品は、日本薬局方 イソプロパノール50vol%
を含む。

本品は無色透明の液で、特異なにおいがある。

〔効能・効果〕

手指・皮膚の消毒
医療機器の消毒

〔用法・用量〕

通常本剤をそのまま用いる。

〔使用上の注意〕

①重要な基本的注意

- 1) 本剤が眼に入らないように注意すること。
入った場合には直ちに水でよく洗い流すこと。
- 2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。〔イソプロパノール蒸気に大量又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。〕

②副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 ^(注)	発疹等
皮膚 ^(注)	刺激症状

注) このような症状があらわれた場合には使
用を中止すること。

③臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、ア
レルギーテストの判断を妨害することがある。

※2008年6月改訂（第3版）

2005年10月改訂

貯 法：気密容器に入れ、
火気を避けて保存

製造番号 ラベルに記載
使用期限

日本標準商品分類番号

872615

承認番号 22000AMX00821

薬価収載 2008年6月

販売開始 1963年1月

再評価結果 1983年4月

イソプロ-50% 消毒液「シオエ」

④適用上の注意

投与経路：外用にのみ使用すること。

使用時：

1) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

2) 本剤は血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

〔薬効薬理〕

本剤は、使用濃度において栄養型細菌（グラム陽性菌、グラム陰性菌）、酵母菌、ウイルスなどには有効であるが、芽胞及び一部のウイルスには殺菌作用は期待できない。

〔取扱い上の注意〕

- ①金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐食を防止するために0.2~1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。
- ②合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カーテン等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。

火気注意



製造販売元  **シオエ製薬株式会社**
兵庫県尼崎市瀬江3丁目1番11号

販 売  **日本新薬株式会社**
京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14

製造番号

使用期限

〈調剤コード〉

(01)4987173504695

〈販売コード〉

(01)4987173084460