



薄めて使用すること

\* 2014年10月改訂(第8版)

日本標準商品分類番号

872616

貯法：気密容器

外用殺菌消毒剤

承認番号	22100AMX01809000
薬価収載	2011年 11月
販売開始	1987年 2月
再評価結果	1982年 8月

# 日本薬局方 ベンザルコニウム塩化物液 クレミール®消毒液10% (逆性石ケン液)

## 【組成・性状】

本品はベンザルコニウム塩化物10w/v%を含む。無色～淡黄色透明の液で、特異なにおいがある。振ると強く泡立つ。

## 【効能・効果】 【用法・用量】

効能・効果	用法・用量 ( ) 内の数字はベンザルコニウム塩化物濃度
手指・皮膚の消毒	通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落とした後、本剤の100～200倍液(0.05～0.1%溶液)に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。術前の手洗いの場合には、5～10分間ブッシングする。
手術部位(手術野)の皮膚の消毒	手術前廻所皮膚面を本剤の100倍液(0.1%溶液)で約5分間洗い、その後本剤の50倍液(0.2%溶液)を塗布する。
手術部位(手術野)の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	本剤の400～1,000倍液(0.01～0.025%溶液)を用いる。
感染皮膚面の消毒	本剤の1,000倍液(0.01%溶液)を用いる。
医療機器の消毒	本剤の100倍液(0.1%溶液)に10分間浸漬するか、または厳密に消毒する際は、器具を予め2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、その後本剤の100倍液(0.1%溶液)中で15分間煮沸する。
手術室・病室・家具・器具・物品等の消毒	本剤の50～200倍液(0.05～0.2%溶液)を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。
腔洗浄	本剤の200～500倍液(0.02～0.05%溶液)を用いる。
結膜囊の洗浄・消毒	本剤の200～1,000倍液(0.01～0.05%溶液)を用いる。

# クレミール®消毒液10%

# クレミール®消毒液10%

## 【使用上の注意】

### 1.重要な基本的注意

- (1) 本剤は必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。
- (2) 炎症又は易刺激性的部位(粘膜、陰部等)に使用する場合には、通常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。
- (3) 深い創傷又は眼に使用する場合の希釈液としては、注射用水か滅菌精製水を用い、水道水や精製水を用いないこと。

### 2.副作用

本剤は作用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

### 過敏症<sup>(注)</sup> 発疹、搔痒感等の過敏症状(頻度不明)

注)このような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。

### 3.臨床検査値への影響

本剤で消毒したカテーテルで採取した尿は、スルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陽性を示すことがある。

### 4.適用上の注意

#### (1) 人体

- 1)投与経路：経口投与しないこと。浣腸には使用しないこと。

#### (2) 使用時：

- 2)原液又は濃厚液が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には水でよく洗い流すこと。

- 3)濃厚液の使用により、皮膚・粘膜の刺激症状があらわれることがあるので、注意すること。

- 4)粘膜・創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと(全身吸収による筋脱力を感じそれがわかる)。

- 5)密封包帯、ギブス包帯、パックに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないことが望ましい。

#### (2) その他

#### 1) 調製方法：

- 6)希釈液として塩類含量の多い水又は硬水を用いる場合には、通常用いる濃度の1.5～2倍の溶液として使用すること。

- 7)繊維、布(綿、ガーゼ、ウール、レーヨン等)は本剤の成分であるベンザルコニウム塩化物を吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下とならないように注意すること。

## 2) 使用時：

- 8) 血清、糞汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合は、十分に洗い落してから使用すること。
- 9) 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、石けん分を洗い落してから使用すること。
- 10) 皮膚消毒に使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液に浸すこと。

## 3) 器具等材質：

- 11)合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等への使用は避けた方が望ましい。

- 12)金属器具を長時間浸漬する必要がある場合は、腐食を防止するためにベンザルコニウム0.1% (本剤の100倍) 溶液に0.5～1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。
- 13)皮革製品の消毒に使用すると、変質があるので、使用しないこと。

## 【薬効・薬理】

本剤は使用濃度において、芽胞のない細菌、カビ類、すなわちグラム陽性・陰性菌のみならず、真菌類にも有効であるが、結核菌及び大部分のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

製造販売元

○○サンケミコア株式会社

仙台市青葉区芋沢字大竹新田 8-1

お客様相談室 TEL(022)394-3031

製造番号

使用期限

(01)04987468104005  
\*(調剤用包装)\*

(01)14987468104002  
\*(販売用包装)\*



キャップ: PP  
ボトル: PE  
ラベル: PP

500mL